

COMMENTARII
DE REBUS
IN
SCIENTIA NATVRALI
ET
MEDICINA
GESTIS.



VOLUMINIS XVI. PARS III.

LIPSIAE MDCCLXXI.

APVD IOH. FRIDERICVM GLEDITSCH

Venduntur etiam

Amstelodami apud I. Schreuder, Londini apud Io. Nourse, Parisiis apud
Briasson, Patavii apud I. Manfr , Holmiae apud L. Salvium.



I.

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar för
Åör 1767. Vol. XXVIII. Med. Kongl. Aca-
demiens Tilstånd. Stockholm tryckte hos
Directeuren Lars Salvius, po desfs egen kost-
nad, 1767. 8. mai. pl. 22. Tab. aen. 10.

i. e.

Acta Academiae regiae scientiarum Suecicae
anni 1767. Vol. XXVIII.

Trimestre primum.

I. **D**e climate et agricultura *Iaemtlandiae* refertur p. 1.
ex obseruationibus OLAI GRAMBOM, et
ERICI TRYGGDAHL. In magno *Iaemtlandiae*
lacu, glacies, qua inde ab initio nouernbris plerum-
que tectus est, diffringi incipit circa 21 maii, sumen-
do medium ex obseruationibus 43 annorum; Me-
dium ferendi tempus est dies 10 maii, colitur inpri-
mis hordeum. Nix terram hyeme tegit et sationi p. 5.
tam mature aptam reddit, neque nocet nix, fata de-
nuo obtegens. Messis medium tempus est 25 au-
gusti, vt 15 circiter septimanis hordeum, ex quo sa-
tum est, maturum sit. Haec ex obseruationibus
plus, quam 50 annorum.

Bb 2

2. Ob.

- p. 11. 2. *Observationes astronomicas, in itinere Caianenburgum instituto et in reditu habitas*, edit ANDREAS PLANMAN, physicae professor Oboensis.
- p. 20. 3. *Strata montium in Gothia Occidentali* (Westgothland) *Kinnekulle et Billingen* vocantur, describit SAMUEL GUSTAVUS HERMELIN.
- p. 34. 4. *Grubbiam, nouum genus plantarum* offert PETER. ION. BERGIUS. Trecentas plantas Capitis bonae spei, egregie conseruatas, donauerat Nostro MICHAEL GRUBB, director soc. mercat. Oriental. Indiae Sueuicae, et Acad. R. Sc. Sodalis.
- p. 36. Ex illis hoc nomine insignit BERGIUS fruticem quendam, cui nomen dat: *Grubbiae, rosmarinifoliae*. *Chamaelaea Africana*, rosmarini foliis rarioribus, floribus ex foliorum alis erumpentibus, HERM. Afr. 6. Characterem generis constituunt flores subterni tetrapetali, octandri, lanati, intra perianthium commune diphyllum. Figura additur.
- p. 37. 5. *De truncis arborum in locis paludosis, e fundo in superficiem adscendentibus*, refert LAUR. WOLTER ROTHOF, Lector Oecon. in schola Opilionum Alingsöfensi. Sesquimilliarum Suecico circiter ad boream urbis Falköping, loca duo paludosa sunt, aliquibus in locis producentia ericam, myricam, caricem et similia, aliis in locis nuda, ubi lutum nigrum et cespes igni aptus, a pluuia diffluunt, a sole indurantur, ut ambulantes ferant. Arboribus accolae iam carent, sed in his ipsis locis paludosis apparent interdum trunci et radices arborum, quibus ligni loco vtuntur. Horum 30, 40, aut quotquot comparuerint in superficie, si quo anno auferantur, sequenti loco alii conspiciuntur, maiori aut minori numero. Modos, quibus explicari possit hoc
phae-

phaenomenon, plures enarrat, quorum summa huc redit, in aquam stagnantem delabi arbores, ad litora crescentes, aut vallem, syluam ferentem, aqua quiescente repleri, huic paludi deinde paullatim crustam ex vegetabilibus inprimis superinduci.

6. *Iuglandis nigrae, arboris Americae borealis*, P. 51.
proprietates et usus describit P. KALM. Indigenam reperit plantam usque ad gradum $41\frac{1}{2}$ latitudinis; in borealibus vero locis in hortis cultam. Aliarum iuglandium Americanarum lignum album est, huius folius fuscum, unde nomen eius. In Pensylvania P. 54.
 florebat 1749 d. 7. maii styli noui, 1750 d. 5. maii; folia protrudebat d. 9. maii, nuces maturae erant circa finem septembris, omnes fere deciderant d. 18. octobr. qua etiam folia fere deciderant, 1750, arbores foliis orbatae erant d. 28. octobr. Plantae et arbores vicinae pereunt; id Noster explicat ex radicibus iuglandis late serpentibus, quae nutrimentum omne e terra aliis plantis praeripiunt. Eius rei experimentum captum est, cum iuglans extirparetur, quod in horto quodam nullas plantas adolescere sinebat. Latissime per illum hortum magnae radices serpebant, paucae deorsum, pleraeque horizontales. Frondes supra vicinum hortum late eadem arbor extenderat, non aequae radices in terram vicini. In illo autem vicini horti laete omnia crescebant, quod indicat, non ramos esse, aut aquam, ab arbore destillantem, quae plantis circumpositis officiat, ut aliqui credunt. Radices non totae fuscae sunt, ut lignum, interiora albescunt, sed aëri expositae, fuscantur. In venulis et poris arboris frequentes sunt arenulae, ferro, quo formari debet lignum, inimicae. Hyemes regionis bene tolerat, moro infestas. Anno aetatis decimo nuces fert. Quatuor et quadraginta annorum Noster vidit, pedes 54 al-

tas et in distantia vlnae supra terram $3\frac{1}{2}$ vlnas cras-
 fas. Foliis ob odorem grauem abstinēt animalia,
 erucæ tamen illas adgressæ sunt, quas Noster *)
 descripsit. Ob venas et maculas coloris magis fuscī
 aut dilutioris, aptum est lignum, ex quo elegantio-
 ra opera fiunt, pulciora adhuc e radicibus crassio-
 ribus. Noces feruntur eae, quæ, plenam ma-
 turitatem adeptæ, deciderunt. Inferuntur statim eo
 loco, vbi perpetuo crescere arbor debet, transplan-
 tatae arbores hyemes minus tolerant.

p. 64. 7. *Fornacum hypocaustis calefaciendis emendatio-
 nem docet SAMUEL SCHROEDER, Consil. rei
 metall.* Tubus ferreus, ad angulos rectos inflexus,
 fornaci inferitur, ita, vt e tubo calefactus aer in hy-
 pocautum se expandat, eius autem loco frigidus tu-
 bum intret similiter calefaciendus. Ita parsimonie
 ligni consulitur, aere cubiculi, statim cum accendi-
 tur ignis, incalescente.

p. 67. 8. *Quantum argenti e fodina Salensi inde ab anno
 1400 educitum sit, computat ABRAH. ABRAHAMSS-
 SON HUELPHERS.* Vfus est antiquis documen-
 tis, quæ non singulos annos exhibent, id vero osten-
 dunt, annorum 216, qui continentur inter annos ab
 1400 ad 1765 elapsos, redditum fuisse marcarum 1,
 131' 006.

p. 73. 9. *Ad emendandam depurationem aluminis consilia
 edit TORBERN BERGMAN.* Vt alumen ab vi-
 triolo martis admixto liberent, alcali addunt. Ea
 vero re simul alumen destruitur. Soluantur simul
 alumen et vitriolum martiale, instilletur solutio alcali

*) Vid. Kongl. Vetensk. Acad. Handling. för Åör 1764.
 Vol. XXV. p. 124. Comment. nostr. Vol. XIV.
 p. 204.

li fixi vegetabilis et praecipitabitur terra martialis, colore viridi agnoscenda, quae omnis postquam descendit, terra aluminosa alba etiam praecipitatur. Qui pinguedinem aut acidum superfluum, si alumini adhaereant, corrigi credunt, alcali addito, cogitare debent, ex alcali et pinguedine saponem fieri, multo facilius, pinguedine sola, in aqua solubilem, atque pinguedinem ita non separari, sed intimius omni massae intermisceri. Quantum alcalici addi-
tur ultra limitem saturationis acidi, tantum aluminis destruitur. Noster igitur suadet, ut abstineatur ab admixtione alcali, sed lixiuio, quo in crystallos coire debet alumen, admisceatur argilla, pultis valde dilutae, forma. Ea in lixiuio circumacta, attrahit pinguedinem, magma vitriolicum, impura alia, acidum absorbet. Ipse in tentamine usus est argilla, quam Colonensem dicunt, tubis, per quas tabacum fugitur, idonea, credit vero, et alias species adhiberi posse, dummodo abstineatur ab iis, quae ferum continent. Cum, chemia docente, alumen
constat ex argilla pura, in acido vitrioli soluta, patet, si abundet lixiuio acido, addatur vero argilla, hinc alumen elici.

10. *Quaedam ad scriptum praecedens observat* p. 80.
IAC. FAGGOT. Inprimis dubitat, an Suecicae argillae, a calce liberae, usui futurae sint, cum eae plerumque ferro et acido praegnantessint. Eas adhiberi posse credit, quae cum acido efferuescant. Cetera probat.

11. *Adhuc quaedam addit* ANTON VON p. 83.
SWAB. Inter alia explicat, cur alumen noui cuiusdam operis, Garpenfis, iam purius a ferro sit, possit tamen, continuatis illis laboribus, eodem inquinari. Vitriolum restat in illo lixiuio, in quo alumen

- p. 84. in crystallos coit, *Mutterlauge* appellant; id vero lixiuum ad crySTALLIFICATIONES sequentes adhibetur, ergo paulatim ferrum alumini admiscebitur, nisi modus procedendi mutetur et lixiuum illud adhibeatur saltim alumini viliori parando.

Trimestre secundum.

- p. 89. 1. PET. WARGENTIN *de fumo solari.*

- p. 97. 2. IAC. GADOLIN *de eodem.*

- p. 110. 3. GISSLERUS *de eodem.*

Hoc nomine (*Solrök*) intelligunt meteoron in regionibus borealibus satis frequens, cum, feruente imprimis aestate et nubibus aut nebulis nullis comparantibus, solis tamen lumen ita hebetatur, ut vel meridie debile splendeat. Contigit eiusmodi quid in Gallia, d. 1 iun. 1721. et in observationibus meteorologicis Cl. DU HAMEL DU MONCEAU nebula sicca (*brouillard sec*) appellatur. Nostri in eo conueniunt, esse a vaporibus subtilissimis, visum effugientibus, solis autem lumen impredientibus (*). Quaesitum etiam est, quid eo faciat mos in regionibus borealibus usitatus, partem siluae comburendi, ut cinere ager pinguescat, *Suediande* appellant, germanice *Schwenden*, item sylvarum incendia, fortuito aucta calore aestiuo vehementi orta. Quam rem in-

primis

(*) Extat in LUDOV. PHIL. THÜMMIGII *meleremaribus varii et rarioris argumenti*, dissertatio Hae-lae 1722. defensa. Phaenomenon singulare solis coelo sereno pallefcentis, ubi Gallicum id phaenomenon, Vlmæ etiam ab ALGOEWERO visum, eodem fere modo explicatur. De fumo ab igne THÜMMIGIUS cogitare non poterat, neque forte Sueci de eo cogitassent, nisi nomine fumi moniti. Ceterum hoc THÜMMIGII scriptum ignorasse videntur.

primis GADOLINUS vberius tractat, ostenditque, posse fumum, ex his ignibus oriundum, late spargi, et illi, qui proprie solaris dicitur, misceri, meteoron tamen et oriri, cum nulli flagrent ignes. Calor eo tempore est suffocatiuus, respiratio difficilis, tussis, grauedo, dolores capitis frequentes hominibus, quos aërem, eo fumo solari infectum, respirare oportet. Vento dispergitur, pluuiis praecipitatur, sed nisi venti aut pluviae magnum terrae tractum occupent, mox redit, plures interdum dies subsistens.

4. *Tres vermes marinos* describit IO. ERN. p. 114. GUNNERUS S. S. Th. D. Episcopus Drontheimensis. Duo priores ad holothurias refert, vltimum ad actinias.

5. *Raphanum satium gongyloden f. corinthium* p. 124. describit BENED. BERGIUS, Banci Commissarius. Cum vere 1765 a GRUBBIO, ex Sina reduce, se- p. 128. mina raphani Sinensis oleiferi accepisset, inter plantas, ex illis crescentes, alias reperit, flore coeruleo, magis saturo, distinctas, caulis vero earum maior, radix inprimis insuetae crassitiei et longitudinis, eiusque maxima pars supra terram. Septembri adhuc florebant, dum siliculae demum se formare incipiebant. Quinque plantarum, quas reperit, cum noctes gelidae ingruerent, duas radices hortulano dedit, in cella seruandas sub terra, caulem vnum absque radice in hypocausto, aquae immissum, ad fenestram posuit, aquam recentem quotidie subministrando, reliquas esui adhibuit. Earum vna, pondere 8 p. 129. marcarum, in parte inferiori discissa, nihil filamentosi aut spongiosi exhibuit, sed succi plena fuit et compacta, saporis gratissimi, quem raphanus habere potest, ei, quem habent raphani minores (*radieß-*
Bb 5 *gen*)

- gen) similis, non acris. Prope versus extremum superius paulisper spongiosa in medio erat haec radix, magis et magis spongiosa, quo magis ad caulem, qui inde progerminauerat, accederet, credit tamen Noster, hominibus 20 satisfacturam fuisse, ut appetitui suo indulgere potuissent. Radices, hortulano traditae, vere sequenti bene se habuerunt, florentes tota aestate, ipsoque adhuc autumno et semina ferentes, quorum alia alio tempore mature-
- P. 130. scebant. Caulis, aquae immixtus, tres vlnas longus, in parte inferiore duos pollices crassus, semina matura tulit, ex quibus raphani progerminarunt, quod quidem experimentum utile esse potest ad obtinenda semina matura ex plantis, quae serius florent, ut iis frigora autumnii metuantur. Videntur vero Nostro, requiri caules crassiores, longiores, succi pleni, et ut aqua saepius mutetur. Terram his raphanis conuenire expertus est Noster argillaceam, humidam, non compactam, humo intermixtam, perierant fere et a vermibus confundi erant, quos hortulanus terrae, fimo calenti immiserat. Utilem autem hanc raphani varietatem nullus recentiorum nominat, neque vidit, qui horti culturae causa, Galliam, Angliam, Batauiam, Germaniam peragrauit
- P. 133. ANDR. KALLSTROEM, Regis Sueciae horti magister. Igitur nouam credit iure appellari et gongyloiden vocat, ad imitationem brassicae oleraceae,
- P. 133. cui id nomen tribuitur. Sed apud THEOPHRASTUM Hist. Plant. L. 7. c. 4. p. 137. vers. THEOD. GAZAE Corinthius raphanus ita describitur, ut illum esse perspicuum sit. THEOPHRASTUM secutus est PLINIUS L. 19. c. 5. nisi quod napum vocet.
- P. 134. 6. *Experimenta varia, ad rem tinctoriam pertinentia*, tradit PETR. ADR. GADD Prof. Chemiae Obonensis.

ensis. Inuestigauit, quae plantae ad colorem flauum linteis, laneis, sericis dandum, optimae essent. Inprimis solidaginem Canadensem, virgae Canaden-
sis nomine alias notam, laudat, quod pulchritudine et
constantia coloris Vouedam (*Vau*) aequet, imo fe-
re superet. Colligi suadet flores et folia tum,
cum floruit planta, serius collecta, minus pigmenti
praebent. Fert planta clima Finnicum.

7. *Singularem oculi morbum* describit I O. L. O N - p. 142

HELIUS M. D. Medicus aulae. Rustico post ophthalmiam humidam, sueto more, cataplasmatibus calidis male sanatam, leucoma vtrumque oculum excoecauit. Remediis illis adhibitis, quae in praecedentibus *) probauerat, leucoma imminutum est, visus quodammodo aegro redditus, ad quem cum sinistro oculo uti se referret aeger, apertura insuetae informis in segmento iridis superiore reperta est, per quam intrabant radii lucis. Colligit hinc Noster, si visus perierit, ob pupillam omnino contractam, aut capsulae lentis impellucidae factae adnatam, aut ex loco suo detrusam et, lente crystallina diffracta, in particulas rursus conglutinas repletam cet. posse acu acutissima, inducta duabus aut ad summum tribus lineis ab orbiculo ciliari, nouam iridis aperturam fieri, qua visus restituatur coeco, alias insanabilis oculus depictus exhibetur bis, cum prior figura non satis exacta fuisset. Tab. IV. et Tab. X.

8. *Obseruationi huic* quaedam addit O L A U S p. 147.

ACREL. Modum, iridem vt radii lucis intrent, artificiali quadam pupilla aperiendi, probat, nisi forte haec pupilla, coeunte rursus vulnere, euanescat.

Deinde

*) V. Kongl. Vetensk. Acad. Handling. för Aör 1765. Vol. XXVI. p. 290. Comm. nostr. Vol. XV. p. 25.

Deinde genera pupillarum praeternaturalium ex Autoribus recenset.

- p. 148. 9. *Parochias Halltorp et Vaxtorp oeconomice describit* ADOLPHUS MODEER, Geodacta extra-
- p. 153. ord. Singularem causam reddit, cur pauci, annum aetatis septuagesimum multum supergressi, numerentur. Cum deos falsos colerent Sueci, decrepitos occiderunt iuniores, *claua*, ut fertur, quam Senum dixere (*ätte klubba*) inde mos durat, ut senes veram aetatem profiteri nolint.
- p. 158. 10. *De figura telluris ex penduli, quod secundis singulis it aut redit, diuersa in diuersis locis longitudine definienda agit* FRID. MALLET, Vpsaliae Observator Regius. Initium dissertationis saltim exhibetur,
- p. 163. 11. *Ossificationes aortae, ubi ex corde exit, re-
pertas, describit* ROLAND MARTIN M. D. Prof. Anat. et Chir. Sexagenarius saepius conquestus de respiratione difficili, fere cessante, lassitudine, thorace velut onere grauato; inprimis post cibum, ut solebat, copiose sumtum, subito obiit. Cum aperiretur cadauer, haec animaduersa sunt: liquor pericardii solito copiosior, pulmones sanguine ultra, quam alias esse solent, repleti, rubicundi, inprimis lobi inferiores, vnus sinistri pulmonis; alter dextri, ventriculus dexter cum sinu venae cauae magis vacuus sanguine, quam plerumque est, sinister autem plus repletus sanguine, cor hinc velut expansum; ubi sinister ventriculus in aortam aperitur, annulus, veluti aperturam circumdans, cartilagineus, elasticus, durus, eminentiis acutis inaequalibus asper, illae a perimetro arteriae versus centrum extendebantur, simul valuulas semilunares amplexae; valuulae
hae

hae osseae ac durae, fragiles, expansae, irregulares, vna inprimis illarum, pressa et veluti puncta, ab eminentia ossea acuta earum, quas diximus. Ceterum arteria extra cor in statu naturali, nihil in ea fuit, nec polypus. Casum hunc similem pronunciat Noster ei, quem descripsit his ipsis actis *).

12. *Calorem corporis, quomodo expertus sit imminui, post sanguinem e vena secta missum* narrat A N-P. 165. TON MARTIN Medic. Cand. Anno 1765 d. 22 maii, hora 11 antemeridiana sanguinem misit. Paulo ante hos expertus est gradus caloris, in diuersis corporis partibus **) Manus 36, sub axillis 36, in thorace 33, in regione ventriculi 33, in lumbis 36, in flexura genu ***) 33, in planta pedis 33, summa 241; eo gradu calere solet tempore matutino. Hora 12 calor quibusdam in partibus imminutus est, in aliis auctus, totus 242; hora 4 pom. 245, hora 9. vesp. 243; die sequenti hor. 7. infueto more frigidus sibi visus est, et si vestes, camera, cet. essent vt ante. Manus 30, axillae 35, thorax 34, regio ventriculi 33, lumbi 36, flexura genu 33, planta pedis 28, totus calor 229, ab illo diei praecedentis mane, deficiens gradibus 12. Porro fuit calor matutinus die 24; 232: d. 25: 235; d. 26. fere vt consuetus. Itaque fuetus calor quarto demum, post sanguinem missum; die rediit, inprimis manus et pedes friguerunt. Incrementa caloris statim post sectam venam, cibo adiuncto, motui, adscribit. Internum

*) Vid. för Aör 1765. Vol. XXVI. p. 292. Comm. nostr. Vol. XV. p. 26.

**) Sueci post CELSIUM thermometro vtuntur, inter punctum congelationis et aquae ebullientis in gradus 100 diuiso.

***) Eum gradum hic Auctor errore scribentis omisit, tantum autem fuisse patet ex calculo, et collatione experimentorum sequentium.

ternum calorem nihil esse mutatum ex vrina collegit. Sanguinis vncias 5 aut 6 misit. Aër in camera calebat gradibus 16. 18.

Trimestre tertium.

p. 169. 1. *De parallelogrammis, figuras, datis figuris similes describendas, idoneis, Pantographa vocant, agit*
NIC. MARELIUS.

p. 180. 2. *Articulus IX Trim. II. continuatur.*

p. 193. 3. *Item Art. X. Trim. II.*

p. 209. 4. *Animaduerfiones Commissionis Regiae in tabulas, quibus numerus incolarum Sueciae recensetur, edit*
EDUARD. FR. RUNEBERG. Iam agit de copia hominum in quouis quatuor illorum ordinum, in quos Sueci diuiduntur, nobilium, clericorum, ciuium, rusticorum.

p. 245. 5. *Pisces, Suecis Lerbleking appellatum, describit*
PETR. OSBECK, Verbi diu. Min. ad Haslöf in Hallandia. LINNAEI Gadus pollachius Syst. Nat. ed. XII. inter pisces minus gratos gustui refertur, vescuntur tamen illo. Sistitur icon piscis. Tab. VII.

Trimestre quartum.

p. 249. 1. *Quibus mensibus in Suecia plurimi nascantur et obeant, edit* P. VARGENTIN. Ex tabulis natorum per vniuersam Sueciam, obseruationibus 13 annorum inter 1749. 1763 (annos 1755; 1758 neglexit Noster) haec colliguntur: plurimos nasci septembri, paucissimos iunio, numeri natorum his mensibus sunt in ratione 209536: 82313, secundus

dus numerus, quarta sui parte auctus, nondum pri-
 mum exhibet. Ditissimi natorum fuere september,
 mars, februius, ianuius, pauperrimi augustus,
 maius, iulius, iunius, isque ordo plerumque et sin-
 gulis annis obtinuit. Cum vero vnus mensis plures
 dies habeat, alius pauciores, primo in tabula ponit
 Noster, quot re vera quouis mense nati sint, deinde p. 252.
 quot ex hoc numero vere natorum debeantur nati
 eidem mense, si fuisset dierum 31. Retro autem com-
 putatis a quouis mense 9 mensibus, reperitur plu- p. 253.
 rimos generari decembri, deinde aprili, maio, iu-
 nio, paucissimos augusto, septembri, octobri. Eius
 rei causam nullam reddere audet, nisi quidpiam huc
 faciant, et quod vere omnis laetetur natura, et quod
 longae sint decembri noctes, et quietiorem hoc men-
 se degant vitam inprimis ruricolae. Ex obseruatio- p. 255.
 nibus 12 annorum moriuntur plurimi aprili, deinde
 maio, martio, februario, iunio, pauciores ianuario,
 iulio, decembri, augusto, paucissimi nouembri, se-
 ptembri, octobri. Numerus octobri mortuorum
 non nisi duas tertias continet numeri aprili mortuo-
 rum, reductis numeris ad menses dierum 31. Nu-
 merus primis sex anni mensibus defunctorum quin-
 ta parte excedit numerum vltimis sex mensibus mor-
 tuorum. Numeri singulis mensibus mortuorum
 crescunt ab initio hyemis mense decembri, donec
 hyems finiatur aprili, deinde paulatim decrescunt
 vsque fere ad finem autumnii. Eius rei causam satis
 apertam efficiunt mutationes subitae caloris et fri-
 goris, quae contingunt hyeme exeuntibus e cameris
 valde calefactis, aut in eas redeuntibus, et ipse vale-
 tudini noxius calor suffocatiuus hypocauftorum.

2. *De femina, fetus reliquias nouem annis in utero* p. 259.
gerente, refert DAN. SCHULZ M.D. Art. Obstetr.
Prof. et Dir. Rustica aetatis 46 annorum, cum, ex-
eunte

eunte anno 1756, vndecima vice concepisset, facto tempore septembri 1757. dolores sensit, partum vero nullum enixa est. Emisit vero humorem aquosum, sanguineum, quo morbo decubuit vsque ad ianuarium 1758, tunc surgere a lecto coepit. et sufficere laboribus domesticis leuioribus, sentiens tamen interdum dolores vehementes, inprimis in latere dextro. Iunio 1765 cessauit fluxus humoris sanguinei, aestate satis valuit, sed augusto eius anni difficulter vrinam misit et dolores sensit vehementes velut pariturae, quadam nocte emisit humorem mucosum, sanguineum, deinde vsque ad finem anni paulo melius se habens. Initio anni 1766 in toot corpore sensit spasmos vehementes. Feminam, quae obstetricias manus eo in loco praestabat, consuluit, p. 260. haec vero chirurgum I. HUMBLE. Orificium vteri reppererunt clausum, iniectionibus oleosis, binis ad minimum quotidie, septimanis septem, effectum est, vt aperiretur. Coeperunt instrumentis comminuere ossa in vtero, extracta est cum membranis et mucosum, massa quaedam, cuius situs in regione dorsi, exitui excrementorum obsteterat. Martio et aprili, septem diuersis operationibus 128 frustra ossa extracta sunt, multum praeterea sanguinis grumorum, membranarum portiones 6. Os magnum capitis meatum vrinarium exulcerauerat, sed is sanatus est et emissio vrinae facilis rursus reddita, cathetere immisso. Femina, licet debilis, aestate sequenti superauit incommoda omnia gestationis 9 annorum. Veritatem historiae probat narratio, munita subscriptione obstetricis, chirurgi, parochi et ipsius mariti. Ossa Societati Regiae exhibentur. De iis post erit dicendi locus. Subiecit Noster, fetuum in vtero mortuorum, et diutius gestatorum, imo feminarum, quae conceperunt, cum sceleton embryonis adhuc vtero gestarent, ex variis Auctoribus historicis plura, quaedam satis incredibilia exempla.

3. *Ossium praefatorum descriptionem et icones* ex-p. 265.

hibet ROL. MARTIN. Selegit, quae satis adhuc agnosci possunt, et faciunt aliquid ad osteogoniam. Sunt illa inprimis, portiones ossis frontis, ossium p. 271. temporum, et alia ossa capitis. In maxilla inferiore ambae tabulae separatae sunt, vt efficiant cauum, alueolis omnibus commune; interna superficies minor est exteriore. Adfunt etiam clauiculae extre-p. 272. mitates sternalis et acromialis. Tibiae pars superior, basis radii, costae quaedam. Optime conservata et minimas a putredine mutationes passa sunt ossa caluariae, indicio eo, primum in foetu durescere. Quae tamen illorum plana sunt, magis erant in partes diuisa, prouti substantia illorum radiata, magis remota erat a punctis ossificationis. Spongiosorum vestigium supererat nullum. Extremitatum ossa pleraque soluta. Vertebrarum nihil supererat ob substantiam illarum, ea aetate, spongiosam, et processus fere cartilagineos. Ex eo autem, quod ne alueoli dentium quidem distincti appareant, colligit, quam incredibiles sint obseruationes, quae ossa, interdum in tumoribus cysticis abdominis reperta, pro dentibus foetus habent.

4. *Methodum calore focorum, ubi ferrum funditur*, p. 273.

ad frumentum siccandum utendi, exhibet PETR. WASSTROM. Camerarius.

5. *Articulus II Trim. III. concluditur.* p. 280.

6. *Casus duos partuum, ubi orificium uteri coali-* p. 301.

tum erat, enarrat HERRMANN SCHUTZER Arch. Reg. Praemisit cogitata de partuum diuisione utilius, quam receptum est, facienda. Diuidi posse P. 304. credit partus generantium pro ratione fetus, qui editur aut partium genitalium parientis; in his specta-

- ri posse impedimenta, quae nascuntur, vel a *mollibus* partibus, vel a *duris*. In casu primo eorum, quos narrat, vesicam quandam distentam admodum tactu sensit, orificium tamen nullum percipi potuit, digito circumcirca moto, in parte autem infima, versus intestina, rugam exiguam animaduertit, grani hordei magnitudine. Indicem igitur dextrum, oleo illitum, immisit vaginae vteri, et ad locum illum rugae promouit, catheterem muliebrem, sinistra prehensum, eidem loco admouit, ibi firmiter tenuit, extremo tamen acumine oblique versus os coccygis directo, ne aut vesica rumperetur, aut laederetur caput infantis, si in debito situ esset. Cum acumen instrumenti separasset filamenta carnea concreta orificii vteri, continuarentque dolores partus, pressione catheterem vterius versus superiora promouebat. Iam minus resistentiae sensit, et guttas sanguinis in catheteris parte inferiore, hinc collegit, apicem catheteris transiisse orificium vteri, qui cum per tres aut quatuor lineas intrasset, illum manu dextra prehendit, magna cautione adhibita, pressit versus superiora, versus inferiora retraxit, in orbem mouit, donec digitum indicem posset immittere; omnia haec peregit, cum dolores cessarent. Post aliquot dolores iam duos digitos introducere potuit, tribus autem horis apertura satis ampla erat, per quam membranae, fetum continentes, iam protrudi incipiebant, igitur, cum perciperet, caput infantis bene situm esse, reliqua censuit naturae committenda. Itaque paulatim maior portio membranarum, quae fetum continent, prodiit,
- p. 307. disruptisque tandem membranis, caput infantis primum exiit, et infans sanus in lucem editus est, post dolores 18 horarum inde ex quo vterus fuerat
- p. 305. apertus. Antequam vero advocaretur, duabus diebus et noctibus dolores parturiens senserat vehementif-

mentissimos, obstetrice, quae iam fenserat vterum esse clausum, aliud auxilium, praeter sectionem caesaream, nesciente. Post illum partum nihil incomp. 307. modi sensit mater, nisi tribus proximis diebus difficultatem fecum excernendarum; octo septimanis post partum menstrua rediere, duobus autem annis post rursus peperit, incredibili facilitate et breuissimo tempore. Alter casus, tempore prior, similis huic est. Filamentis carneis, catheteris ope, separatis, post quatuor aut quinque dolores apertura vteri satis ampla euasit, ut digitum introducere opus non esset. Partus hic breuiore tempore absolutus, cum ruga illa exigua, orificium vteri coalitum indicans, in medio eius esset. Qui vero dubitent, vtrum coalitio vera in his casibus obtinuerit, an saltim strictura orificii vteri; item qui quaerant, quomodo orificium vteri coalitum cathetere obtuso aperiri potuerit absque doloribus cet., illis haec regerit: In vtero conp. 310. stricto vestigium semper orificii sentiri, quale hic sentiebatur, omnino nullum a doloribus parturientis ampliari tantillum, orificium vteri constricti, catheterem vero ob tenuitatem suam in eo parum prodesse, nec ab eo intruso sanguinem elici, in his autem casibus sanguis fluxit a filis, facile ruptis, quoniam valde tensa erant, nec multum sanguinis fluxit, cum tenuis catheter non nisi pauca fila rumperet. Cuius historiam secundo loco retulit, orificium vteri p. 312. sex circiter septimanis ante partum apertum reperit, et in eo partem inuolucris fetus, partum tum satis propinquum suspicatus. Tribus septimanis ante partum vehementer doluerunt genitalia, ut ea tangi et inquiri aegra vetuerit. Adhibitis cataplasmatibus, medicamentis resoluentibus, enematribus, foetor putridus cum sanie ex vagina vteri prodiit, restituta est pau- p. 313. lo post aegra, iniecto decocto altheae cum melle rosarum. Vlcus igitur credit Noster fuisse circa orifi-

cium vteri, siue eo rupto, orificium excoriatum concreuerit, siue coalitio inde nata sit, quod orificium valde humectatum fuit, et ab illis membranis, fetum continentibus, quae intrauerant, et ab iniectionibus. Femina, cuius historia primo loco narratur, tempore grauiditatis nihil extraordinarii sensit, nisi summam genitalium ficcitatem. Anno 1747 Noster Academiae Regiae exhibuit casum feminae, quae partum biennem se gestare credebat, ibi etiam dictum est, de vtero coalito post partum, instrumentorum auxilio promotum.

p. 315. 7. *De habitu magnetis natiui in fodinis, ubi reperitur*, refert L. B. SAM. GUST. HERMELIN, quae vidit in vna alteraue Sueciae fodina. Magnes inter mineram ferri reperiendus, lineam, per polos suos transeuntem, nunquam habuit horizontalem, sed vel verticalem, vel paullulum inclinatam parte inferiore attrahente acus magneticae extremum australe, superiore boreale; vt magnetis polus borealis sit inferior, australis superior. Alicubi repertus est magnes inter mineram ferri, et parietem, (*Saalband*) quo concluditur interiora minerae a parietibus remotiora, nullam vim magneticam ostendisse, etsi eandem texturam exhibentes cum eo, quod magneticum erat. Ceterum non valde profundos magnetes reperiri, vidit, et iis in locis, ubi per rimas lapidum aer et aqua penetrent, quorum partes aliquas esse in concilianda vi magnetica existimat. Situm fere verticalem polorum conuenire cum theoria, quam suadent magnetes artificiales, animaduertit.

p. 319. 8. *Quaedam ad scriptum praecedens notat* IO. CAR. WILCKE. Lector phys. exper.

9. Fe-

9. *Febris petechialis, algidae (kaltes Fieber) fimi-* P. 320
lis historiam scribit IO. GUST. ACREL M. D.
 Adi. Med. Acad. Reg. Vpsal. Praecessit epidemiam
 hanc hyems seuera et diuturnior, cuius sub finem
 tempestas varia, gelu et degelatione alternanti-
 bus, et nebula spissa ad litora Scaniae, exeunte fe-
 bruario. Eo mense, pluribus, omnis aetatis, in-
 sueti sanguinis profluxus ex naribus, haemorrhoidi-
 bus, menstruis, sanguine puro inter tenesmos pro-
 fluente. Haec autem mox transibant, vnicus fe-
 brem simul sensit. Tempestate similiter varia
 vsque in medium martii continuante, fluxus illi san-
 guinis parciore. Initio aprilis dies calidiores, no-
 ctes toto mense frigidissimae, tempestas niue, plu-
 via, sole splendente, varia, ventus vehemens *Sud-*
ost. Sub initium eius mensis, cum solent ingruere
 in Scania febres, petechialis illa grassari coepit, cu- P. 322.
 ius primo stadio, febris algidae accessum sentientes
 aegri, post duos circiter dies tertiana vernali se labo-
 rare experti sunt quinque aut sex diebus non omni-
 no lecto decumbentes. Secundum stadium exor-
 tum est post aliquem febris illius accessum, tertio aut
 quarto paroxysmo pulsus obseruatus est debilis, quasi
 contractus, non velocior naturali, pectus velut
 pressione anxium, sudor frigidus, tremor partium
 omnium musculosarum, plurimi simul surdastri; Se-P. 323.
 ptimo die plurimis sanguis ex naribus, aliquibus
 sanguis tussi eiiciebatur, menses praeter morem.
 Paululum ante aut post hunc sanguinis profluxum,
 in collo, pectore, extremitatibus, maculae primo
 punctorum minutorum forma, post ampliatae, ple-
 rumque transeuntes omnes colorum varietates a ru-
 bro ad nigrocoeruleum. Symptomata haec conti-
 nua, sed vrinae, alternis diebus, sedimentum albi-
 dum, interea clara erat vrina, cum nubeculis ad fun-
 dum. Postquam comparuerant maculae illae, plu-

- rimis mens alienari, infania ad certum aliquod vnicum obiectum pertinente. Surditas aucta. Hoc stadium durabat ad diem nonum. Tertio stadio, cum maculae omnes erupissent, sudoris odor vehemens et singularis erat; surditas adhuc maior, tremor abiens in conuulsiones, alienatio mentis vehementior, usus linguae periens, vrinae sedimentum nullum, mors die 9, 11, 13. Eum statum, qui superabant, dubii iacebant vsque ad diem 17; quo quartum stadium ingruerat. Pulsus a contracto, qui huc vsque fuerat, liberior, interdum sputum eiciebatur, pauci sudabant, alienatio mentis non nisi vesperi. Maculae, eodem ordine euanescentes, quo apparuerant, vrinae sedimentum per omnia stadia reconualituris.
- p. 324. Cum adesset Noster fortuito aegris duobus, die 21 indusia mutantibus, quod toto morbo factum non fuerat, accuratius inspexit dorsum, humeros, brachia, partes alias perpetuo tectas, et veluti a vernice superinducto nitentes vidit. Digito admoto, facillime epidermis recessit, digito vero adhaesit subtilis rubedo, minio, subtilissime elaborato, similis. A pluribus partibus corporis copia quaedam eius coloris abradi poterat, etsi plurimum indusio adhaesisset. His duobus aegris symptomata maligna vehementissima contigerunt, ab iis tamen superata. In aliis nil eius rubedinis vidit. Quod medendi methodum spectat, corticem Peruuianum, nullo medico in consilium aduocato, sumserat aeger aliquis, cum grassari inciperet, epidemia et obiit, alius post idem remedium sumtum difficulter euasit.
- p. 325. Id effecit, vt a cortice abstineretur. Venae sectio nil profuit, forte nocuit, post eam enim in primo stadio, pulsus debilior et alienatio mentis. Vesicatoriorum et similium effectus nullus. Ceterum, maculis et profluuiis sanguinis, indicantibus sanguinem dilutissimum, acidis mineralibus dulcificatis
usus

usus fuit, inprimis spiritu vitrioli, item cordialibus, vino Rhenano et Gallico, interne et externe in stadio 2 et 3. In ultimo data sunt inprimis, quae viribus subuenirent, item praescripta est diaeta idonea. Cum cessarent hae petechiae, secutae febres vulgares et rheumaticae per integrum maium.

10. *Febres malignas petechiales epidemicas Hol.* p. 326. *miae*, describit PET. ION. BERGIUS. Errasse medicos suspicatur, qui macularum eruptionem pro critica habuerunt. Ea suspicio nascitur ipsi ex similitudine macularum illarum cum purpura, est autem purpura, experientia teste, mere symptomatica. Non minuitur febris cum erumpunt petechiae, sed symptomata omnia peiora fiunt, indicio, nihil hic esse critici. Quibusdam etiam nullae maculae erumpunt, aut statim rursus euanescent, nulla inde p. 332. oriunda sensibili mutatione febris, aliqui conualescent non euanescentibus maculis. Medici illa, quam erroneam suspicatur, opinione seducti, attentionem forte ad maculas direxerunt, quam feбри debebant, regimine calido et diaphoreticis sanguinis calorem auxerunt et putredinem. Ipse contra, ut refrigeraretur aeger, potissimum curauit, intestina purgarentur, putredini obuiam iretur. Ea in re p. 333. consentientes habet medicos celeberrimos. Vesicatoria vtiliter adhibuit, cum ingrueret delirium et pulsus fieret remissior. Corticis usus nullus fuit, nisi finita febre, ad vires roborandas et ventriculum restituendum.

11. *Machinam, qua Sineses oleum exprimunt,* p. 333. describit CAR. GUST. EKEBERG. Simplicitate commendantur machinae, comminuendis seminibus, et oleo exprimendo, ipsaque haec negotia peragendi methodus.

II.

British zoology. Vol. I. et II. Classis I. Quadrupeds; Class. II. Birds; with an appendix, an essay on birds of passage. 8. Alph. I. pl. 11. tab. aen. 18. Vol. III. Class. III. Reptils; Class. IV. Fish. 1. Alph. tab. aen. 17. London printed for B. White 1768 et 1769.

i. c.

Zoologia Britannica. Vol. I et II. continens classes quadrupedum et auium, cum disputatione de auium migratione appendicis loco addita. Vol. III. reptilia et pisces.

Cum maior splendidissimaque huius libri editio, in qua omnia animalia, quae in Anglia occurrunt, aeri incisa et viuis coloribus picta sunt, nondum ad manus nostras peruenerit *); de epitome interim huius operis ad Lectores referre constituimus. Continentur vero in ea non solum descriptiones, quibus maioris editionis figurae illustrantur, sed et triginta quinque tabulae aeneae huic editioni adiectae, nonnulla animalia rariora aut in maiore editione omissa exhibent.

Maioris editionis curam nonnulli ex Angliae nobilibus in se susceperunt, eo consilio, ut quaestus e venditione huius libri factus, in beneficium scholarum nonnullarum Walliae, in quibus pueri gratis instituuntur, impenderetur. Auctorem autem harum explicationum, epitomesque, de qua hic agimus, Cl. THOMAM PENNANT esse, qui ex nobilibus

*) Continet tabulas CXXXII, ex quo numero et cum tabulae maioris operis in hac epitome tantum in quadrupedum et piscium classibus citatae sint, coniecimus, reptilia et pisces in maiore editione non reperiri.

libus Walliae est, ex dedicatione et praefatione cognoscimus. Ita vero in hac re versatur Cl. Auctor, ut singulorum animalium descriptioni praemittat genericum et specificum eorum nomen, synonymaque ex optimis Auctoribus collecta, addatque ea, quae circa eorum usum oeconomicum atque historiam naturalem, mores, cet. notanda veniunt. Inprimis magnum adhibuit studium in explicatione locorum, veterum historiae naturalis scriptorum graecorum latinorumque, in quibus animalium, hic descriptorum, mentio fit; quod consilium eo maiore laude dignum nobis visum est, quo densiore caligine tota haec doctrina adhuc tegitur, cum plurimi criticorum, qui Auctores istos explicarunt, parum de historia naturali cognouerint. Dolemus tamen, Auctori Cl. in synonymis conquirendis FRISCHII de auibus opus Germanica lingua conscriptum, ad manus non peruenisse, cum ex PENNANTI observationibus ea inprimis, quae in Frischiano opere adhuc obscura sunt, in aquatiliu auium praecipue historia, illustrari, atque vicissim PENNANTI operis praestantia ex Frischiano augeri potuisset. Quod inprimis de nominibus Germanicis valet, quae in PENNANTI libro eodem modo, ut in BRISSONII ornithologia factum est, maxime corrupta sunt.

Iam ex titulo patet, desiderari in hac zoologia duas adhuc animalium classes, vermes scilicet et insecta, neque ullus suspicioni datur locus, Cl. Auctorem et harum duarum classium editionem moliri. Quadrupeda et aues secundum RAII systema et BRISSONII, pisces vero secundum LINNAEI ordinauit; cetacea tamen et amphibia nantia piscibus addita sunt. Cum vero instituti nostri ratio non permittat, ut omnia animalia, hic descripta, enarremus; sufficiat, ea tantum indicasse, quae in Linnaeano systemate, tanquam classico totius zoologiae libro ad-

huc desiderantur, et eas adduxisse obseruationes, quae prae reliquis notatu dignae nobis visae sunt.

T.I.p.3. Nonnulli equi in Anglia tanto robore pollent, vt
p. 78. pondus 900 – 1000 librarum portare possint. *Mustela putorius* et *mustela furo* coitu miscentur, hybridaque inde species nascitur, quae *mustela furone* fe-

T. II. rociior est, quod etiam in supplementis voluminis

p. 498. secundi magis confirmatur. Hybrida haec species

forte illud animal est, cuius figuram Cl. BUFFON, qui tamen haec duo animalia inter se misceri negavit, *Furet-Putois* vocauit *). Recte monet Noster

Ill. LINNAEUM *mustelam vulgarem* (est *mustela supra rutila infra alba* BRISSONII, quam Germani *Wiesel* vocant) cum *mustela erminea* confundere,

eundemque *mustelam vulgarem*, quando hyemali tempore alba facta est, nomine *mustelae niualis* describere.

Differunt vero *mustela erminea* et *vulgaris* in eo, quod *erminea* duplo maior sit, atque longiorem et crassio-rem, magisque pilosam caudam habeat,

quae in apice nigra est; cum *vulgaris* species vix vnum alterumque pilum nigrum ostendat. Vtraque species hyemali tempore alba fit. In *mustela vul-*

gari summitates aurium et extremitates digitorum colorem ex albo flauescentem habent. *Erminea* in

p. 99. campis et syluis habitat, rariusque aedificia intrat, in quibus *vulgaris* frequenter occurrit. Speciebus *muri-*

rini generis a LINNAEO descriptis, additur *mus Noruegicus* (*Surmulot* BUFFONII **), qui tamen in Scandinauia non occurrit. Monet quoque hac occasione Noster, *murem rattum* non, vt LINNAEUS asserit, ex America in Europam, sed ex Europa in Americam translatum esse.

Ex

*) Vid. BUFFON Hist. natur. Vol VII. p. 225.

**) Vid. Hist. nat. Vol. VIII. p. 206. vid. Com. nostr. Vol. X. p. 306.

Ex auium historia notamus *vulturis* speciem, p. 131. quam LINNAEUS *albiullam* vocat, licet rostrum magis rectum sit, quam in reliquis falconibus, tamen cum caput et collum pennis tegantur, ad *falcones* EIUSDEM pertinere. Adduntur quoque plures falconum species, vt 1) *falco gyrfalco* (*gerfault* BRISS.) qui p. 136. a *gyrfalcone* LINN. differt; 2) *falco peregrinus*; 3) *falco griseus* cuius speciei mas est *le faucon à collier* p. 147. BRISS. et foemina *le lanier cendré* EIUSD. et 4) *l'ermillon* BRISS. Noua quoque species *strix auriculis breuib* esse videtur. Reliquae auium species, quae in systemate Linnaeano non occurrunt et in hoc volumine describuntur, sunt: *la pie griech* p. 164. *rouffe* BRISS. *bonasa scotica* EIUSD. et *columba turtur* (*la tourterelle* BRISS.) p. 222.

Secundo volumine auium enumeratio continuatur, ex qua sequentes species notamus: 1) *Alauda campestris minor*, quae digitum posticum breuem habet; 2) *alauda rubra* EDWARDI; 3) *alauda cristata minor* BRISS.; 4) *alauda salicaria*; 5) *rubetra Anglicana* BRISS.; 6) *motacilla flaua* EIUSD. quae a *motacilla flaua* LINNAEI differt; 7) *linaria* siue *fringilla cannabina maior*; 8) *linaria montana*; 9) *emberiza niualis minor*; 10) *scolopax Lapponica minor*: *limosa* BRISS.; 11) *le cheualier rouge* EIUSD. 12) *tringa cinerea* BRÜNNICH. ornith.; 13) *tringa macularia maculis nigris*; 14) *colymbus minor* BRISS.; 15) *uria minor*, quae ad *colymbum troile* LINN. accedit; 16) *colymbus caudatus stellatus*: *plongeon à gorge rouge*, à *gorge noire*; 17) *cataracta cephus*, BRÜNNICH.; 18) *gauia hyberna* BRISS.; 19) *anas clypeata pectore rufo*; 20) *anas rufa rostro pedibusque cinereis*, Faun. Suecic.; 21) *anas capite griseo*: *glaucion* vel *morillon* ALDROV. Accurato examine instituto, Cl. Auctor cognouit, in *loxia curuirostra* mandibulam superiorem non mobilem esse. p. 471.

Auis

p. 280. *Auis arctica* ab EDUARDO depicta, a laro catar-
 p. 418. *raete*, ad quem Ill. LINNAEUS EDWARDI figu-
 ram retulit, differt. In fine huius voluminis annē-
 p. 505. xa est brevis de migratione auium Britannicarum
 dissertatio, qua eae, quae in Britannia nidificant, vel
 hyberno tantum tempore accedunt, aut discedunt,
 indicantur. In figuris, quae ad haec duo priora vo-
 lumina pertinent, delineantur: 1) *lupus*, 2 a) *ca-*
stor fiber, 2 b) in tabula aenea delineantur auium
 characteres, 3) *vultur albiulla*, 4) *falco gyrfalco*
 BRISSONII, 5) *falco palumbarius*, 6) *ardea cine-*
rea, 7) *ardea alba*, 8) *solopax arquata*, 9) *rallus*
aquaticus, 10) *rallus crex*, 11) *cataraeta cepphus*
 BRÜNNICHII, 12) *coracias garrula*, 13) *coruus*
caryocatactes, 14) *turdus roseus*, 15) *ardea grus*,
 16) *ardea garzetta*, 17) *ardea minuta*.

In volumine tertio reptilia et pisces continen-
 tur. Reptilium classis amphibia reptilia et serpen-
 tia LINNAEI tantum continet, nantes enim ad
 pisces cum cetaceorum ordine ex quadrupedibus re-
 feruntur. *Vipera Anglica nigricans* PETIVERII seu
 p. 18. *coluber prester* LINNAEI est varietas tantum vul-
 p. 43. garis speciei, quam LINN. *colubrem berum* vocat. De-
 scribitur quoque hic *balaenae* species, capite rostrato,
 (beak-headed whale) dentibus nullis, fistula in ver-
 tice, apertura semilunari; aliaque noua, vt videtur,
 p. 44. *physeteris* species, capite maxime obtuso (*blunt hea-*
ded cachelot) dorso impinni gibberoso, fistula in rostro.
 p. 61. *Petromyzon branchialis* non branchiis piscium adhae-
 ret, sed in luto et fundo fluuiorum habitat. In
 p. 63. *raia bati* numerus ordinum aculeorum in cauda va-
 p. 72. riat. Spinas *raiae pastinacae* et *tetrodontis lineati*
 venenatas esse negatur. *Squali* species indicatur, quae
 p. 78. *the basking shark* hic vocatur et *squalus maximus*
 LINN. esse videtur, cum piscatores ad maiorem pin-
 p. 86. nam analem non attendisse verosimile sit. *Vulpes*
marina

marina (the sea-fox) hic descripta est *chimaera mon-
strofa* LINN., cuius synonymum Auctor omisit.
Squalus stellaris LINN. ex Cl. PENNANT mente p. 89.
mera tantum varietas est *squali caniculae*. Additur p. 92.
quoque noua squali species a Cl. BORLASE histo-
riae naturali Cornubiae inserta, quae *the porbeagle*
dicitur, nec non alia *lophii piscatorii* ex eodem Au- p. 95.
ctore. *Syngnathum acum* et *syngnathum typhlen* Cl. p. 108.
Auctor coniungit, *syngnathum ophidion* vero pecu-
liarem speciem esse contra GRONOVIVM defendit.
Muraenae anguillae et *muraenae congri* differentia, non p. 116.
consistit in rostro tentaculis duobus ornato, quae in
congro reperiri varii Auctores scribunt, haec enim
tentacula in vtraque specie adfunt vel defunt; sed,
vt alia taceamus, in linea laterali ex punctis albida
potissimum quaerenda est. *Leptocephalus* GRONO- p. 125.
VII, quem Auctor Noster in honorem amici sui, qui
hunc piscem detexit, *the Morris* vocat, fusius hic de-
scribitur. *Blennius phycis* LINN. ad *gados* ob for- p. 158.
mae maiorem cum his similitudinem reducitur. *Ga-* p. 164.
pus mustela maculata RONDELETTII (the spotted
whistle fish) a *gado mustela* LINN. qui brunum co-
lorem habet (the brown whistle fish), distinguitur.
Pleuronectes passer LINN. cum in omnibus cum *pleu-* p. 188.
ronecte fleso conueniat, nisi quod oculos in sinistro
latere habeat, tantum vt varietas eiusdem confide-
ratur. Alius quoque huius generis piscis describi- p. 189.
tur, cuius RAIUS in supplementis mentionem sub
nomine *rhombi laevis Cornubiensis maculis nigris* fecit.
Piscis pulcherrimus et rarissime tantum in mari Bri- p. 201.
tannico reperiundus, qui *opah* hic vocatur ad *chaeto-*
dontes LINN. pertinet. Numerus radiorum in mem- p. 202.
brana branchiostega piscium, qui ad *labri* genus per-
tinent, variat, cum v. c. *labrus tinca* quatuor, aliae vero
species quinque habeant, idemque de radiorum nu-
mero in pinnis valet. Adduntur quoque aliae no- p. 204.
vae

- vae labri species: trimaculatus* scilicet, *lineatus* (striped);
 aliaeque tres species, quas *goldfinny*, *comber* et *cook*
 p. 253. in Cornubia vocant. *Salmonis* speciem, quam *falmu-*
lum RAIUS dicit, non iuniorem salmonem vulgarem
 sistere, sed speciem plane ab his diuersam, pluribus
 p. 293. argumentis ostendit. Ea *clupeae* species, quae Anglis
pilchard audit et quae ad nullam LINNAEI speciem
 referri potest, pluribus a *clupea harengo* differt.
 Corpus minus compressum et magis crassum atque
 rotundum est in priore, maxilla superior resima, in-
 ferior breuior, dorsum magis eleuatum, pinnaque
 dorsalis capite propior, quam in *clupea harengo*, qui
 piscis in vniuersum magnitudine priorem speciem
 superat.
 p. 321. In appendice varia narrantur notatu digna cir-
 ca bufonem quendam, qui per plures (ad 40 et vl-
 tra) annos a familia quadam nutritus, adeo man-
 fuetus factus est, vt se manibus prehendi, nutriri,
 p. 333. varioque modo tractari lubenter permetteret. Alia
 obseruatio pertinet ad vsum, quem bufones viui vl-
 ceri cancroso applicati, praebent, qua de re plura
 profecto experimenta instituenda essent. Narratur
 enim ex literis Cl. PITFIELD bufones, si vlceri
 cancroso admoueantur, statim fugendo auide eidem
 per aliquot nonnunquam horas adhaerere, vsque
 dum mortui aut semimortui decidant. Sub ipsa su-
 ctione pallescunt et vehementer intumescunt, ita,
 vt pondus a drachma vna ad vnciam vnam auctum
 Cl. Auctor obseruauerit. Haec suctio insigne leua-
 men aegris, cancro laborantibus, attulit, exstantque
 relationes, nonnunquam perfectam curationem hoc
 remedio factam fuisse. Monet tamen Cl. PITFIELD
 illud, si omnis humorum massa iam canceri veneno
 p. 340. affecta sit, nullum vsum praestare. *Labri* quoque
 species in appendice describitur, quam *wrasse* Angli
 vocant. Haec radios in membrana branchiostega
 osten-

ostendit quatuor: in pinna dorsali $\frac{20}{37}$ ultimo duplici, in pectorali $\frac{7}{8}$, anali 12, ex quibus 3 priores spinosi, reliqui diuisi sunt. Cauda rotundata est. Color corporis flauus est, maculis aurantiis distinctus.

In tabulis aeneis sequentia animalia delineantur:

1) Lacerta agilis et vulgaris; 1*) balaena capite rostrato, squalus spinax, muraena conger, gadus aeglefinus, cottus scorpius et cyprinus phoxinus; 2) physter capite obtuso; 3) dentes variorum piscium cetaceorum; 4) chimaera monstrosa; 5) lophius piscatorius; 6) syngnathus barbarus, seu acus et syngnathus ophidion; 7) anarrhichas lupus; 8) leptcephalus GRONOVII siue *the Morris* Auctoris et ammodytes tobianus; 9) gadus luscus et minutus; 10) blennius viuiparus, blennius gunnellus et gobioides aphyia; 11) cottus cataphractus et cottus gobio; 12) labridae species quam *ballan* Auctor vocat; 13) mullus barbatus; 14) trigla lyra; 15) salmo alpinus; 16) salmo laietanus; 17) clupea harengus et illa clupeae species, quae Anglis *pilchard* audit.

III.

CAROLI STRACK, Med. Doct. et in Vniuersit. Moguntin. institut. medic. P. P. observationes medicinales de morbo cum petechiis et qua ratione eidem medendum sit. Carlsruhae ex officina aulica Macklotiana. 1766. 8. pl. 20.

Cum iste morbus anno 1760 et sequentibus in vrbe agrisque Moguntinis grassaretur et per aliquot annos multos raperet aegros, omnem impendit huic morbo medendi operam Cl. STRACK et quadringentas aegrorum, quorum curam habuit, collegit historias, ex quibus dein hic liber confectus est.

est. Describit enim in eo, ex solis obseruationibus, accurate et assidue collectis, nato, morbum cum petechiis; epidemice grassantem, vna cum aliis morbis accessoriis, eiusque causis, symptomatibus atque signis persecutis et expositis nonnullis huius morbi historiis, petechiarum sedem ac naturam atque iis medendi rationem veram et falsam, ostendit.

p. 9. Ac primum quidem quaerit Cl. Auctor: an et quando petechiarum morbus sit? ardua enim inter medicos orta est disputatio, vtrum per se contingant petechiae, an arte e. g. calefacientibus medicamentis et calido regimine, fiant? sed esse petechias vere a natura productas iisque laborasse aegros, quibus omne calidum regimen et medelam denegaue-
rat, probat Noster exemplis et numerat praecipue hoc morbi genus inter morbos castrenses.

p. 14. Tum notas morbi petechialis persequitur. Symptomatibus, aliis morbis nec minus communi-
bus et pro varietate aegrorum variantibus, missis, alii hebetes bardique sunt, interdum vrina viridis et subnigra est atque sedimentum flauum praecipitat, et ab ipso morbi principio putridum alui est proflu-
vium. A nonnullis, morbo incipiente, dolor acu-
tus iuxta costas spurias vel infra easdem pleuriticus animaduertitur et aliis leuis in cute est aurigo.

p. 16. Ab initio difficilis est cognitu hic morbus; no-
no autem die, quandoque etiam tardius in extrema
cute maculae, pulicum aut pediculorum (inde et
pediculae appellatae sunt a nonnullis) morsibus, abs-
que tamen areola, similes apparent. Saepe septimo
die, nonnunquam altero die accedunt, interdum ab
initio morbi adfunt. Nihilominus autem, siue ocy-
us siue serius eruperint, mitius se habent aegri.
Occupant plerumque eas corporis partes, quae mol-
lem tenuemque habent cutim, vt circa collum,
mammas, in extremitatibus, superioribus praecipue,
circa

circa musculum bicipitem, potissimum vero a flexura cubiti ad carpum usque. Atque tum interna carpi pars, nec non reliquae partes corporis solent a petechiis esse liberae; saepenumero autem totum corpus ad caput usque infra mentum retroque auriculas occupant.

Sunt autem petechiae maculae parvae, rotundae, seminis papaverini, nonnunquam etiam milii latitudine, diffusae, circumscriptae, interdum confluentes, profunde ut ex liuido rubrae, in aliis roseae, in aliis liuidae, potissimum iuxta internam carpi cutim, ubi multae conueniunt venae, splendentes, quasi vitreae. Cineraceas, quas quidam volunt, non vidit Noster. Citius et tardius euanescent; viginti duos enim imo quadraginta dies interdum petechias adfuisse notauit, interdum reuersae sunt et post annum. Alias mala et graua, alias bona et leuia concomitantur symptomata. Vidit enim Noster petechias sine febre, nec vlla corporis infirmitate. Nec minus autem febrim, ante eruptionem petechiarum praesentem, mitigari post earum eruptionem, imo, nisi praepeditur febris, intendi, (quare et illud exanthema Nostro non criticum videtur), et aegros sphacelosos exstingui, petechiis cutem adhuc occupantibus, obseruauit.

Commemoratis eorum signis, qui moriuntur et qui sanitati restituuntur, explicat Noster nomina quaedam, quae imposuit diuersis petechiarum supra nominatis speciebus, et *circumscriptas* eas appellat, quae aequaliter rotundae sunt, nec limbo excedunt, sed circulo quasi sunt circumdatae. Atque haec species maxime est communis. Aliam nominauit *diffusas*, quae neque rotundas, neque aequales habent maculas, sed hinc inde sparsas. Hae circumscriptis sunt peiores, partim quoniam in se sunt extiosiores, partim quoniam medicum non valde at-

tentum fallunt. Sunt enim pallidiores ideoque non adeo distincte a medico possunt animaduerti. Solet porro in istis diffusis largum ex naribus sanguinis tenuissimi profluuium promanare, id quod certissimum mortis est signum et summam humorum prodit resolutionem. Quo facto, monet Cl. Auctor, et multos eodem tempore, quo petechiae grassabantur, simili modo absque petechiis aegrotasse, quos eodem modo, uti infra monstrabitur, tractari oportet, ut petechiae praecaveantur. Hi morbi autem intercurrentes appellantur. Tandem cum SYDENHAMO, morborum epidemicorum miasma tempore et saepe eundo mitescere rato, et hoc in petechiis animaduertit.

P. 31. His consideratis, proponuntur a Nostro variarum curationum experimenta. Vfus enim est methodo antiphlogistica et refrigerantibus cum regimine iusto et venaesectione; nihilominus autem petechiae prouenire sine ullo leuamine aegri et symptomatum cessatione. Aliis camphoram et diaphoretica aliaque exhibuit sine fructu. Tum constituit, primas vias aggredi et dedit laxantia aequae ac purgantia, diagrydium e. g. et ialappam, interpositò decocto refrigerante, multo cum fructu. Quibus enim exhibitis, magna putridarum fecum copia sensim est eiecta et symptomata partim mitigabantur, partim penitus cessabant, et petechiae vel plane non, vel parum apparebant. Quare omnes aegros dein, neque febris, neque delirii, neque surditatis, neque soporis, nec vlla temporis habita ratione, medicamentis purgantibus curauit. Commemorat ideo obseruationes, ex quibus patet, hanc medendi methodum semper ex voto successisse. Inter quas hoc vnicum tantum notemus, chronicae scabiei superuenisse petechias, ita ut scabies remaneret.

His

His observationibus praemissis, disquirat Cl. Au-P. 69. Auctor, quae causa petechiarum et qua ratione ipsi morbo sit medendum? et affirmat, petechias neque excitari posse calido regimine et omnino minus apta curatione, neque criticas esse, sed per se existere et solummodo pendere a putrida vitiationum ciborum siue vermium aut viuorum aut mortuorum, seu aliis colluuii corruptae collectione, in infimo ventre confluente et latente. Quam ob causam pauperiores ob boni cibi defectum plerumque in hunc morbum cadunt, et quamquam hic morbus epidemice grassabatur inter milites, quibus valde communis est ideoque a Nostro militaris dicitur, tamen infimos milites magis eodem affectos esse, quam superiores, Cl. STRACK observauit. Quae omnia, etiamsi iam ex superioribus declarantur, denuo observationibus illustrat, ex quibus, data emetica, laxante purganteque medicina, et interdum enematis, multam putridam humorum copiam, per os et anum eiectam, et vrinam, iumentorum ad instar, misit, nec non in aliis sudorem largum acidum erupisse et aegros ita seruatos esse elucet. Ac eos, qui dysenteriam ante habuerant, petechiis non laborasse animaduertit. Ex his itaque concludit, petechias nunquam criticas esse, sed signum multae impuritatis in infimo ventre, easque non prius fieri, ac si earum miasma cum putrida colluuii, in imo ventre latente, coiuit, nec aliter iis esse medendum, quam ventre ab istis iniquationibus liberato.

In qua corporis parte petechiarum miasma residet? disquirat Cl. Auctor, quaerens: cur petechiae aegrorum cutem occupent? vtrum earum miasma ipsum sanguinem intret eundemque vitiet, an vero illud in infimo ventre decumbat, maneatque, vel ex eo loco in caeteras corporis partes transeat? atque respondit: apparere in cute potissimum petechias,

chias, quoniam miasma petechiale cum corrupta illa materia, imum ventrem petente, coiuit, minime vero, quoniam miasma communicatum est cum ipso sanguine. Id quod multis argumentis confirmat Cl. STRACK, ex quibus quatuor tantummodo commemoremus. Ac primum quidem, cum petechiae, purgato ventre, euanescent, dein, qui puritati infimi ventris consulunt, suscepto miasmate, petechiis non laborent, porro cum multi eodem morbo absque petechiis sint affecti, ac tandem cum ipsa febris, petechiis vel euanescentibus, diu continuet propter relictas adhuc ventris impuritates. Quae omnia denovo illustrat observationibus; ex quibus et hoc patet, quod supra Cl. Auctor dixit, petechias interdum sine febre adesse, nec pendere illas ab aestu febris, nec raro plane abesse.

p. 133. Ex qua corporis parte febris ordiatur? incalesciente impura infimi ventris colluie per se, eaque cum petechiarum miasmate sese communicante, vicinae partes circum accenduntur, atque tum febris, quae continuo exardescit, nec remittit, excitatur. Potissimum autem eam materiam inesse intestinis patet ex eo, quod emetica non tam putrida, quam laxantia expellunt, et ii, qui ex naturae beneficio sanantur, non vomitu, sed alui profluuium conualescunt, quoniam eorum vrina turbida, iumentorum ad instar, est, eaque semper signum certum materiae putridae in intestinis est; quoniam aegris abdomen dolet ac tumet indeque laboriose spirant et anguntur, et quoniam tandem omnes, qui pereunt, intestinorum habent sphacelum, etiamsi alia viscera, antea iam labefactata, ab eo quoque non libera sunt, nec immunia a muci collectione, qui saepe, fibrarum integritate visceribus interioribus restituta, excutitur, atque in intestina, ut commune aliquod receptaculum, dimittitur, et ex iis depellitur.

Atque

Atque in visceribus muco tenaci repletis, dum P. 141.
 explicat symptomata, videtur Nostro causa posita esse, cur interdum diu duret febris et tardius progrediatur morbus. Oculorum rubor, sopor et surditas sunt bona signa. Sudor, siue ab initio morbi, siue cum febre, siue, finita febre, erumpat, non criticus est, sed oritur ex repletionem nimia ac impura infimi ventris. Tussis cum expectoratione muci, pleuriticorum instar, proficiscitur a muco, ex intestinis in sanguinem conuerso, perinde ac infantes, quorum venter muco et vermibus est impletus, sine febre tussunt. Articulorum dolor in pedibus, potissimum circum malleolos et in talo, saepe ad manus, interdum in humero cubitoque iis est communis, quorum morbus diu durat et difficilis est, vel ex ventris impuritate, vel ex conuersione eiusdem materiei ad eos artus. Finita febre, mitescit quidem, non autem desinit, quin quadraginta dies adhuc post remansit, donec omnia erant purgata infimi ventris viscera, ac ii, quorum morbus reuertitur, diaeta neglecta, iterum experiebantur hos dolores, si antea adfuerant. Horum symptomatum explicationem nunc Noster observationibus illustrat, ex quibus, dato purgante eoque repetito, haec symptomata sese levasse, ac inprimis articulorum dolores, nec vlllo alio siue externo, siue interno remedio, quibus Cl. Auctor multis usus est, cessasse elucet.

Curatione itaque petechiarum praemissa, Cl. Au- P. 184.
 Auctor agit de vitiis, quae petechiarum morbo saepe vel superueniunt, vel ab eodem supersunt. Superueniunt enim petechiis aliae corporis morbosae mutationes, quarum potissimum tres sunt: febris nimirum intermittens, hydrops et in externo corpore abscessus. Obseruauit enim Cl. Auctor, partim in ipso petechiarum morbo, ardore febris quodammodo remittente, nouas febriles accessiones quotidianas

siue tertianas, superato petechiali morbo, iterum evanescentes, partim petechiis desquamatis. Hae febres iis plerumque accidebant, qui nimium inprimis carniū et durorum ciborum, vt caseum et lactucam, brassicam, comedebant indeque infimi ventris impuritates iterum colligebant, nec quidquam praeter laxantia remedia iuuabat. Hydropem purgantibus in principio non discuti, sed, subductis omnibus impuris per purgantia, largum vrinae sequi profluuium, quo superflua aqua ex corpore expellitur, Cl. Auctor refert. Quod tandem abscessus attinet, quos multi, vt criticos, intuentur, ad parotides, porro bubones, furunculos et exulcerationes iuxta articulos, nihil in hoc morbo iuuant ideoque pro criticis haberi nequeunt. Oriuntur enim, finito morbo, et sunt indicium relictæ adhuc in infimo ventre materie putridæ. Id quod patet ex eo, quod ii, quorum venter satis est depuratus, nullos habent abscessus, nec vllō alio modo ipsi abscessus, quam laxante medicina, sanari possunt.

p. 216. Quo factō, diuersa curationum genera examinat, quibus diuersi vtuntur Auctores, et quae potissimum his tribus continentur: refrigerantibus nimirum, aromaticis remediis et cortice Peruuiano. Ad refrigerantia simul cum venaesectione et enematibus refrigerantibus, ex fero lactis cum nitro et melle compositis, acida mineralia et vegetabilia refert Noster. Alii dant camphoram, sal ammoniacum eiusque spiritum, theriacam, radicem serpentariae Virginianae, nec non vesicatoria applicant, hisque omnibus sudorem excitare tentant. Sed omnia hic posse adhiberi et a se ipso esse aegris, si necessitas postulauit, propinata, largitur quidem, purgatis tamen antea, iteratis vicibus, primis viis. Alias, praesertim ab istis aromaticis, febris et viscerum gangraena, quae sponte his in morbis oritur, facilius ac citius

tius excitatur. Quapropter omnia haec ab initio reiicit, quoniam petechiae nunquam pro criticis habet, nec earum causam in sanguine, sed in imo ventre Noster quaerit. Haec, quae sentit, Cl. Auctor observationibus denuo illustrat, ex quibus elucet, cessasse quidem petechias interdum, his, supra nominatis medendi methodis, sed ventris magnum tumorem remansisse et, nonnullis diebus praeterlapsis, aegros iterum male sese habuisse, petechiasque rursus apparuisse. Dato autem laxante eoque repetito, curatio felicior successit. Commemorantur quidem a Cl. Auctore observationes, ubi cortice Peruuiano adhibito saepeque immixtis clysmatibus, aegri sine laxantibus sunt sanati largo alui profluuiio. Sed sanationem hanc eatenus tantum tribuit cortici, quatenus diarrhoeam, a natura excitatam, simul cum clysteribus adiuuit. Omnino autem superuacaneus videtur Cl. Auctori corticis vsus, si petechiae sunt circumscriptae et impura colluies solis in intestinis residet. Quod si vero diffusae sunt, cumque iis mucus tenax in infimi ventris visceribus haeret, et morbus diu durabat, aut si materiei impuritas vnam tantum alicuius intestini partem occupat, ob metum gangraenae cortex simul in auxilium est vocandus, sed, victa gangraena, iterum ad purgantia est confugiendum.

Si petechiae cum alio quodam morbo conueniunt, quomodo sit succurendum? possunt petechiae, alio morbo iam praesente, in cute sese monstrare, febre nimirum intermittente, variolis, dysenteria, potissimum iis morbis, qui epidemice tum homines invadunt. Quemadmodum enim diuersa morborum miasmata in eodem aëre simul esse, sic et varii morbi in vno eodemque corpore vno eodemque tempore oboriri possunt. Ita aestate anni 1761. petechias, morbillos, variolas, febres scarlatinas, purpuram,

dyfenterias et febres intermittentes, populares esse Noster obferuauit. Supra iam annotauimus, intermittentem, petechiis praefentibus, poffe interdum excitari, hic uero Cl. Auctor exempla commemorat, ubi petechiae ad aegros, febre intermittente laborantes, accedebant. Tum purgantia funt danda, donec petechiae, ut fignum putridae materiae in imo ventre, cellant, dein febris aut reliquorum morborum, fupra dictorum, quibuscum petechiae fimul apparent, nifi per fe definunt, ratio eft habenda. In paroxyfmo febris intermittentis, Noster animad-vertit, petechias nec rubras, nec plures fuiife, quam intermiffionum tempore, ex quo id, quod fupra affirmauit, denuo demonftrat, petechias non fieri a calore. Porro notandum eft, aegros variolis et petechiis fimul affectis, non peius fe fe habuiife, quam qui fimilibus variolis abfque petechiis laborarunt, nec quidquam remanfiife.

p. 276. Finit Cl. Auctor hunc tractatum cum morbis huc ufque intercurrentibus, hoc eft, iis, quibus inter petechiarum morbum, cum is popularis erat, homines afficiebantur. Quorum duo potiffimum addidit Noster genera, vnum quod fine petechiis quidem erat, omnia tamen petechiarum fymptomata et notas habebat; alterum, quod aliqua folummodo petechiarum indicia prae fe ferebat, plurima uero diuerfa, potiffimum cum pleuritidis fignis communia, complectebatur. De illo egit iam Cl. Auctor in praecedentibus et nos quoque pauca fupra decerpimus, de hoc autem iam dicit Noster, ex quo nunc quaedam feligemus. Anno 1762 enim exeunte atque anno 1763 incipiente, pace reftituta, cum reuertentur milites multique horum terras Moguntinas peterent, ibique aliquamdiu commorarentur, rurfus petechiarum morbus, qui, antecedente aestate ac autumnno, defierat, iterum graffiari incipiebat.

Erat

Erat enim antecedentibus mensibus ab augusto ad nouembrem tempestas pluuiosa ac perhumida cum densis saepe nebulis; quibus, emollitis et relaxatis corporibus, ea multum mucī collegerunt, qui tandem in putredinem abiit atque vagum morbi miasma recepit. Multi itaque aegri, praeter eos, qui cum et sine petechiis decumbebant, eodem tempore pleuritide laborabant, quam a simili causa, a qua ipse petechiarum morbus prouenit, ortam cum videret, eadem ratione curari oportere, qua petechiae, Cl. Auctor apud animum constituit. Nam, instituta et reiterata venae sectione, impositis fomentis emollientibus vesicatoriisque applicatis, nec minus datis iulapiis refrigerantibus et decoctis emollientibus cum nitro et oxymelle scillitico, quae alias pleuriticos iuuant, nihil effecit Cl. Auctor, sed delirio quinto die accedente, gangraena aegros trucidavit. Incipiebat in his aegris frigus cum acuto lateris vnius vel alterius dolore, cum respiratione densa et tussi sicca, interdum excretionē mucī tenacis et rufae pituitae, quod excipiebat calorem, qui, continuantibus recensitis symptomatibus, vno tenore exarsit. Inter signa, huic pleuritidis speciei praecipue communia, refert Noster, ardente febre, vrinam flauam aut, inclinata febre, rubram seu iumentorum ad instar, sputum non coctum, sed tenax rufum vel rubrum, alui profluuium putridum vel per se ortum vel, inditis enematibus, excitatum, maiorem lassitudinem, quam alias in pleuritide, liuidum quarto die circa oculos limbum, mittimus alia. Haec sunt, quae STRACKIUS habet de petechiis, quas primo FRACASTORIUM, cum annis 1505 et 1528. P. 305. in Italia populares fuerant, tradidisse dicit. Diu iam ante autem eae in caeteris regionibus, vt Cypro et vicinis insulis grassatae sunt. Atque, quoniam HIPPOCRATES, qui et minimorum mor-

Dd 5 borum

borum observationes collegit, illum morbum non habet, eum non fuisse antiquissimis olim temporibus, nec opus esse controuersia cum iis, qui istas aspretudines, morsibus culicum similes, ab HIPPOCRATE in suis de morbis popularibus atque coarcarum praenotionum libris descriptas et a petechiis adeo diuerfas, pro petechiis habent, arbitratur.

IV.

ALBERTI V. HALLER operum anatomici argumenti minorum tomus tertius. Accedunt opuscula pathologica aucta et recensita. Lausannae sumptibus Fr. Grasset et sociorum. 1768. 4. Alph. 2. pl. 3. tab. aen. 17.

Opusculorum anatomicorum Illustrissimi Auctoris pars vltima sequentia habet scripta *).

p. r.

XXXIV. *De monstris* libri duo. Quas inde ab anno 1735 quo primum ediderat *anatomen fetus bicipitis ad pectora connati* **) pluribus minoribus scriptis, opusculis anatomicis ***) et pathologicis ****) insertis, monstrorum variorum descriptiones dedit, eas nunc omnes Ill. Auctor duobus his libris complecti voluit, additis tamen observationibus ex aliis Auctoribus, multo labore collectis. Redegit eas cum suis in systematicum ordinem, pluribusque meditationibus auxit, atque hoc opere sententiam, prioribus scri-

*) De secundo horum opusculorum volumine vide Comment. nostr. Vol. XV. p. 527.

**) In *tempe Helueticis* 1735.

***) v. c. libellus *de feru bicipite*, auctus et emendatus; *duorum monstrorum anatome*; *de fele capite semiduplici*; *de feru cranii experte*; ad LEMERY de monstris obiectiones responsio.

****) *De fabricis monstrosis*; *de renibus coalescentibus et monstrosis*; *de pullo tripede*.

scriptis de origine monstrorum propositam, plurima scilicet eorum, quae in eiusmodi corporibus a fabrica consueta recedunt, non per accidens nata, sed iam in germine ita, qualia in lucem eduntur, delineata fuisse, egregiis atque praecipue ex anatomica eorum disquisitione ductis argumentis, confirmat. Quem quidem laborem sibi fatetur plane fuisse nouum. Si quidem istud opus tractauit eo modo, ut argumenta vtriusque sententiae absque opinionis fauore vlllo ponderaret, liberumque sibi faceret, in eam partem transire, quam cognosceret, maiorem speciem veritatis prae se ferre. Totam vero hanc disputationem Ill. Auctor in duos libros diuisit. Primus phaenomena, tum ex suis, tum ex aliorum observationibus desumpta, continet, quae sunt exempla monstrorum, seu fabricae, a consueta fabrica adeo euidenter aberrantis, ut etiam ignarorum oculos feriat, ex hominibus brutisque, in suas classes redacta. Enarrantur itaque primum vitia cutanea, in variis fetibus obseruata; deinde exempla magnitudinis diuersarum partium, praeternaturaliter auctae, vbi etiam de eo vitiorum genere agitur, quod oritur, si gelatinosus humor, in telam subcutaneam congestus, tumorem format. Porro exempla situs partium mutati, partibus extra cauitatem, in qua latebant, erumpentibus, defectus ossium cranii, alienae fabricae, partium nimiarum vel deficientium, diuisarum vel connatarum, capitis semiduplicis, partium superfluarum, fetuum bicorporeorum, monocephalorum, fetuum aliorum compositorum, atque bicipitum variae species. Addit tandem Ill. Auctor monstra animalium frigidorum, oua monstrosa, plantarumque monstra varia. Noua nobis videtur esse figura, quae pullum tripedem sistit, qui supernumerarium pedem de vropygio suspensum habebat.

Secundus

p. 131.

Secundus liber physiologica corollaria ex observationibus praemissis continet. Quaestionem de causis originis monstrorum eo accuratius examinandam esse, Ill. Auctor monet, quo magis per eam generationis negotium in vniuersum illustrari possit. Veterum enim theoria, monstra per accidens formari, si vera est, apparet, speciosum inde argumentum a defensoribus epigeneseos peti posse. Quodsi vero monstra iam a primo generationis momento talia fuerunt, qualia in lucem eduntur, systemati contra evolutionum multum exinde roboris accedere, quisque videt. Ita vero in sua, quam anno huius seculi tricesimo quinto primum defendit, sententia, vltius declaranda et confirmanda versatur Ill. Auctor, vt primo veterum theoriam recenseat et deinde singulas monstrorum classes examinet atque de singulis definiat, vtrum eae per externam vim, vel morbum ortae sint, an in primis nascituri animalis staminibus iam aliena fabrica adfuerit. Ex causis itaque accidentalibus ortum duxisse putat cutis vitia, magnitudinem partis auctam, defectum integumentorum, plurimasque mutati exempla, nonnullas fabricas alienas, quae ex vi aliqua externa v. c. pressione ortae sunt, partes porro destructas et diuisas nonnullaque partium, inter se coalitarum, exempla. Li contra fetus ex illius sententia iam in primordiis aliter fabricati fuerunt, quibus viscera ita inuersa sunt, vt in bene formato corpore v. c. eae partes omnes in dextro latere sitae sint, quae alias in sinistro latere reperiuntur. Qua occasione curiosius disquirat, num ex humano receptae fabricae corpore, casu quodam corpus vniuersum ita deformari possit, vt cor nunc dextrorsum positum apicem suum habeat, hepar vero in sinistro latere positum sit, e. s. p. Ostendit autem, non solum inuersionis viscerum causam mechanicam nullam reperiri, sed et talem inuersionem non

non accidere potuisse, si prius consueta fabrica iam adfuerit. Porro iam ab initio talia, qualia in lucem eduntur, a consueta fabrica recedentia, delineata fuerunt ea corpora, in quibus vasorum adfunt varietates: quae partes insolitas et superfluas habent, v. c. digitum, vertebra, costam, vbi fufius demonstratur, eiusmodi partes superfluas, minime alius fetus destructi esse reliquias, cum parte fetus superstitis coalitas: androgyni deinde veri: fetus, caput semiduplex habentes: multaque exempla fetuum, in quibus partes coalitae reperiuntur et reliquae monstrorum species, superius iam indicatae. Tandem respondet ad obiectionem metaphysicam, qua Deum nil imperfectum creasse, ideoque monstra non in primis staminibus iamiam imperfecta esse posse, autumant. Docet autem, monstrum dici non posse malum physicum; esse enim fortassis aliquam monstrosae fabricae utilitatem, cum ea in plerisque certe vitam et animi usum non impediat, et praeterea quoque ex ea fabrica sedes animi viaeque circuli sanguinis aliquo modo illustrentur, formaeque infinitae hominum libertatem Creatoris in delineandis archetypis confirmant.

XXXV. *Ad Ill. BUFFONII de generatione the- P. 174.*
oriam adnotationes. Dissertatio haec primum, praefationis loco, ab Ill. Auctore praefixa est volumini secundo versionis Germanicae *historiae naturalis Ill. BUFFONII* *), eaque nunc in latinam linguam translata et aliquantum emendata, recusa est. Notum est Ill. BUFFONIUM in libro modo citato suam de generatione theoriam ita proposuisse **), ut doceat, esse in natura rerum materiam quandam, nutritioni et evolutioni omnium corporum organisatorum proprie destinata, viam et actiuam. Constare

*) Prodiit hoc volumen Hamburgi 1752. 4.

**) *Histoire naturelle* T. II. p. 420.

eam moleculis incorruptilibus, atque illa in organica entia componi, simillima magnis animalibus, vel plantis, in quae recepta sunt. Animal vero esse modulum, in quo materia nutritiua figuram suam accipiat ad eorum similitudinem. Haec materia si vberior adest, quam ad corporis organisati nutritionem vel euolutionem requiritur, liquoris specie seponitur in propria receptacula, testes scilicet in viribus atque ouaria in feminis, continetque ideo omnes moleculas, corpori animali analogas, omnia adeo, quae requiruntur ad formandum ens minus, simile ei, a quo nascitur. Ex commistione vero vtriusque seminis in vtero particulae istae organicae in verum animalculum, parentum simile, ex Ill. BUFFONI hypothese transeunt. In hac itaque theoria examinanda duplex Ill. HALLERO est consilium. Primo vt in veritatem huius theoriae inquirat, ostendatque eam non firmo fundamento niti, deinde vt examinet, num in ea theoria aliquid sit, quod Creatoris iuribus noceat, quod quidem varii Theologi Galliae putarunt. Refellit vero primum hypothese ipsam, quae non noua est, sed cum HIPPOCRATIS sententia convenit, docetque, spermaticas particulas mobiles, quas BUFFONIUS non animalcula, sed particulas organicas esse putauit, materiei productricis, vera omnino esse animalia, hospites putrescentis humoris spermatici. Deinde probat, non posse animal minutissimum ad modulum maximi fingi, neque in vniuersum fetus parentibus esse similes, cum v. c. summa sit vasorum in diuersis hominibus varietas, parentesque partibus careant, quas fetus habet, paterque vno teste orbatus aut artu carens, bene formatum filium generet. Desiderari tandem in Buffoniana hypothese causam, quae particulas istas organicas ita ordinet, vt perfectum nunc ex iis animal componatur, atque in vniuersum semen femininum nullum dari, cui totam

tam fere suam theoriam BUFFONIUS superstruxit, nec adesse in femina, quae nondum concepit, corpora lutea, in quibus semen hoc latere idem putavit. Al-P. 187. Altera dissertationis huius parte ostenditur ex Buffoniana hypothese, nil decedere religioni, quod Sorbonae metus fuit, qua occasione ex perpetua inter ipsam fabricam et fabricae finem in corpore nostro analogia ubique Creatorem agnosci, egregie Ill. Auctor demonstrat.

XXXVI. *De cerebro auium et piscium* *). Ill. p. 191. HALLERUS iam in *elementis physiologiae* **) piscium nonnullorum cerebrum ita descripsit, ut, omnium descriptionibus in unam coniunctis, compendium tantum eorum, quae vidit, proponat. Has descriptiones pleniores nunc et auctas corollariis, collectioni huic inseruit, additis descriptionibus cerebri auium nonnullarum, ut anseris, anatis ferae, atque alius avis aquaticae, quam tringam esse suspicatur. In minoribus auibus cerebrum maximum, in omnibus vero cerebellum cerebro maius esse, vidit, cum thalami nervorum opticorum in auibus a cerebro distincti et remoti deprehendantur. Maior corticis portio, quam in homine, illeque ferme ubique interior, medulla autem exterior est. Ventriculi simplices sunt, non tricornes, corpus callosum deest, et falx durae matris minima deprehenditur. Fornix aliam, quam in homine, fabricam habet; ventriculus vero tertius inter corpora striata latet, cum thalami nervorum opticorum, uti superius indicatum est, a reliquo cerebro separati sint; tubercula tandem quadrigemina et glandula pinealis in auibus deside-

*) Missus est hic libellus ad Academiam Batauam d. 19 febr. 1766. in cuius commentariis *Verhandelingen uytgegeeven door de Holland. Maatschappye* Vol. X. P. I. p. 287 seq. etiam nunc insertus est.

**) Elem. Physiol. T. IV. p. 591 seq.

desiderantur. Thalami neruorum opticorum non solidi sunt, sed cauos sacculos referunt. In cerebello tandem vermis et valuula magna non adfunt, cuius locum eminentia quadrigemina occupat. Ex p. 198. piscibus cerebra hic describuntur cyprini carpionis, tincae, coregoni *ferrat* dicti, lucii, troctae lacustris, troctae alpinae et troctae, quae *ombre cheualier* vocatur, percae, tandemque mustelae. Omnes pisces cerebrum paruum, longum et inferius atque superius in duas columnas, similes fulco, diuisum atque ex medullari et corticali substantia compositum, habent. Inter ipsa vero piscium diuersarum specierum cerebra maxima deprehenditur varietas, cum v. c. in aliis glandula pinealis adsit, aliis autem nulla sit, in nonnullis ventriculis anterior, a quarto diuisus, deprehendatur, alii vero illo careant. Omnes tamen pisces medullam habent et corticem atque cerebellum, per sua crura definitum, cum axi loco arbusculae; neruos porro olfactorios, in quos cerebrum continuatur, et opticos, glandulam pituitariam, calamus scriptorium, commissuras cerebri, thalamos, ventriculos et plexum choroideum, in ventriculis latentem; quae omnia adeo cerebro necessaria esse videntur. Thalami neruorum opticorum, vt in auibus, caui sunt et a cerebro distincti, simili-que modo in piscibus corpus callosum et fornix desiderantur. Dura mater in omnibus piscibus cartilagineam fere naturam habet, atque inter eam et pia mater spatium aliquod est, oleo aut gelatina, in cellulosa telam effusa, repletum, quod probat, duram matrem non organon motus cerebri, aut cerebri inuolucrum, sed cranii periossteum esse. Patet porro ex hac cerebri diuersorum piscium disquisitione anatomica, non esse in cerebro regionem, in qua determinatum aliquod regnum idearum habitet, cum neruus opticus non semper

per ex thalamis, sed etiam in diuersis piscibus ex variis aliis cerebri partibus oriatur. Licet in piscibus, ubi nerui optici decussantur et alter alteri imponitur, nulla sit inter eos coniunctio; summa tamen vnionis horum neruorum in vniuersum videtur esse necessitas, cum etiam in piscibus proxime cerebrum ingentem transfuersam coniunctionem hi duo nerui habeant. Idem fere de ventriculis cerebri, de plexu choroideo, de commissuris, de cerebello aliisque partibus valet, quae in omnibus animalium classibus reperiuntur. Contra glandula pinealis non adeo uecessaria esse videtur, cum in auibis multisque piscibus desit. Summa quoque, quae in diuersis piscium vnus generis speciebus in tuberculis, cerebrum constituentibus, obseruatur, varietas probat, officia cerebri eiusmodi varietatibus non mutari. Glandula pituitaria in piscibus omnibus adest, atque ex ea ad cerebrum neruumque olfactorium productio aliqua accedit, quod Ill. HALLERO suspicionem mouet, etiam in aliis animalibus hanc glandulam medullam aliquam cerebro addere.

XXXVII. *Sermo primus: de oculis quadrupedum* p. 218. *et auium, ad Academiam Gottingensem missus anno 1765.* Ill. Auctor opportunitate ruris vsus, Rupe per aliquot annos multum in disquisitione anatomica oculorum diuersorum animalium occupatus, compendium eorum, quae in piscibus vidit, in commentariis Academiae regiae scientiarum Parisinae edidit *). Hoc vero et sequenti commentario omnia, quae in animalibus varii generis reperit, fusius nunc enarrat, a quadrupedibus et auibis exorsus. Ex quadrupedibus vero tantum oculos bouinos, ouinos, ibicis, rupicaprae, felis, lupi, catelli nuper partu editi,

*) Vid. Memoir. de l'Acad. des scienc. année 1762. p. 76. Comment. nostror. Vol. XV. p. 457. seq.

editi, melis, porci, porcelli, leporis et cuniculi dissecti, horumque oculorum omnium descriptiones accuratissimas et subtilissimas hic communicat. Omnium quadrupedum oculi globum fere referunt, corneaque eorum conuexa est, minus quidem, quam in auibus nocturnis esse solet, magis tamen, quam in piscibus. Nullam, praeter scleroticam, retinam et chorioideam, membranam habent, atque ex his prior nunquam cartilaginea, ossea, aut pellucida reperitur. Chorioidea vero duabus laminis componitur, quae nunquam sponte a se inuicem secedunt. Ex harum laminarum interiore in omnibus quadrupedibus processus ciliaris oritur, duplicatis iugis factus, quae ope muci nigri ad lentis capsulam agglutinantur. In omnibus iris pene circularis est et ab vnea vix separari potest; mobilis praeterea est et a maiori luce contrahitur, quae vis contractilis nonnunquam etiam post mortem iterum a calore excitatur*). Striae quoque in omnium retinis reperiuntur longitudinales, nullae autem circulares. Sub vnea et ciliari processu in omnibus, albo cuniculo excepto, mucus reperitur, qui annulo ciliari instratus, coronam figuratam format. Humor aquosus copiosus, et vitreus magnus est, crystallinus vero multo minor et in anteriore superficie fere planus est. Eum vnica arteria adit ex centrali orta, quae vitreum humorem perforat. Retina ex arachnoidea, quae in nonnullis animalibus vt fele, porco, lepore, fibras habet, et alia pulposa membrana componitur. Nervus opticus in ingressu semper rotundus et depressus, neque a scleroticae apertura remotus est. Omnia quadrupeda in retinae interiore superficie rubra vasa habent, quod iis proprium est; atque in omnibus quoque membrana cribrosa in nerui optici fine posita, eius medullares fasciculos transmittit. In nonnullis,

*) In fele iuniore vid. Comment. nostr. l. c. p. 462.

nullis, vt in mele, porco, cuniculo, retina annulo mucoso subiecta et annulo striato imposita ad lentem crySTALLINAM producit. Solis porro quadrupedibus annulus ciliaris lentem crySTALLINAM ambit, inter duas laminae membranae vitreae interceptus. Musculi oculi fere in omnibus conueniunt, habentque omnes musciculum bulbosum, qui in homine deest. Discrimina, quae non adeo magna sunt, omittimus. Adduntur corollaria physiologica, ex quibus notamus: hypothesin MARIOTTI, qui chorioi-P. 234. deam visus esse organon adsumsit, cui multi Gallici physiologi accesserunt, ab ill. Auctore obseruationibus de interna chorioideae lamina et nigro mucro, qui retinam obducit, refelli: corpus ciliare non lenti crySTALLINAE innasce, sed mucro nigro adglutinari, atque eam ob causam non lentem mouere posse, sed illum vna cum tunica vitrea, quae etiam lenti adhaeret, in situ suo seruare: iridemque tandem non a chorioidea oriri; quod ex fabrica huius partis in lepore confirmatur.

Has descriptiones oculorum quadrupedum dis-P. 235. sectiones oculorum variarum auium, vt milui, ardeae, anseris, anatis, anatis ferae, gallopauonis, gallinae, columbae, corui, gallinaginis, picae, noctuaeque minoris excipiunt. In corollaris ill. Auctor-P. 249. monet: in auibus a retina ad lentem tenuiorem propaginem porrigi: nullum eas annulum striatum habere, sed corpus ciliatum fere, vt in quadrupedibus, fabrefactum esse; neruum opticum, vbi in oculum ingreditur, acuti anguli figuram habere, ex eoque partem singularem, alterne plicatam, vitreo corpore contentam oriri, quae in nonnullis auibus, in anse v. c. anate, gallopauone cet. manifeste lenti adhaeret. Retina etiam, vt in quadrupedibus, exterius nigro mucro obducta est, osseusque circulus corneam ambit. Duabus quoque laminis retina

componitur, fibraeque in ea in nonnullis auibus conspiciuntur. Corpus ciliare etiam in auibus ad lentem muco nigro adhaeret. Oculorum figura in aquaticis et graniusculis plana est; in rapacibus cornea valde conuexa deprehenditur, quod et de noctua valet, in qua cylindrus super scleroticam eminet, et iris a chorioidea membrana diuersa est.

p. 250. *Secundus de piscium oculis sermo, ad Gottingensem Societatem an. 1766 transmissus est. Describuntur in eo oculi salmonis, variarum troctarum, lucii, cyprinorum variorum, correboni, mustelae fluuiatilis, percae et tincae, de quibus omnibus praecipua iam alio loco adduximus *)*

p. 263. XXXVIII. *Strena anatomica nuperrimarum nempe observationum ex theatro Gottingensi fasciculus **).* Gottingae d. I ian. 1740.

p. 263. XXXIX. *Quod HIPPOCRATES humanae anatomes non fuerit imperitus Gottingae 1737 ***).*

p. 272. XL. *De amoenitate anatomes oratio, dicta Gottingae 1742 ****).*

p. 277. XLI. *Opuscula pathologica, quibus sectiones cadaverum morbosorum continentur. Cum de egregia hac observationum, in morbofis cadaueribus institutarum, collectione, iam tum temporis, cum primum in lucem prodierat, ad Lectores retulerimus *****); nunc ea tantum exponere nostri officii esse duximus, quae in hac noua editione addita sunt. Et in praefatione quidem Auctor Ill. sua circa sensibilitatem experimenta, ac ea, quae de irritabilitate artiarum dixit, quae vasa ei non euidenter ad stimulum contractilia esse videntur, contra Cel. v. DOE-*

VEREN

*) Vid. Comment. nostr. loc. cit.

**) Vid. opuscul. anat. p. 315 seq.

***) Vid. ibid. p. 133. seq.

****) Ibid. p. 327. seq.

*****) Vid. Comment. nostr. Vol. IV. p. 80.

VEREN *) eiusdemque discipulum Cl. VERSCHUUR **) defendit, ostenditque, Cl. viros fere eadem in suis experimentis vidisse, quae ipse vidit. Addit, in experimentis, circa arteriarum irritabilitatem factis atque ad physiologiam et pathologiam traducendis, probe perpendendum esse, effectus stimuli, a ferro lancinante orti, non cum stimulo sanguinis comparari posse, seque arteriis minimis vim insitam et nerveam non eripere, sed tantum adserere, in experimentis has partes, stimulo minus obediētes, quam musculos et intestina sibi apparuisse. Annexa sunt noua scriptorum variorum testimonia, quae insensibilitatem pleurae, durae matris, tendinum cet. confirmarunt.

Non solum vero obseruationes, in cadaueribus institutae, in hac noua editione sequentes accesserunt, sed et in fine additae sunt plures historiae curationum grauissimorum morborum, ab Ill. Auctore factarum.

Obs. 3. Fusus plusculis mensibus in sinu frontali P. 283. *haerens ***).* Plurimi post CELSUM Auctores docuerunt, vulnera sinuum frontaliū perpetuo aperta manere. Hoc tamen non semper accidere probatur obseruatione, in puella facta, quae fusum sibi in frontem impegit, cuius frustum post nouem tandem menses de sinu frontali exiit, vulnusque facile firma cicatrice clausum est.

Obs. 4. In cerebro feminae sexagenariae, quae P. 284. *apoplexia sanguinea interiit, fere omnes partes in sinistro latere nigro coagulatoque sanguine obiectae, ventriculusque huius lateris eodem humore reple-*

E e 3

tus

*) Vid. EIU S D. Obseruat. academ. pag. 208. Comment. nostr. Vol. XIV. p. 163.

**) In diss. inaugur. de arteriarum et venarum vi irritabili. Groning. 1766. 4.

***) Est programma Gottingae 1738. editum.

tus erat. In dextro tamen ichor tantum cruentus aderat, quod ventriculos hos minime inter se communicare probat.

Obs. 16. quae *peripneumoniae ex transudatione sanguinis* exempla adfert, noua aliqua historia aucta est. viri, peripneumonia diu laborantis, in quo sanguis, ab obstructo pulmone exclusus, in ventriculum et intestina exsudauerat. In cadauere alius viri, subito extincti, vix vitium inuentum est, cui mors tribui potuisset. Ventriculus tamen subruber paullulumque inflammatus, cruentae lymphae aliquid continebat.

p. 298. *Obs. 18.* In *studioso, ex morbo pectoris enecto*, pulmo sinister superius vlceratus erat, plenusque scirrhis. Haec pars pulmonis in aqua fundum vasis petebat, reliquus vero natabat.

p. 299. *Obs. 21.* Puer 17 annorum intra breue tempus magnum incrementum expertus erat, cum morbis variis, quorum sedes in pectore erat, v. c. pleuritide, haemoptoë. In eo pulsus totum fere pectus occupabat, aegerque vrinae quoque suppressione laborabat. Tandem, accedente oedemate pedum sanguineque per os reiecto, extinctus est. In eius sectione Ill. Auctor vidit cor totum pectus ita occupare, vt pulmo sinister, in minimum spatium compressus, lateret. Sinus cordis dexter etiam vehementer dilatatus, aortae vero magnitudo non aucta erat; caro cordis attenuata, pulmonesque nigri, compacti, eorumque cellulae sanguine repletae deprehendebantur.

p. 305. *Obs. 25.* In femina triginti circiter annorum, dysenteria laborante, triduo ante mortem pulsus fere nullus simulque celerrimus percipiebatur. Vires tamen animi corporisque supererant, aegraque cibum etiam appetebat.

p. 310. *Obs. 33.* In femina intestinum colon, cubiti longitudine ex ano elapsum, vidit Ill. Auctor, quod facile

cile quidem reponebatur, sed mox iterum descendebat. Terminabatur illud ostio eminente rugoso, quod valuulam coli referebat. Tunica villosa ruberrima holoserico tonso similis erat, ex eaque nitro aliisque salibus conspersa aquosus sudor prodibat, nulla tamen contractio obseruabatur.

Obs. 39. Obseruationibus *de calculis biliariis* an- p. 328.
tea editis, adduntur aliae, in quibus etiam morborum historiae reperiuntur. Virgo quadragenaria periodicos vomitus doloresque hypochondrii experiebatur. Alius constipata erat, atque in dextro hypochondrio tumor duriusculus percipiebatur. Huic Ill. Auctor succos plantarum antiscorbuticarum, cum iusculis ex cancris fluuiatilibus et carne vitulina dedit, acidularumque vsum subiunxit, atque feliciter eam restituit. Post plures annos eadem aegra similem morbum experiebatur, qui simili fere methodo sanabatur. Tandem aegram, annum septuagesimum agentem, iterum morbus prior inuadebat, ex quo, accedente febre lenta, etiam obiit. In hac aliaque femina, in qua vehementissimi paroxysmi ex calculis biliariis oriebantur, nulla icteri vestigia apparuerunt. Hinc opinionem a Cl. c o e in tractatu *de calculis biliariis* propositam*), Ill. Auctor refellit, atque etiam aliis iisque grauissimis argumentis, ex anatomia deductis, probat: calculos vesiculae felleae rarissime icterum producere posse.

Obs. 41. In puella rustica sine vrethrae sectio- p. 330.
ne, calculus, principio suo in vrethra haerens, satis grandis hic delineatus, eductus et vrethrae quoque atque sphincteris robur perfecte iterum confirmatum est.

Obs. 42. Ex abscessu mammae calculus excissus p. 333.
est, teres, in spiram contortus, figuram ductus lacti-

E e 4 feri

*) A treatise on biliary concretions Lond. 1757. vid. Comment. nost. suppl. Dec. I. p. 429.

feri perfecte referens. Naturam praeterea calcaream habebat et ex flauo de lacte glutine, quod in mammae ductu lactifero refederat, sine dubio natus erat.

- p. 348. *Obs. 52.* Ovarium scirrhosum maximum in femina 61 annorum, quae hydrope periit, describitur.
- p. 356. *Obs. 55.* Exemplum inoculationis, frustra in filia Ill. Auctoris institutae, recensetur. Vesicatorii et incisionis ope materia variolosa applicata, nullam febrem excitauit, neque melius Ill. Auctor successit, cum altera et tertia vice noua materia vteretur. Haec tamen ipsa virgo postea nupta, pluribus, variolis laborantibus, adstitit, nec vnquam morbum experta est. Adduntur simile exemplum, aliaeque inoculationis, cum optimo successu institutae, historiae.
- p. 358. *Obs. 56.* In iuvene, febre miliari putrida extincto, in corde vigesima a morte hora multus aer in bullas cum sanguine intritus et fere efferuescens inueniebatur. Intestina non inflammata, hepar vero et ventriculi pars vicina rubra et inflammata erant.
- p. 368. *Obs. 67.* Aues submersas ope scintillarum electricarum excitare frustra Ill. Auctor tentauit. Aliquos tamen in musculis motus produxit. Eiusdem quoque ignis electrici applicatio, per 21 dies continuata, in furdo successu caruit, aegerque licet leuari videretur, tamen cerebri commotione nimis valida territus, ab experimento destitit.
- p. 368. *Obs. 68.* Ulcera pulmonum Cl. Auctor cortice Peruuiano, cum lacte decocto, diaeta vegetabili et corporis exercitio aliquoties sanauit. Feminarum vero, quibus cum sputo cruento menses emanferunt, nullam seruare potuit.
- p. 372. *Obs. 69.* Vulnerum renis pulmonumque seuerissimae diaetae ope sanatorum, exempla enarrantur.
- p. 372. *Obs. 70.* Historia morbi epidemici, qui in pago Bernensi 1762 saeuuit, ad Academiam Parisinam missus

fus. Anni huius aestas ficcissima et calidissima fuit, atque vltimis eiusdem anni mensibus in nonnullis pagi Bernensis locis, inprimis vero in ea praefectura, quam Ill. Auctor regebat, morbus hic satis magnam stragem edidit. Calor tamen non vnica causa illius esse poterat, cum in Alpinis vallibus etiam grassatus sit; probantque observationes hic adductae, morbi miasma, licet contagiosus fuerit, minime tamen ventorum ope translatum esse. In initio pleuritidem mentiebatur, sed altero vt plurimum die pulsus subito debilitabatur, viresque prosternebantur et accedebant vomitus, diarrhoea spumosa, cephalaea et sopor. Nonnulli iam intra 24 horam perierunt, alii ad sexagesimam vixerunt. In aliis autem, qui diutius morbo resistebant, die quarto inflammationis viscerum abdominis gangraenaeque signa apparebant, dieque quinto vel septimo demum mors accedebat. Aderant in initio morbi sudores copiosi, deinde vero cutis et oris siccitas succedebat, et in nonnullis miliares pustulae erumpebant. In hoc morbo Ill. Auctor, emeticum raro nisi primis morbi horis dedit, cum in morbis, vires vehementer frangentibus, iis non faueat; sed cremore tartari, cui catharticum medicamentum in robustioribus addebat, vel tamarindis, sero lactis iunctis, aluum subducebat, diarrhoeamque sustinebat. Propinabat quoque mel cum aqua subactum, cui spiritum sulphuris ad octoginta nonnunquam in vna dosi guttas instillabat. Naturam enim magnas doses acidorum mineralium ferre posse, in morbo proprio obseruauit, in quo vltra duas libras olei vitrioli sensim sumsit. Si cardiaco opus erat, sulphure antimonii aurato utebatur, non tamen in ea dosi, vt vomitum moueret; in leuiori morbo mixtura simplici vires sustinebat. Diaeta aegrorum erat vegetabilis ex decocto auenaceo sine carne vel ouis. Si tussis vrgebat, pectorale infusum dedit et fomenta

emollientia adhibuit. Vfus quoque est cataplasmatibus ex femine lini in aqua et lacte decocti. Venae-
sectio funestissima fuit. Hac methodo adhibita, ex
77 aegris decem tantum obierunt, inter quos varii
vino abusi erant, vel male ab aliis tractati, aut aliis
iam morbis laborantes; cum antea ex 95 aegris
85 periissent. Frigus insolitum mensis martii an.
1763 morbum plane exstinxit. Causam morbi ponit
Ill. Auctor praecipue in conclauia angusta, immunda,
fornace calefacta; quapropter aëris renouationem
et regimen frigidiusculum suafit.

p. 376. *Obs. 71.* Feminam triginta annorum, quae post
abortum in febrem putridam incidit, conuulsio-
nibus et delirio stipatam, lochiis nigris et foetidis ef-
fluentibus, sulphuris primum spiritu, deinde corti-
ce Peruuiano et tandem cremore tartari exhibitis, et
vesicatoriis applicatis, seruauit. Eodem quoque re-
medio aliam puerperam, febre acuta cum deliriis et
vrina pallida laborantem, restituit.

p. 377. *Obs. 72.* In grauida, variolis laborante, variola-
rum copia, qua oris cauum repletum erat, suffoca-
tionem minabatur. Vapores aquae tepidae attrahe-
re Ill. Auctor iussit ex rostro vasculi, in quo thea in-
funditur. Hinc aegra leuata, curationi reliquae
tempus datum est, aegrotaque sanissimam puellam
partu edidit.

p. 377. *Obs. 73.* Febrem neruosam, ad 40 diem duran-
tem, in Heluetia alias infrequentem, in iuvene Anglo
curauit Noster vino, camphora, serpentaria et vesi-
catoriis.

p. 378. *Obs. 84.* Post febrem stuporiferam, quam vir-
go post insultum epilepticum passa est, corticis Peru-
viani ope potissimum superatam, illa in verum par-
oxysmum epilepticum incidit. Adhibito tamen ex-
tracto valerianae cum limatura martis et cortice, pau-
latim ea conualuit, neque recidiuam passa est. Lauda-
tur

tur ab Ill. Auctore hoc extractum ob egregiam suam virtutem antiepilepticam. Spicam tamen Celticam, quae in Alpibus occidentalibus non adeo rara est, adhuc praefert.

Obs. 75. 76. Eiusdem corticis ope debilitatem p. 378. nervosam insignem in viro, qui veros spasmos hystericos experiebatur, atque amaurosin imperfectam et debilitatem totius corporis in alio sanavit. 379.

Obs. 77. In femina 60 fere annorum, quae exp. 380. omnibus signis scirrhi hepatis cum febre et abdominis tumore laborabat, citri succum et acidum sulphuris magna in dosi optimo cum effectu Ill. Auctor dedit.

Obs. 78. Deglutationem impeditam, ex glandulis, oesophago impositis, obstructis, restituit idem ope mercurii dulcis cum aloë et camphora, ex cuius remedii usu per alium magnae gelatinae massae seceserunt. In simili malo alius aegri oleum tartari per deliquium in iure pulli exhibuit. p. 380.

Obs. 79. Causam debilitatis nervosae malorum-que hystericorum nostra aetate adeo frequentium Ill. Auctor ponit, in majoribus impressionibus, a quacunque causa in nervis debilitatis excitatis. Hinc callum aliquem nervis inducere studuit ope acidorum mineralium, propinatis bis de die in aqua duodecim aut pluribus guttis olei vitrioli cum aëquis partibus alcohol vini digesti, atque egregios, inde effectus observavit. Minime tamen exercitationem corporis neglexit. Ultima observatione corticis Peruvianiani vires contra gangraenam, a causa interna natam, confirmantur. In figuris novis additis calculus vesicae e puella extractus, calculus ductus galatophori, variique embryones cuniculorum delineantur. p. 382.

DOMINICI VANDELLI, Philos. ac Medici
reg. Botan. Prof. reg. scient. Acad. Vpsal.
Florentin. Physicocriticor. Senens. literar. Ra-
vennat. Patauin. Lusatiens. socii, dissertatio
de arbore draconis seu Dracaena. Acc. diss.
de studio historiae naturalis necessario in
medicina, oeconomia, agricultura, artibus et
commercio. Olisipone. apud Anton. Rode-
ric. Galliardum. 1768. 8. pagg. 39. tab. aen. 1.

Quae per varia secula torfit botanicorum operam
et concitauit attentionem arbor draconis, a CLU-
SIO olim descripta, nunc solertiori peritorum bota-
nicorum industria ita dilucidata est, vt de vera eius
natura et notis fructificationis vix quidquam desit,
quod addi debeat. Coniunximus eam ob rationem
varia huc pertinentia scripta, quo pateat, quantum
assiduitatis adhiberi debeat in corporis naturalis dis-
quisitione, et quomodo repetitae peruestigationes
veritatem confirment.

Quam nunc perlustramus Cl. VANDELLI dis-
sertationem, perbreuem inuenimus. Postquam enim
pauca de sanguine draconis, auctoribus, arborem hanc
describentibus, synonymisque disseruit, sequentem
floris, icone satis nitida delineatam, exhibet descri-
ptionem:

P. 5.


Calyx nullus. *Corolla* sexpartita, vnguibus cohae-
rens. *Laciniae* ouatae, apice acuto incuruato, pube-
scente: dorso carinatae, reuolutae. *Stamina*. Fila-
menta sex, erecta, corollam aequantia, vnguibus in-
serta: inferne membranacea, medio ouato compres-
sa, incrassata, superius subulata. *Antherae* oblongae
incumbentes. *Pistillum*. Germen ouatum, sex fulcis
striatum. *Stylus* longitudine staminum, subangula-
tus.

tus. Stigma trifidum, obtusum. *Pericarpium*. Baccæ ouata sexfulca, trilocularis. *Semina* tria ouato-oblonga, apice incuruato.

Sequitur dein specialior trunci, foliorum, florum, fructuumque expositio, ex qua notamus, arborem descriptam a Cl. Auctore, in summitate ramosam fuisse, sex nimirum ramis constantem, ex quibus etiam rubrae prouenerint, sanguineae lacrymae, similes sub globulorum subrotundorum complanatorum specie in basi foliorum prodiisse, flores, pedunculo articulo inhaerentes, stipulis quatuor lanceolatis circumdari, mane claudi, uesperis aperiri. Quae de sanguine draconis in officinis pharmaceuticis parantur, nec non de usu medico atque mechanico constant, breuiter ad finem adduntur.

Addita his dissertatio de studii historiae naturalis p. 11. necessitate, mineralogiam, hydrologiam, botanicen et zoologiam multiplicem in dictis doctrinis usum habere exemplis docet, ex variis itineribus, a Cl. VANDELLI institutis, collectis, quibus etiam factum est, ut libros conscripserit de aquis medicatis Mutinensibus de aqua Brandelenfi (dell' acqua di Brandola,) historiam Mediolanensem, de thermis Patauinis. Quoniam in itineribus his, historiae naturalis inuestigandae causa susceptis, magnam corporum naturalium copiam collegerit Cl. Auctor, musei eius, in p. 31. viginti octo armariis dispositi, conspectus ad finem adiicitur, simul cum indice scriptorum eiusdem.

Peruenerat autem quum haec scriberet, ad Cl. VANDELLI notitiam Cl. CRANTZII de eadem arbore editus libellus, ipsi tamen tunc nondum visus, hinc subiicimus eum:



VI.

HENR. IOANN. NEPOM. CRANTZ. S. C. A.
Maiestatis Consil. Instit. med. et mater. med.
Vindobon. Prof. Publ. Ord. Acad. Imp. nat.
curios. et Soc. Botan. Florent. litt. Roboret.
fodalis, de duabus draconis arboribus bota-
nicorum. Cum figuris aeneis partium fructi-
ficationis, duorumque nouorum generum
constitutione. Viennae. impensis I. P. Krausf.
1768. 4 mai. pl. 4. tab. aen. r.

Epistola haec, ad Ill. VAN SWIETEN data,
primo etiam loco in sanguinis draconis fontes
inquit, collectis auctorum, de hoc relationibus
tum antiquis, tum recentioribus, ex quibus docetur,
multiplicem esse originem eius, nec plantas omnes
suffICIENTER cognosci, qui similem succum suppeditant.
p. 8. Sed nec de ipsa arbore draconis CLUSII
certitudinem inter botanicos esse, Cl. LOEFLIN-
GIUM ad Asparagos referre, vel Pterocarpum
LINN. esse, cuius duas species adducit, quae flo-
rem papilionaceum, fructumque leguminosum
ostendunt. Hinc Ill. LINNAEUM vtrumque ge-
nus pro draconis arbore adsumere. Quae, quum
ita sint, sex diuersas recenset plantas Cl. Auctor,
quae sanguinem fundere perhibentur, aliis etiam in-
explicatis relictis. Impugnat simul Ill. LINNAEUM
aliosque et nouum genus adsignandum esse arbori,
a CLUSIO descriptae, coniicit. Duas enim egre-
p. 19. gias stirpes Principi EUGENIO Sabauda in virida-
rio Vindobonensi esse, easque adhuc viuere, ex qui-
bus suam, Ill. SWIETEN iubente, descriptionem
desumferit. Prima, sexto aetatis anno 1748. in
Hollandiam deducta, anno 1768. mense maio spa-
dicem protrudere coepit, iulio florere, augusto fru-
ctus

us ostendere. Radices illa ramosas habet, stolon-
es reptantes, caudicem nudum, decem pedes lon-
gum, nodosum ex foliorum cicatricibus, glabrum,
non ramosum. Corona foliorum in summo loco
haerens, folia ostendit imbricata, sessilia, tres pedes
longa, inferioribus declinatis, superioribus erectis.
Quod ad exortum folia latiora sunt, latifoliam eam
vocant hortulani. Spadix terminalis, ex centro fo-
liorum, lignosus, quatuor pedes longus exhibat race-
mosus, ramis denuo ramosis, subglaucus, bracteis
ad ramos alternis ornatus, striatus, glaber, ramis ir-
regularibus, alternis et oppositis. Florum nume-
rosa grex, ex quibus multi decidunt, pedunculis bi-
articulatis, quorum in ramis plerumque quinque
sunt. Corolla albida monopetala, sexfida, laciniis
alternis ovato-acutis, quae in limbis antheras recon-
dunt, stamina namque membranacea, triangularia,
antheras sex erectas, corolla minores sustinent. Ger-
men ovatum in tubam desinit conoideam, vaginam
efficientem, stigma trifidum trigonum. Fructus
pro aetate sua et magnitudine differt, minor tribus
sulcis instructus, trilocularis trispermus, maior, se-
minibus abortientibus, unilocularis, *an perpetuo?*
femen albissimum substantiae est elasticae, degustatum
dulce. Elastica haec feminis materies, etiam septi-
mo mense post, talis observata est a Cl. Auctore, ex p. 23.
siccata, cornu ad instar indurata. Ex his notis, quod
Asparagi characteres non habet, novum plantae no-
men *Stoerckiae* imponit; est scilicet *Stoerckia arbore-
scens, foliis ensiformibus subcarnosis, imbricatis, pa-
tenti-pendulis*. Cunctae hic descriptae partes accu-
rata icone illustrantur.

Secunda vero stirps, Viennae in Haruckeriano p. 26.
horto culta, floruit anno 1756, cuius floris effigies
pictas tantum vidit Noster. Radices ut prioris sunt,
caudex decem pedes longus, simplex, ubi florebat,
post

post ramosus factus, magis glaber foliorum exortus, angustior, quare hortulani eam arborem draconis angustifoliam nominant. Spadix itidem cum priori conuenit, bracteae in pictura defunt. Calyx nullus, corolla campanulata profunde sexfida, maior ac in praecedente, staminibus longe exsertis, sex, pistillum similis longitudinis. Fructus drupa rotunda, officulo, vnico, albido, polito, durissimoque foeta.

p. 29. Ad Yuccam referendam esse hanc plantam Cl. LAUGIER arbitratur, a qua tamen, quod recedit, nunc in Cl. OEDERI memoriam appellat Cl. CRANTZ eam *Oederam*, nempe *Oedera arborescens foliis ensiformibus, carnosis, imbricatis, pendulis* dicitur, et floris delineatio ex effigie, hic aeri incisa, repetitur.

Etsi vero duplicem hic plantam descripsisse videatur Cl. CRANTZ, quarum altera cum Vandelliana conueniat, noua tamen inquisitione confirmare peruestigationem, operam adhibuit Cl. BERENS, cuius itaque dissertationem his subiungere liceat:

VII.

Dissertatio inauguralis botanica de dracone arbore Clusii, publice defendenda a REINHOLDO BERENS. Riga Liuno. Gotttingae 1770. 4. plagg. 8. tab. aen. I.

Magna utique cum assiduitate haec conscripta, maximam partem contra Cl. CRANTZIUM directa est. Nostri autem est, obseruata candide recensere momenta, quo, opportunitate fauente, veritas constet. Cl. Auctor vero sub auspiciis eximii GLEDITSCHII, qui propediem in actis Berolinensibus vberiore arboris draconis descriptionem est daturus, auide expectandam, eam florentem anno proxime elapso, vidit, examinavit et hic exposuit. Dedit primo arboris historiam, incipiens ab Vlyssi-

Vlyssiponenſi Cluſiana, atque aetatem prouectiorem p. 18. truncos ramosos efficere contendit, adoleſcentem vero plantam caulem ſimplicem tantum habere probat, nec non duplicem draconis arborem Cl. CRANTZII, exinde diiudicatam, ad Cluſianam eſſe referendam. Deinde ſingulas partes arboris ſigillatim perpendit Noſter, a radice ad fructum uſque, de quibus, quum multa iam ſuperius dicta ſunt, ea tantum, quae differunt, nunc adducemus. Spadix arboris non eſt *ſtolonifera*, folia *inferiora* pendula, *media* patentia, *ſuperiora* erecta ſunt. Spadix terminator calycem communem ſeu ſpatham vniuerſalem non habet, florum faſciculi verticillos imperfectos p. 22. ſiſtunt, ſinguli incompletos floſculos ſimul continent, pedunculi articulati ſunt. Corollae praecoeces maiores cum abortiuſ minoribus miſcentur, ſenſim et ſucceſſiue aperiuntur, mane clauſi veſperi penitus patentes. Spathulae ad ramorum exortum adhaerent, ſtipulae plures ſetaceae baſin faſciculorum floralium cingunt. Corollae fundus mellifer p. 32. eſt, piſtillum, triſulcatum tantum ſtyloideo receptaculo inhaeret. Pericarpium drupam ſubgloboſam ſiſtit, trilocularem, tribus vel ſex futuris longitudinalibus notatam.

Quare, quod utique hae notae cum aliis generibus non conſpirant, nouum conſtituit, *dracaenae*, quod ab Ill. LINNAEO propoſitum iam eſt, eiusque characterem naturalem exhibet, ſynonyma addit, icones datas huius arboris diiudicat, nec non a ſe additas explicat, Crantzianas *Stoerckiae* et *Oederæ* fructificationes repetit, et epicriſi addita denuo utramque plantam, a Cl. CRANTZIO deſcriptam, a ſua non differre, *Stoerckiae* characterem ex floribus deſloratis deſumtum, *Oederæ*, oſcitanter ab hortulano depictae, in vigore florentiae delineatum eſſe ſatagit.

VIII.

Kort Begrep af Grunderne til Pharmacien, at
nyttja vid enskylda Föreläsningar. Utgifvit
af ANDERS IOHAN RETZIUS, Ph. Mag.
Chemiae ooh Hist. nat. Doc. vid Lunds
Academie. Stockholm, tryckt hos Direct.
Lars Salvius 1769 48 pgg. 8. mai.

h. e.

Epitome elementorum pharmaciae in vsum
praelectionum academicarum edita ab AN-
DREA IOANNE RETZIO.

Sub copia ista librorum, qui praelectionum medi-
carum normae inserviunt, dolendum merito,
quod vix vllus hucusque suppetat, pharmaciae in
academia tradendae accommodatus. Vnde diffici-
lior doctrina haec redditur vel necessitas nascitur;
oscitantius eam docendi et transeundo quasi, dum
dispensatoria pharmaceutica enucleantur, summa
tantum eius capita, sub initium cuiuslibet praepa-
ratorum classis attingendi. Vtilitatem tamen exin-
de, non solum in pharmacopolam, sed in medicum,
summam redundare in confesso est, adeo vt hic nec
apte formulas praescribere, nec praeparationem
medicamentorum praescriptorum diiudicare possit,
nec in pharmacopoliis perquirendis aptus iudex sit;
vt taceamus saepe in vrbibus minoribus vel pagis illi
ipsi praeparationem remediorum incumbere, nec, si
in collegium quoddam medicorum receptus, de re
pharmaceutica quaestione orta, officio satisfacere
eum posse. Damnandus igitur quorundam, dum li-
teris in academiis operam dant, in pharmacia ad-
discenda torpor. Contra ea in academiis Suecicis
haec ars eadem, qua reliqua medicina, cura foue-
tur,

tur, professoresque peculiare ad eam docendam constituti; et suasu collegii medici, antequam de Doctoris titulo dispiciatur, annus, ut scimus, in pharmacopolae cuiusdam doctioris domo consumitur, quod ipsum collegium quoque Stockholmae in examinibus pharmacopoliorum annuis iuniores medicos lubenter admittit.

Rem ideo gratam vtilemque medicinae studiosis Cl. Auctor fecit, quod schediasmate hoc istorum industriam subleuauerit. Noua quidem et expectata nemo ab eiusmodi epitome poscit, sed haec ipsa concinno ordine et argumentorum (quantum scilicet pro breuitate ista fieri potest) pertractatorum extensione nobis placet, et vota excitat, ut ampliori dictione vel Auctor ipse vel alius, filo harum linearum insistens, artem persequatur.

In tria summa capita hic libellus dispescitur; quarum primum agit de pharmacia generatim, de instrumentis, de characteribus, de ponderibus et mensuris; alterum de encheiresibus pharmaceuticis in vniuersum; tertium de praeparatis, ubi praemissis iis, quae ad simplicium collectionem, exsiccationem, conseruationem cet. pertinent, singula praeparatorum, tam interno, quam externo vsui destinatorum, genera, pulueres scilicet, conseruas, succos expressos, pilulas, essentias, olea, spiritus cet. additis exemplis, persequitur.

Non superfluum habemus in persistente adhuc p. 8. abusu monitum Cl. Auctoris, ne pro ficcis, quibusdam remediis et liquidis aqua grauioribus, loco ponderis, mensurae adhibeantur. In radicibus colligen- p. 16. dis merito inter stirpes annuas et biennes perennesque distinguitur, quarum priores autumnopost maturationem colligantur, posteriores autem vere, antequam folia emerferint. Succo expressi seruantur p. 17. in ampullis, quibus oleum recens superfusum. Sci-

p. 20. te suadet Noster, vt ea, quae, pulueris inde confi-
ciendi causa, ficcari debent, lentissimo caloris gra-
du siccentur. Vt succi expressi clari euadant, No-
stro in vfu est, phialam istis repletam, postquam
aliquoties aquae calidae immissa fuerit, in aquam
frigidam immergere.

IX.

Essai sur les maladies, qui attaquent le plus com-
munement les gens de mer, contenant une
méthode courte et facile pour les connoître,
les guérir, et même en préserver. Ouvrage
utile aux chirurgiens naviguans, et même
à tous les marins, qui se trouvent dans des
bâtimens, où il n'y a point de chirurgien.
On a joint quelques observations sur la mé-
thode la plus sûre de secourir les noyés, et
de traiter les fièvres de l'Isle Saint-Domin-
gue et des autres Colonies Françoises aux
Antilles. Par G. M**. Maître ès arts et en
chirurgie. A Marseille, chez I. Mossy, Li-
braire, 1766. 12. pll. 15.

i. e.

Tentamen super morbis, homines, mari viuen-
tes, praecipue infestantibus, continens me-
thodum breuem et facilem illos cognoscen-
di, curandi, imo praecauendi. Opus chi-
rurgis naualibus atque omnibus adeo nautis
vtile, qui sunt in nauibus, chirurgus destitu-
tis. Accedunt obseruationes quaedam de
methodo tutissima iuuandi submersos, et tra-
ctandi febres in insula S. Dominici ceteris-
que coloniis Gallorum in insulis Antillis.
Auctore G. M**.

Com-

Compulsus est ad scribendum hunc librum Noster defectu eorum librorum, qui de morbis navigantium agunt, non eo quidem vniuersali, sed in lingua tantum sibi vernacula. Cognoscimus ideo et laudare debemus ardorem Nostri, ciuibus suis commoda atque usum praestandi: in toto quippe opere ingenuitas et studium salutis publicae egregie elucescunt. Coniuncta sunt, quae ab aliis de hac re dicta fuerunt, atque eo quidem modo exposita, ut descenderetur ad captum hominum, nulla rerum medicarum cognitione imbutorum: quare theoria morborum pertractatorum solis phaenomenis in sensus incurrentibus superstruitur, subtilioribus hypothesebus quibuscumque neglectis. Id etiam sedulo quaesivit Noster, ut medicamenta proposita eiusmodi essent, quae facile comparari possint aut seruari in nauigiis. Dispersitur autem totus liber in duas partes, quarum prior morbos internos, altera externos exponit; quam sequitur index formularum medicamentorum, quarum in tractatione morborum ipsorum mentio fit, ac tandem alphabeticus ordo medicamentorum, quae dictas modo formulas ingrediuntur, additis, ubi opus videbatur, quibusdam ex historia naturali, atque indicatis in praecipuis bonitatis signis.

In parte prima exponuntur vomitus nauigantium, scorbutus, rheumatismus, ictus solis seu phrenitis, febres putridae, febres malignae, febres intermittentes, colicae, cholera, morbi venerei, pestis, febres, in coloniis gallicis grassantes, et tandem remedia submersos in vitam reuocandi: in altera autem vulnera et ulcera, contusiones et fracturae, clavi, furunculi et abscessus, ambustiones, herniae, morsus animalium venenatorum, scabies, et dracunculus siue vena Medinensis, huicque subiunctum est

caput singulare de auxiliis chirurgicis, cucurbitulis nimirum ficcis et cruentis, vesicatoriis, hirudinibus et cauterio actuali aequae ac potentiali.

- p. 5. Vomitus nauigantium adeo negligendus non est, ut plerumque fit: quare ad eundem tum praecavendum, tum curandum auxilia convenientia praescribuntur. In genere autem ea non nisi illis conveniunt, qui itineris tantum causa navem conscendunt: qui enim hanc ipsam vitae rationem sibi delegerunt, illi quovis modo assuefaciendi sunt, si boni nautae fieri velint. In tractatu de scorbuto methodum Cl. MORETI prae reliquis commendat Noster: reprobatur autem purgantia drastica, ab eodem in usum vocata, quod saepe in scorbuticis tunica intestinorum interior varicosa est et exulcerata, ideoque iure suo leniora suadet. Ad morbos venereos quoscunque remedium Swietenianum commendat, cum ob summam eius utilitatem, qua omnes alias mercurio utendi methodos maxime antecellat, tum quod nulla alia medendi methodus aequae commode ac facile in navibus adhiberi potest. In peste magnam partem timoris superfluum esse atque ideo noxiam monet, et eam pari, ac febres malignas, ratione tractat. Tractatus de febribus coloniarum non nisi extractum ex opere Cl. DESPERRIERES fuit, quod Parisiis 1763 sub titulo: *traité des fièvres de l'Isle Saint-Domingue* prodit, et extractum hoc ipsum ex mense octobri eiusdem anni diarii medici depromptum et hic insertum est. Cum adeo frequens sit in nautis herniarum generandarum occasio, suadet Auctor, ut praefecti navium semper sufficiente quantitate bracheriorum, rite paratorum, instructi sint, quo, urgente necessitate, selectus eorum institui et herniosis succurri queat. Ad morsum animalium venenatorum ex KAEMPFFERO ligaturam, scarificationem et externum aequae, ac internum.
- p. 105.
- p. 213.

num theriacae vsum commendat. In scabie, per P. 218. contagium communicata, internis medicamentis opus non habet, sed statim vnguentis, ex sulphure aut mercurio paratis, morbum aggreditur. De dracunculo seu vena Medinenfi opinioni Cel. ASTRUC adstipulatur, qui illam vermem putat. Is praefectis nauium, qui chirurgi carent, incumbit, vt aliquam hirudinum copiam sibi procurent, quo earum vfu venae sectio suppleri possit.

X.

Histoire de l'Eléphantiasis, contenant aussi l'origine du scorbut, du feu ST. ANTOINE, de la verole, etc. avec un précis de l'histoire physique des tems. Par Mr. RAYMOND, Docteur en Médecine de la faculté de Montpellier, aggrégé au collège des Médecins de Marseille et membre de l'Academie des belles lettres de cette même ville, etc. etc. A Lausanne, chez François Grassét, et Comp. 1767. 8. pagg. 132.

i. e.

Elephantiasis historia, continens simul originem scorbuti, ST. ANTONII, luis venereae cet. cum epitome historiae physicae temporum. Auctore Cl. RAYMOND.

Praemissa etymologia et synonymia morbi, descri- p. 6. ptio eiusdem ex ARETAEO additur, et paucissima hinc inde eidem additamenta intersperguntur, siquidem ARETAEUS ipse eundem vberime depinxit. Postmodum tria referuntur huius morbi exempla, quae Cl. Auctori obuenerunt, qui vel prorsus nullam admisit medelam, vel efficacissimis

remediis parum tantum leuatus fuit. Excurrit tunc
 Cl. Auctor per omnem terrae ambitum, et in omni-
 bus eius partibus obseruatas elephantiasis historias
 colligit, ex quibus patet, eam quamquam non pror-
 sus extinctam, tamen nostro aeuo rariorem esse in
 Europa, quam in reliquis partibus orbis, ex quibus
 p. 46. omnibus denique sequentia confectaria elicit: mor-
 bo generando fauent duae potissimum causae phyfi-
 cae, atmosphaera impurior et errores insigniores in
 cibi potusque peruerfis generibus commissi. Gra-
 uior ille est et frequentior in regionibus australibus,
 quam borealibus, potissimum, in insulis, intra tropi-
 cos sitis. Differt etiam in variis regionibus ratione
 partium corporis, quas potissimum tangit, vt in re-
 gionibus calidis extremitates, in Americanis specia-
 tim crura, in borealibus autem tota superficies cor-
 poris eo afficiantur. Contagiosus proprie dicendus
 non est: haereditate tamen et forte lactatione pro-
 pagatur. Curari nequit, sed tantum leniri se pati-
 tur ope demulcentium et balneorum; sulphuris, an-
 timonialium et cinnabaris vsum fert, mercurialium
 autem et omnium calefacientium vsum respuit. Pu-
 tridae indolis est, seu talis, quae successiue partes in
 toto corpore corrodit, vti est in pluribus morbis
 chronicis; ad quam indolem acquirendam plurimum
 conferre alimentorum varia genera, inprimis ex pi-
 scibus, Cl. Auctor, variis institutis experimentis, di-
 dicit. Hoc enim alimentum plurimum facere ipsi
 videtur vt ad alios, sic et ad hunc morbum generan-
 dum et fouendum; sique minus frequens inde sani-
 tati dispendium oriatur, hoc inprimis vel aëri salu-
 briori et perspirationi magis proficuo, vel additis
 correctionibus et potissimum liberaliori vini vsui tri-
 buendum putat. Multum etiam confert deiectus
 p. 55. animus ac tristis, qui ideo in dominiis ac regnis de-
 spoticis, qualia orientalium e. s. p. plura sunt, caus-
 fas

fas morbi phycas vehementer intendit. Quod ad mutationes interiorum corporis partium spectat, veteres easdem pari, vt exteriores, modo tuberculis obsessas suspicabantur; id quod secta recentioribus temporibus cadauera hoc morbo demortuorum clare confirmarunt, quibus corruptio plurium viscerum aut ipsorum exsiccatio patuit, sanguine in gelatinam mollem et liuidam conuerso. Concluditur inde ex omnibus his collectis, hunc morbum praecipue humoribus sebaceis et mucilaginosi nerueoque liquido infensum esse; quare intellectu facile est, cur idem plerumque in febrem lentam transeat.

Progreditur nunc Cl. Auctor ad historiam mor- P. 57.
bi nostri, ex antiquissimorum temporum monumen-
tis eruendam. Prima telluris conditio, neglectus
agriculturae et piscium abusus non potuerunt non,
vt aliis putridis morbis, ita et nostro, fauere: inpri-
mis autem ora maritima Asiae minoris et inferior
Aegypti pars semper pro solo natali eiusdem habi-
tae sunt. Inde commorati in Aegypto Iudaei eum- P. 61.
dem contraxerunt; adeo, vt historici profani eos-
dem hanc ob causam expulsos fuisse contendunt.
Neque is solus morbus Aegyptios infestabat, sed P. 65.
plures alii congeneres, atque praesertim quidam ve-
nereo similis, cuius et in litteris sacris mentio fit.
Iudaeis itidem varia morborum cutaneorum genera
familiaria fuerunt, speciatim vitiligo alba, quam le-
pram dicit sacer codex. Elephantiasis exemplis et-
iam Cl. Auctor Iobum et Lazarum annumerat. Ex
omnibus iis ratio peti potest vetitarum a lege Mo-
saica carniū deterioris indolis ac nutrimenti. Pro- P. 75.
cedit Cl. Auctor in Syriam, in qua, praecipue tem-
pore Romanorum, morbus noster obseruatus est,
quod ARCHIGENIS et AETII testimoniis euin-
citur. Neque reliquae Asiae prouinciae insulaeque P. 79.
adiacentes ab hoc et congeneribus morbis immunes

- fuerunt. In Africa eundem grassatum esse ex CAELIO AURELIANO patet, et ex eo quoque colligi potest, quod morbi cutanei verminosi ibidem frequentioris, quem phthiriasin dicebant, saepius apud Auctores mentio fit, qui ipse etiam in imperio Romano crebrius occurrebat. Situs Graeciae et naturalis huius regionis indoles morbo nostro multum omnino fauent, et ipsum vere ibi olim grassatum esse, litterarum documenta testantur: cum autem haec terra culta esset et sub imperio placido floreret, elephantiasis quidem et lepra sensim disparuere, reliquis tamen morbis cutaneis superstitis relictis.
- P. 86. In Italia morbus noster, durante republica, non videtur adfuisse, licet causis physicis ipsius praesentibus: sub imperatoribus autem frequens fuit, testantibus vno ore scriptoribus huius aetatis. Neque defuerunt alii huius generis morbi, imo fuerunt ex eorum numero, qui speciem venerei miasmatis praese ferrent, qualis erat campanus ille, cuius HORATIUS meminit. Eandem elephantiasin Galliae meridionali familiarem fuisse, testimonium ARETAEI comprobatur, quem paullo post GALENI tempora vixisse, Cl. Auctor in critica excursionem demonstrat, et postmodum originem eius mali perperam tribui contagio, quod cum exercitu POMPEII ex oriente in occidentem traductum sit, ostendit.
- P. 98. Progreditur postmodum ad aeuum medium, ibi subiugatis ab Arabibus seculis septimo et octauo Syria et Aegypto elephantiasis nomen leprae Arabum nata est. AVICENNA eandem describit, sed ipse
- P. 100. eam obseruasse non videtur. Sub eo ipso tempore, latente iam inde a seculo secundo imperio Romano, eoque demum seculo quinto funditus euerso et horrenda barbarie omnia inundante, morbus noster in Gallia praesertim mire auctus est, quod prolixè enarratur et ex deplorando statu ciuili prouinciarum,

rum, quem necessario neglectus oeconomiae sequebatur, colligitur. Morbos etiam alios, pestemque inprimis, multo frequentiores tunc fuisse, suppuitata demonstrant. In mediis his turbulentis temporibus cessant litterarum monumenta, quare quae singulis seculis morbi nostri facies et conditio fuerit, ex paucis tantum, quae hinc inde exstant, documentis elici potest, inter quae leges quaedam, a summis imperantibus promulgatae, et nosodochia, in commodum eiusmodi aegrorum exstructa, referri debent. Videtur autem ipsis temporibus bellorum p. 106. sanctorum, in Palaestina gestorum, ubi ingentem copiam eiusmodi aegrorum exstitisse patet, minor metus contagii fuisse, quam credi posset. Neque ille solus morbus tum adeo communis erat in Gallia, sed et vitiligo et ignis S. ANTONII seu infernalis, seu malum ardentium, quod anno aerae christianae. 993. primum saeuitiam suam exseruit, et descriptio cuius conuenire videtur cum necrosi seu gangraena ex usu secalis cornuti; tandemque ignis facer seu Persicus, aut erysipelatis gangraenosi species, in eadem grassabantur. Iisdem porro temporibus, anno nempe p. 118. 1241 plica Polonica primum innotuit. Scorbutus seculo decimo sexto longe lateque vagabatur, et ratione symptomatum proxime accedebat ad elephantiasin, simili modo, ut nostris etiam temporibus NITSCHIIUS in exercitu Russorum eum obseruauit, scorbutum elephantiacum dicendum, cuius vberiore descriptionem Cl. LIND exhibuit. Scorbutum omnino plura communia sunt cum elephantiasi, adeo, ut a nonnullis Auctoribus septentrionalium regionum confundantur inter se, tam ratione effectuum eorum in sanguine, quam ortus et causarum, imo et remediorum eorum. Scorbutus antiquissimus morbus est: in Germania testibus TACITO et PLINIO, in THRACIA teste HIPPOCRATE sub vna eadem-

eademque forma faeuit. Cultioribus autem regionibus redditis, itidem disparuit, vel certe mitior factus est. Seculo decimo sexto rhachitis increbuit, quam pro nouo morbo habuerunt, licet vero simillimum sit, HIPPOCRATEM iam ipsum cognouisse. Tandem accesserunt morbi venerei, qui autem omnino ante expeditionem Neapolitanam exstitisse putandi sunt, vt superius iam Cl. Auctor demonstrare fategit, et nunc vberius ostendere annititur. Saeua autem omnium horum morborum cohors defuit tandem hac, qua ante, ferocia integras regiones deuastare, quum status et conditio hominum mutarentur, quod vsque ad finem operis Cl. Auctor solide explicat ac declarat.

XI.

Dissertation sur une méthode nouvelle de traiter les maladies vénériennes par des lavemens: on y a joint une instruction destinée à guider ceux, qui administreront ce remède, et plusieurs observations, qui y sont relatives. Par Mr. ROYER, ancien chirurgien Aide-Major des armées du Roi. A Paris, chez l'Auteur, et Antoine Boudet, Imprimeur du Roi. 1767. 8. pll. 10.

i. e.

Dissertatio de noua quadam methodo curandi morbos venereos ope clysmatum: cui accedunt instructio in vsum eorum directa, qui remedium hoc vsurpare volunt, et multae observationes, hoc argumentum concernentes, Auctore Cl. ROYER.

Vti ex praefatione apparet, iam per aliquod tempus Cl. Auctor medicamenta, quibus sub clysmatum

matum forma adhibitis morbi venerei vincuntur et curantur, confecit et dispensavit, ideoque ante aliquot annos instructionem, cuius in titulo praesentis operis mentionem facit, in lucem edidit: cuius cum exemplaria omnia distributa essent ac diuendita, de noua eiusdem editione cogitandum erat. Tradit praeterea Cl. Auctor, remedium hoc, quod duplicis generis est et ex liquore quodam et puluere consistit, in exterarum diffusasque omnino regiones mittendum a se postulatum fuisse, quare idem magis concentrauerit, quo commodius in aliena loca transmitti posset. Miramur autem, Nostrium rationem tum liquorem, tum puluerem praeparandi reticuisse, et modum tantum fuisse et copiose satis recensere, quo vtrumque clysmatibus admisceri ipsaque in usum vocari oporteat: qua in re nos equidem veremur, ne quibusdam paullo plus iusto recessisse ab ingenuitate viri, de augendo commodo scientiae nostrae solliciti, et magis lucri aut honoris habuisse rationem videatur. Et si recte iudicamus, ipsa haec instructio neque nos legendo iuuat, neque sperare possumus, fore, ut ex eius recensione Lectores nostri multum emolumenti caperent, quum ipsum remedium incognitum sit. Observationibus tamen, a Cl. Auctore additis et testimonio multorum eorumque eximiae dignitatis pariter, ac famae virorum confirmatis, fidem plane non denegamus, quibus id quidem clare patet, magnum esse remedio eiusdem pretium statuendum. Neque ergo nos tangemus epistolam, huic operi subiunctam, quae iam anno 1765 seorsim prodiit, qua methodum suam medendi contra insultus anonymi cuiusdam in scriptione, cui titulus: *Parallele des différentes méthodes de traiter la maladie vénérienne*, *) factos defendit. In solius ergo introductionis summa cum Lectoribus nostris communicanda nunc nostra versabitur opera.

Com-

*) Vid. Comment. nostr. Vol. XIV. p. 405.

- P. 3. Commendatur haec medendi methodus potissimum certitudine curationis et facilitate administrationis, quia nempe neque praecautiōibus, neque regimine siugulari indiget. Sola euacuatio, quae sensibilibiter augetur, est ea per vrinam; quod a pluribus remediis fieri diuersis Auctorum testimoniis probatur.
- P. 7. Ad speratum autem successum obtinendum omnino requiritur, vt clyisma in totum tractum intestinorum crassorum deferatur ibidemque commoretur, donec vel penitus, vel saltem fluidissimam sui partem, resorptum fuerit et sanguini admistum: quod cum duplici via fieri possit, vel mediantibus vasis lacteis intestinorum crassorum, vel venis mesentericis, de vtraque prolixè satis differitur et resorptionis negotium declaratur, quem in finem etiam peculiaria a se in cuniculis instituta experimenta Cl. Auctor recenset. Non ergo sola euacuatione clysmatum vsus continetur, sed experientia docuit, eorundem auxilio et nutriri corpora et medicamenta eidem applicari posse, v. c. chinae corticem et opium, vbi Cl. Auctor in addita notula feminae meminit, quae immensum dolorem a cancro vteri sensit, solo quotidiano vsu duarum vnciarum laudani liquidi SYDENHAMI, in clysmate applicati, leniendum.
- P. 36. Quo melius autem modus applicandorum clysmatum pateat, exponitur situs intestinorum cum ipsorum structura, et demonstratur, ad augendum illorum effectum necessario requiri, vt muscoli abdominales et diaphragma, atque totum adeo corpus, in quiete sint; neque aliter fieri inde posse, quin modus sibi ipsi applicandi clyisma effectū vix non semper destituatur. Opus ergo est, vt aeger penitus in latere dextro decumbat, natibus parum eleuatis et femoribus leuiter inflexis. Omni etiam cura attendendum est, ne vestimenta abdomen compri- mant, quod praecipue in feminis fieri facile potest.
- Re-

Respiratio leuissima esse debet, et magis ore, mediocriter aperto seruando, quam naribus perficiatur. Qui applicat clyisma, eo respiciat, quo pistillum syringae lente tantum agere sinat, motuque continuo, minime autem ictibus interruptis. Applicato clysmate, aeger in dorso iacens tranquillum se seruet, flexis cruribus ac femoribus, eumque situm, quamdiu ferre potest, retineat. Regulas has non solis clysmatibus antiueneris Cl. Auctoris nostri terminari, sed vbique obseruandas esse, facile quisque perspicit: quare nostram in iisdem hic describendis prolixitatem Lectores nobis condonatos esse speramus.

XII.

Exposition anatomique de la structure du corps humain par Mr. WINSLOW, Docteur Régent de la Faculté de Médecine de Paris, etc. Nouvelle Edition faite sur un exemplaire corrigé et augmenté par l'Auteur, à laquelle on a joint de nouvelles figures et tables, qui en facilitent l'usage et la vie de l'Auteur. à Paris. 1766. To. I—IV. 12mo.

h. e.

Expositio anatomica structurae corporis humani, Auctore WINSLOW. Editio noua facta ad exemplar, ab Auctore correctum et auctum. Accedunt figurae nouae et indices, vsum libri faciliorem reddentes, cum vita Auctoris.

Non opus est, vt libri adeo egregii, tantique ab omnibus anotomiae gnaris merito aestimati verbosiores simus praecones. Nota eius explorata-
que

que habetur praestantia, quae in fida, concinna et eleganti fabricae corporis humani descriptione consistit, tantaque reperta fuit, vt, praeter erratorum typographicorum, quae in priores editiones irreperant, emendationem, quid in noua hac editione vel mutari vel corrigi, vel addi potuisset, haud inueniretur. Quamuis vero neque ordinis, neque orationis notabilis quaedam mutatio facta fuerit), praeter emendatiorem tamen textum, alia sunt, quae hanc editionem ornant, et praecedentibus praestantiorum reddunt. Adiecti nimirum sunt indices, Francogallicus alter rerum omnium, quae in toto opere continentur; alter vocabulorum Latinorum in anatome vſitatorum, perque Francogallica explicationum, quo vtrisque, tum his, qui Gallice anatomien docti, libros anatomicos latino sermone conscriptos adire, et illis, qui latine illam docti, ex WINSLOWII scriptis proficere cupiunt, consulatur. Quo distributionis neruorum vasorumque cognitio eo aptior et accuratior enasceretur, tabula magna neruorum Vieussenia, et HALLERI tabulae duae articularum venarumque, in corporis anteriori pariter atque posteriori facie spectandarum, additae sunt, etiamsi, quum forma libri tabulas has multum contrahi imperaret, non omnia clare satis exprimi potuisse, variaque disparuisse, vtique fatendum sit. Quo denique liberali satisfaceret omnia tanti viri merita cognoscendi cupiditati, quae ab ingenui Lectoris

*) Vnicum tantum paragraphum huic editioni additum inuenimus T. I. p. 431. *traité des os frais* §. 57. in quo Cel. Auctor monet, methodum, qua vulgo actio musculorum determinatur, eos scilicet in cadauere iam, vt aiunt, praeparatos trahendo fallacem esse, cum raro tunc secundum eorum directionem naturalem trahantur, atque connexiones laterales etc. iam destructae sint.

ris animo abesse nequit, vita Clarissimi Auctoris cum icone ipsius toti operi praefixa reperitur *).

XIII.

Histoire de l'Academie royale des sciences année 1763. Avec les mémoires de mathématique et de physique, pour la même année, tirés des registres de cette Academie. A Paris de l'imprimerie royale 1766. 4. 3. Alph. 9½ pl. Tab. aen. 19.

i. e.

Historia et commentarii regiae Academiae scientiarum Parisinae, ad annum 1763.

Ex historia academiae sequentes articuli potissimum commemorandi sunt.

In obseruationibus, ad physicam generalem pertinentibus, notatur: 1. Die duodecimo 1763. in arce Denainuilliers mercurium in barometris ad 26' et 3" descendisse ad quod punctum per triginta annos, quod ex obseruationibus, per illud temporis spatium P. 17. non interruptis, a Cl. DU HAMEL sedulo ac summa cura annotatis, patuit, nunquam in hac regione descenderat. Academici Parisienses fere omnes idem phaenomenon obseruarunt. Ex quo nimio mercurii descensu nonnulli extraordinariam aliquam tempestatem praedicebant; sed ea non est consecuta, licet mercurius in inferiori hoc puncto satis diu haeserit. 2. Columna lucida verticalis 10 gradus alta

*) Elogii huius Auctor est Cl. DE FOUCHY, Secretarius perpetuus Academiae Regiae scientiarum Parisinae. Vid. *Histoire de l'Acad. des Scienc.* A. 1760. p. 288. et Comm. nostr. Vol. XIV. p. 583.

alta die 23 martii 1763 dimidia post occasum solis hora Loufonii a Cl. ROSTANO obseruata ac cum Academia communicata describitur. 3. Obseruatio Cl. SAUSSURI aquae, hora 5ta die 3tia augusti 1763 in fossa Geneuensi, cum lacu connexa, ad quatuor pedes et 9" vltra libellam subito alternis vicibus adscendentis ac descendents recensetur, vna cum rationibus, quae hoc phaenomenon ex lacus, nec non Rhodani intumescencia deriuandum esse declarant. 4. Historia terrae motus, Auenione 12 maii 1763 hora septima matutina a Cl. PAULIAND obseruati, ad Cl. MAIRANUM perscripta recensetur. 5. Obseruationes Cl. HOUTUYN Med. Amstelodamensis per Cl. BRISSONUM cum Academia communicatae, concernunt historiam frigoris a 23 decembr. 1762 vsque ad 24 ianuarii 1763 saeuientis, in quibus notatur die 3, 4, 5ta ianuarii, descendente fluido in thermometro Reaumuriano vsque ad 8 gradum infra congelationis punctum, illud maximum, glaciemque ex hoc frigore in aqua dulci 14 pollices, in falsa et marina 18 pollices crassam fuisse. 6. Obseruatio Anonymi amici Cl. CONDAMINE mira recensetur, qui eodem anno, nempe mense decembr. 1762 et mense ianuario 1763, circa Sablonium in Olonnia per quinque milliaria aërem obseruauerat temperatum, transgrediendo vero hunc limitem frigus circumquaque saeuit et non solum in terram satis profunde penetrauit, sed Ligerim etiam, in locis mari propinquis, glacie obtexit.

P. 34.

In *obseruationibus anatomicis* occurrit 1) sectio cadaueris hominis, qui chronica dysenteria laborauerat et in sinistro latere pectoris tumorem, ad tantum dolentem, circumgesserat. In eo colon angustatum et scirrhosum, hepar tuberculis scirrholosis vitiatum, pericardium autem magna feri sanguinolenti copia distentum et cor exulceratum deprehendeban-

bantur. Cl. BOURRU qui observationem hanc cum Academia communicavit, hac occasione ostendit, omnino in eiusmodi aegris paracenthesin thoracis ad aquam e pericardio emittendam institui posse. Minime tamen negat plenariam aquae emissionem, cum semper cor pericardii humore opus habeat, etiam nocere posse. 2. In calculo, sectione educto, spica tritici inuenta est, quae nucleum eius constituebat. Similes observationes *) probant, corpora peregrina, in vesicam introducta, facile calculi materia obducere. Mirum tamen est, hominem, e quo calculus hic eductus est, modum plane ignorasse, quo spica haec in vesicam introducta fuit.

In *observationibus chemicis* indicatur methodus, P. 49. qua *resina elastica*, a Cl. CONDAMINE olim descripta **), ita solui potest, ut post solutionem elastica eius vis adhuc supersit. Resina enim haec, quae in America australiore ad ripas fluvii Amazonum, ex cortice cuiusdam arboris ***), incisionibus in eo factis, exsudat, fumoque induratur, non ut aliae resinae in spiritu vini soluitur, sed tantum in oleo nigrum atque ignis ope liquefit et mollescit, nunquam autem pristinam soliditatem et insignem, qua pollet, elasticitatem iterum recuperat. Inuenerunt tamen Cl. HÉRISANT et MACQUER, eam ita solui aut emolliiri, ut post solutionem elastica iterum fiat, variaque ex ea parari possint utensilia, si oleo animali DIPPELII vel oleo cornu cerui rectificato immittitur, et massa mollis postea fumo fuliginis vel coeni exponitur. Idem hoc oleo therebinthinae, calcis

Gg 2

ope

*) V. c. in Hist. de l'Acad. Royal. 1753. p. 128. vid. Com. nostr. Vol. VII. p. 253.

**) Vid. Hist. de l'Acad. 1751. p. 17. et Com. nostr. Vol. VI. p. 55.

***) Fructus eius tricoccus est, fructui ricini similis, sed multo maior, vid. CONDAMINE l. c.

ope rectificato, obtinetur, et sufficit, si vel vapores tantum dictorum menstruorum eam penetrent. Signum vero, illos satis eam penetrasse, est, si resina intumescit et splendida quasi fit. Camphorae quoque vapores, et aether vitrioli idem praestant. Cum itaque corpus hoc tam multis menstruis cedat, illud omnino ad varios usus adhiberi, inprimis vero ad catheteres flexiles, ex eo parandos, vtilissimum esse, Cl. HÉRISANT est observatio.

p. 52. *Observationes botanicae sequentes sunt.* 1. Ill. CERATI Acad. Pisân. Praeses retulit, genistae quandam speciem *) macerando in aqua thermali corticis parenchyma filamentosum seu potius librum dicendum exhibere; etsi vero telae inde praeparatae rudiores sint, cum cannabinis et linteis non comparandae, forte tamen praeparatione vltiori meliores fieri posse sperat. 2. Ill. LINNAEUS, litteris ad Ill. DU HAMEL datis, refert, se viuam plantam Chinensem Theam **) in hibernaculo colere, sperare etiam eandem multiplicari posse, frigoriq[ue] resistere, vti syringa. 3. Secalis femina morbosa, crassa, cornuta, violacea reddi, et a Gallis, quod cristae galli aliquo modo similes sunt, *ergot* dici, gravissimamque morborum variorum causam esse, et omnibus notum, et a nobis passim declaratum est ***); nunc autem Cl. TILLET observauit, et hordei semina morbosa saepe hac mutatione affici.

p. 1. Inter commentarios primum locum tenet 1.) *de docimasia massularum, ex auro argentove confectarum*, dissertatio Auctoribus Cl. HELLOTO, MACQUERET
TIL-

*) Speciem non definit, forte est *spartium scoparia*.

**) Vid. Ill. LINNAEI Diss. de Thea Vpsaliae 1765, quam proxime in amoenit. Acad. Vol. VII. indicabimus.

***) Vid. indicem Dec. I. Comment. nostr. sub voce *Ergot* et Vol. XII. p. 554. XIII. p. 481. XV. p. 65.

TILLET. Iam alio loco Cll. hi viri demonstrarunt *), sub cupellatione plumbum, in lithargyrium mutatum, sorbere aliquid metalli nobilioris, illudque in cupellarum poros fundere; hinc detrahi hanc particulam toti massae, multis additis experimentis, probarunt; hisque variorum celebrium chemicorum sententiam, qui hanc argenti in reducto plumbo praesentiam, pro vera plumbi in argentum transmutatione habuerunt, infringi et prorsus labefactari statuunt. Addunt in hac eiusdem argumenti ulteriori tractatione regulas, quibus hoc incommodum, in re monetaria omnino noxium, vitari queat; docentque tam materiem, quam formam, quin ino magnitudinem cupellarum, cuius temperaturae argenti esse accommodandam, et praeterea ignis gradum probe esse attendendum, qui, si sub ipsa operatione nimius fuerit, omnino huic argenti resorptioni favere solet.

2.) *Meditationes de orbitis nonnullorum cometae* p. 15. rum. Auctore Cl. PINGRE.

3.) *Dissertatio de epochis motuum lunae circa finem saeculi praeteriti* conscripta a Cl. BAILLY.

4.) *Commentarius de argenti sub cupellatione apparenter aucto pondere, et de vero ponderis augmento plumbi in lithargyrium mutati.* Auctore Cl. TILLET. Quod iam alii chemici sub ipsa cupellationis operatione accrescere animadverterunt pondus argento purissimo; illud et Cl. TILLET observavit, et septem octavas grani partes aequare affirmat. Hoc ponderis augmentum, cuius fere huc usque plumbo adscripsit, quod ut plurimum aliquid argenti continet. Accuratus tamen cum in hoc phaenomenon inquiverit Cl. Auctor, plumbumque sum-

Gg 3

ferit

*) Vid. Mem. de l'Acad. des scienc. 1760. p. 362. Comment. nostror. Vol. XIV. p. 599. et Mem. de l'Acad. 1762. p. 5. Comm. nostr. Vol. XV. p. 454.

ferit absque fere vlla argenti miscela fatis purum, vidit tandem hoc dictum ponderis incrementum non verum, sed apparens tantum esse, et ab adhaerente in fundo lithargyrii lamella effici, quam cum noua cupellatione separauerit, nullum argento pondus accreuisse obseruauit. Ipsum vero plumbi, in lithargyrium mutati, pondus vere augeri, omnibus, quas hac de re instituit, experimentis comprobatum vidit; neque tamen huius miri phaenomeni rationem addere valet, in posterum in hanc rem vltius rimaturus.

p. 65.

5.) *Commentarius de specie quadam lapidum, quam salinos lapides vocant* (Salieres). Auctore Cl. GUETTARD. Inueniuntur in luto, ex quo lateres solent formari prope d'Etampes, variisque aliis in locis, lapilli fabricae granulatae, quorum materies, quamuis argillacea, multis tamen granulis micantibus referta deprehenditur, vt ex sale formati videantur, hinc nomen, supra adductum, ipsis impositum fuit. Haec massa micans efferuescit et plane soluitur in acidis, in igne in calcem fatiscit. Videtur igitur ex calcarea terra argillae, in qua latitant, genita, et crystallifata esse. Alii eorum globulos formant, quorum quidam intus caui, et nitidis calcareis crystallis repleti inueniuntur. Multus est, pro more suo, in describendis his lapidibus Cl. GUETTARD, qui tamen nobis vix tantam attentionem mereri videntur, cum fere vbique concrectiones eiusmodi reperiantur. Addit tandem descriptionem alius cuiusdam speciei horum lapillulorum, quae iis, quas fuse alio loco iam descripsit *) et a mineralogis *Granitae* et ab Anglis *Puddingstone* dicuntur, quam maxime similis esse videtur.

6.) Ob-

*) Vid. Mem. de l'Acad. des Scienc. 1753. p. 63. et 139. Comm. nostr. Vol. VII. p. 263. et 265.

6.) *Observationes Saturni et Iouis Vraniburgi* p. 85.
1593 a TYCHONE DE BRAHE factae, cum calculo illarum, quae omnium maxime sunt proficuae. Auctore Cl. JE AURAT.

7.) *Dissertatio prima de theoria satellitum Iouis.* p. 121.
Auctore Cl. BAILLY.

8.) *Observationum mineralogicarum, in Gallia et p. 137.*
Germania factarum, pars prior, Auctore Cl. GUETTARD. Cl. Auctor in itinere Polonico varias in regionibus, per quas transiit, observationes fecit ad mineralogiam spectantes, quarum prior pars, hic publicata, eas, quae Parisias relinquens, Argentoratum usque in variis Galliae prouinciis instituit, continet. Transiit autem Antissiodorum (*Auxerre*) Diuionum (*Dijon*) et Lotharingiae metropolin Nanceium. Plurimae harum observationum ad tabulam mineralogicam Galliae, olim ab eo publicatam *) pertinent. Vix tamen putamus, eiusmodi observationes, fugitiuo oculo in curru nonnunquam institutas, ad oryctologiam regionis cuiusdam cognoscendam, aut locum in mappa mineralogica eidem regioni assignandum sufficere; quod inprimis ea probant, quae in secunda commentatione, qua Germaniae partem Cl. Auctor describit, adferuntur. In hoc itinera-rio Cel. GUETTARD, praecipua attentione nobis dignae visae sunt, descriptio loci, vbi in Lotharingia Mosa (*la Meuse*) sub terra absconditur, atque de- p. 153.
scriptiones salinarum prope *Chateaufalins* et *la P. 156*
Dieuze.

9.) *Historia morbi epidemici in pago Bernensi* an-p. 167.
no 1762 grassantis, Auctore Ill. HALLERO, de qua superius iam, praecipua contenta nouae editionis opusculorum pathologicorum Ill. Auctoris indicantes,
Gg 4 tes,

*) Vid. Memoir. de l'Acad. des scienc. ann. 1746. p. 363. Comment. nostror. Vol. L p. 298.

tes, quae ultimo tomo operum minorum anatomici argumenti inserta est, ad Lectores retulimus *).

p. 172. 10.) *Dissertatio secunda de theoria satellitum Iovis*, Auctore Cl. BAILLY.

p. 190. 11.) *Disquisitio de inclinatione orbitae tertii satellitis Iovis*, Auctore Cl. MARALDI.

p. 192. 12.) *Observatio eclipsis secundi satellitis Iovis d. 4. septembr. 1763. tempor. matut. facta*, a Cl. MARALDI.

p. 193. 13.) *Observationum mineralogicarum, in Gallia et Germania factarum*, pars posterior, Auctore Cl. GUETTARD. Per Sueviam et Bauariam Cl. Auctor Viennam profectus est. Inserta est descriptio fodinarum salis gemmae Salisburgensium elegans, omnique fide digna, cum Cl. Auctore a Cl. BUAT communicata. Varia quoque musea Viennensia describuntur, atque in figuris adiectis stellae marinae species, strobilus pini, in pyritidem mutatus, quem Ill. DE MOLL Viennae possidet, et variae species lapidum Iudaicorum delineantur. Annexa etiam est mappa geographica itineris Cl. Auctoris per Galliam et Germaniam, in qua soli terraeque natura simul quoque indicantur.

p. 229. 14.) *Dissertatio de cometa anno 1762 viso*, Auctore Cl. BAILLY.

p. 235. 15.) *Commentarius de vaporibus inflammabilibus in puteis carbonum fossilium prope Brigantium* (Brignon), Auctoribus Cl. DU HAMEL, HELLOT et DE MONTIGNY. Cum varii fofforum his vaporibus candela admota incensis laederentur, in causam huius rei inquirere iussit viros dictos rex Galliae. Quam cum inueniri putarint in pyritarum praesentia **), hinc eam prorsus remoueri ex his puteis

*) Vid. superius p. 440.

**) Ex particulis potius bituminosis, in aëre suspensis, vapores hos inflammabiles in lithanthracum fodinis obvios

puteis non posse viderint; circulationem motumque aëris in cryptis istis subterraneis, vel cuniculis foraminibusque quae spiritum suppeditent (*Windloecher*) exstructis; vel si talia addi puteis ob varias difficultates nequeant, ignis ope esse promouendum existimarunt, ne nociui tales vapores in cryptis istis subterraneis colligantur.

16.) *Observationes oppositionum Saturni ac Iouis* p. 241. ann. 1755, 1756, 1757, 1758 et 1759, et Iouis per quatuor proxime ultimo loco nominatos annos, una cum calculis earum cum tabulis HALLEYI comparatis, Auctore Cl. JE A U R A T.

17.) *Continuatio harum observationum* 1760, p. 252. 1761, 1762, Auctore E O D E M.

18.) *Commentarius de primaria causa alternae p. 260. turgescientiae venarum iugularium, faciarum et cauarum, sinusque illarum, diuersae ab ea, quae a contractione auriculae cordis dextrae producitur.* Auctore Cl. B E R T I N. Praeter illos usus respirationis, quorum cognitio neminem fugit, restant adhuc alii, ex quibus huius actionis efficacia, in sanguine ad cor deferendo, vel retardando, vel accelerando, conspicua, non vltimus est. Patet autem haec efficacia non modo ex turgescencia vasorum venosorum in inspiratione et expiratione, sed et ex symptomatibus et noxis, quae ex nimis protracta inspiratione in vitam humanam redundant, fusius ab Auctore Cel. hic recensitis. Plerique physiologorum aërem, in inspiratione vesiculas pulmonales distendentem, indeque ortam vasorum compressionem, nec non collapsum vesiculorum in expiratione, horum phaenomenorum

Gg 5

rum

vios rectius deriuat WALLERIUS elem. min. vers. germ. p. 259. Differunt hi vapores a vaporibus suffocantibus arsenicalibus, quibus etiam hae fodinae infestari solent. Conf. Cl. TRIEWALD in Act. Acad. Suec. a. 1740. p. 379. seq.

rum causam esse asseruerunt; quibus nullo quidem modo aduersatur Cel. BERTINUS, qui tantum, etsi nihil impeditenti circulo sanguinis per pulmones oppositum fuerit, tamen eiusmodi intumescentiam ramorum venae cauae, produci posse ex compressione venarum hepaticarum a diaphragmatis descensu et muscutorum abdominalium contractione in respiratione demonstrare annititur. Quod ut fiat, ab anatomica venarum hepaticarum descriptione incipiens, contra Ill. HALLERUM*) monet, ramos venae cauae hepaticos, nec pauciores, nec minores esse venae portarum ramis, neque sanguinis velocitatem, quae in venis hepaticis ex caua oriundis maior, quam in ramis venae portae deprehenditur, ex magnitudinis differentia, sed multo commodius et conuenientius ex impulsu arteriarum hepaticarum, ramis suis in venarum principia hiantium, explicari posse. WINSLOVIUS vero a Nostro taxatur, quod ramos minores harum venarum ad maiores venae portarum propagines pertinere scripserit**), cum tamen omnes venae cauae ramos cum arteriis hepaticis et venae portae systemate anastomosin pati, anatome doceat. Addit BERTINUS errorem, qui WINSLOVIO, de valvula praefixa singulis orificiis venarum hepaticarum, in venam cauam hiantium, agenti, a nonnullis imputatur, nullum esse, cum de ea non ut de vera valvula, sanguinis in istas venas regressum prohibente, loquatur.

P. 276. His praemissis, Cel. Auctor in causas, quae turgescentiam ramorum venae cauae producant, ipsas inquit, quam cum omnes physiologi ab obstaculo, sanguini in pulmonibus in expiratione vel inspiratione

*) Vid. prim. lin. §. 697.

**) Nobis tamen WINSLOVIUS excusandus videtur, cum dubius tantum ea de re loquatur *Traité des Veines*. §. 147.

tione protracta opposito, deduxerint, primus fuit BERTINUS, qui eandem a compressione venarum hepaticarum a diaphragmate et musculis abdominalibus explicandam esse assereret. Talem autem venarum hepaticarum motum alternum in qualicunque respiratione fieri, patet ex eo, quod idem in respiratione vehementiori obseruetur. Haec enim, cum a placidiore respiratione gradu tantum differat, ideoque causa, quae in illa vasa turgida reddat, in hac quoque deesse non possit, sequitur, etiam in leniore respiratione, vasorum saltem maiorum, quamvis minus conspicuam, veram tamen intumescentiam dari. Causa vero huius phaenomeni a pressione aëris in vasa pulmonalia in inspiratione, atque costarum et diaphragmatis in expiratione, plane diuersa est, quum aër vasa quidem pulmonum comprimere possit, maiorum autem venarum distensionem producere nullo modo valeat. Sanguis enim, in ramis pulmonum vltimis stagnans, vix impedit, quo minus ventriculus anterior euacuetur, cum ramorum arteriae pulmonalis diametri maxime dilatari possint. Nec vlla in propaginibus venae cauae ab expiratione vel inspiratione admodum protracta conspicitur intumescencia, nisi simul diaphragma et abdominis musculi in actionem ducantur; his vero conspirantibus, mox venae turgescunt. Praeterea cum diaphragma in inspiratione descensu suo vasa abdominalia maiori vi comprimant, quam musculi abdominales in expiratione id efficere valent, patet, vasorum turgescentiam in inspiratione naturali maiorem, quam in expiratione naturali esse debere. Attamen quotiescunque lenem inspirationem operosior exspiratio sequitur, tumorem quoque venarum in expiratione augeri facile perspicitur. Trunci quoque venarum hepaticarum, quae BERTINO *sinus antra hepatica* audiunt, fluxum aliquem et refluxum san-

sanguinis ostendunt, quum ille in inspiratione copiosius in venam cauam intret, in sequenti vero expiratione ex hac vena in truncos venarum hepaticarum refluat, ex quo simul efficitur, plus sanguinis in inspiratione, quam in expiratione ad cor ferri, licet huius rei indicium in pulsu nullum sit. Non solum enim turgescencia ramorum venae cauae sufficienter probat, sanguinem tunc maiori in copia ad cor determinari, sed facile etiam intelligitur eundem, pressum a diaphragmate in inspiratione descendente, regressuque, a sanguine, qui ex arteriis hepaticis minoribus accedit, impedito, aliam viam, inprimis si, ut saepius fit, muscoli abdominales conspirant, sequi, atque ex hac causa venam cauam intrare.

P. 284. Est, praeter hunc motum venarum, qui a respiratione efficitur, alius in venis cauis pone cor conspicuus, ab alterno auricularum motu et contractione fibrarum muscularium harum venarum pendens, ita comparatus, ut trunci cauarum contrahantur, auricula in diastole versante, expandantur in huius systole. Cum vero Ill. HALLERUS in experimentis suis observauerit, in inspiratione euacuari venas cavas, BERTINUS vero idem in expiratione fieri asserat, huius discriminis causam Noster ponit in eo, quod, cum HALLERUS suas observationes in animalibus vivis incisiss fecerit, contractio musculorum abdominis, ab irritatione per vulnus orta, diversum plane experimenti exitum effecerit *). Venarum

*) Ill. HALLERUS triplicem alternum motum venarum maiorum distinguit I) *pulsus venae cauae*, qui ab eius vi contractili innata pendet et synchronus ventriculi motui est, atque in toto pectore et inferius ad hepar usque observatur. Augetur haec venarum maiorum intumescencia a sanguine, ex auricula anteriore in venam cauam refluyente, inprimis si sanguinis transitus, per reliquas cordis cavitates aut pul-

narum vero hepaticarum truncos, sanguinem, nimis p. 287. magna in copia ad auriculam anteriorem in variis violentioribus corporis motibus properantem, recipere posse, ex comparatione inter eas et venae portarum ramos instituta, quibus multo longiores sunt, patet.

His disputatis, Cel. Auctor, obiectiones varias, p. 289. quas sibi oppositas iri putat, removere studet, additque consuetudina, in quibus ea, quae hic proposita fuerunt, ad praxin medicam, adplicantur. Qualia sunt: iis, qui v. c. a venae sectione vel haemorrhagiam passi, lipothymia se corripiri sentiunt, ad eam evitandam crebriores et fortiores inspirationes conducere, quia per eas circulum sanguinis citatiorem reddunt; aquam frigidam, eiusmodi aegrotis inspersam, odoramenta, sternutatoria, vomitoria, clysmata, omniaque alia, quae motum muscutorum abdominalium excitant eos reficere debere; melancholicos risu et suspiriis leuari, quippe quae eadem praestant cum inspirationes grauiore sint; cephalalgiam

pulmones, quodammodo obstructus est (vid. *Elem. Physf.* T. I. p. 399. et T. II. p. 336.) 2) *refluxum sanguinis a respiratione* oriundum, quem in expiratione fieri asserit (vid. Cl. WALSDORFF diff. *experimenta circa motum cerebri* sistens Gotting. 1752. et Comm. nostr. Vol. III. p. 105. *Hist. de l'Acad. des scienc.* 1753. p. 136. et Comm. nostr. Vol. VII. p. 255. *Comment. Gottingens.* Vol. II. p. 127. et Comm. nostr. Vol. II. p. 698. nec non *Elem. Physf.* T. II. p. 332.) cum in inspiratione venas maiores turgere BERTINUS hic proponat. Idem tamen hoc Cl. RADNICZKY in diff. Pragae 1756. edita iam asseruisse ex *Elem. Physf.* T. II. p. 334. patet. 3) *diaphragmatis in venam cauam inferiorem imperium*, quam venam in descensu huius musculi constringi et inaniri atque contra renes deduci et explanari HALLERUS vidit. In vniuersum de motu sanguinis, per respirationem mutato, conferri adhuc meretur Ill. HALLE-
RUS in *Elem. Physf.* T. III. p. 297. et p. 361.

lalgiam tussi augeri; singultum sanguinem ad caput determinare; tussim omnemque organorum, quae respirationi inferuiunt, motum vehementiorem, iis, quibus apoplexia imminet, nocere; alui subductionem, aut sanguinis ex venis abdominalibus profluum, qualis per lochia, menses, atque hirudinum ad vasa haemorrhoidalia applicationem fit, reuulsionem a capite satis subitaneam nonnunquam producere; in haemoptysi aliisque haemorrhagiis ab omnibus violentis musculorum abdominalium motibus noxam aegrotis inferri; a tussi, sternutatione, vomitu, etc. iis, qui hepatis obstructione laborant, rupturae vasorum, inprimis venae portae, periculum imminere; idem quoque in similibus aegris ex nimia ventriculi repletionem provenire posse; tandemque omnes motus validiores, et incitatiores respirationem grauidis maxime obesse.

P. 294. In fine vim, qua organa expirationis in sanguinem venae portarum agunt, aequalem facit vi, qua per eadem organa aer sub expiratione e trachea propellitur, quae globulum ponderis drachmae vnius 363' valet propellere, ut tertiam fere partem virium, quae atmosphaerae tribuuntur, aequare videatur. Vis autem inspirationis, per abdominales musculos conspirantes aucta, expirationis vi aequalis est. Quae enim in illa desideratur vis, a cartilagineum et ligamentorum elasticitate et muscularium fibrarum in bronchiis actione pendens, in expiratione se ostendens, pressione diaphragmatis, in inspiratione descendens, compensatur. Quo vero portarum vena ad pressiones adeo validas, vi, qua sanguis in arterias agit, non minores, sustinendas apta sit, natura eam celluloso contextu donavit, qui cum eius ramis in hepate distribuitur, nomineque capsulae GLISSONII insignitur, venamque portae eiusque ramos ubique inuoluit.

19.) *Dissertatio de prolongatione perpendicularis p. 299. seu paralleli Parisiensis usque Viennam in Austria.*

Auctore Cl. CASSINI DE THURY.

20.) *Descriptio nouae machinae destinatae ad ponderanda et simul transferenda ex fluuiis in portus et ex portubus in fluuios onera, Auctore Cl. VAUCANSON.*

21.) *Meditationes in eclipsin solarem d. 1. apr. p. 332. 1764. obseruatam a Cl. LE MONNIER.*

22.) *Dissertatio de mutatione caminorum in eiusmodi fornaces, ut aequae ac camini accepti sint, Auctore Cl. DE MONTALEMBERT. Explicationem figurarum vide p. 438.*

23.) *Dissertatio de differentia, quae inter triangula rectilinea ac triangula sphaerica admodum exigua considerata venit, Auctore Cl. DE LA LANDE.*

24.) *Disquisitio de nonnullis transitus Veneris per discum solarem d. 6. iunii 1761. observationibus in regionibus ultra aequatorem sitis factis, ac de commodis, quae ex iis ad determinandam parallaxin solis deriuari possunt, Auctore Cl. PINGRE.*

25.) *Experimenta de resistentia fluidorum, Auctore Cl. DE BORDA. p. 358.*

26.) *Dissertatio tertia de theoria satellitum Iouis, Auctore Cl. BAILLY. p. 377.*

27.) *Observationes botanico meteorologicae in arce Denainvilliers ad annum 1762, Auctore Cl. DUHAMEL. p. 385.* In his observationibus tabulae singulorum mensium exhibentur, in quibus observationes thermometri et barometri, nec non vicissitudines tempestatum declarantur, ex quibus semper in pagina opposita observationes generales deducuntur, postea prouentus regni vegetabilis et animalis et morbi hominum et brutorum animantium breuiter indicantur.

28.) *Commentarius de differentia, quae ex figura Iouis sphaeroidea in dimidia eclipsium satellitum eius duratione oritur, Auctore Cl. DE LA LANDE. p. 413.*

29.) *Dis-*

- p. 420. 29.) *Dissertatio de nouo axium rotarum in horologiis simplicibus situ et combinatione, unde plura his commoda conciliari possunt*, Auctore Cl. LE ROY.
- p. 426. 30.) *Noua methodus computandi eclipses solares deducendique inde longitudes geographicas in hypothesis terrae sphaeroidéae, cum nouis adnotationibus de usu projectionum simpliciore reddendo*, Auctore Cl. DE LA LANDE.
- p. 441. 31.) *Commentarius de salinis Pecariensibus* (Pecais) Auctore Cl. MONTET. Alio loco iam descriptionem harum salinarum a Cl. MATTE exaratam, indicauimus *). Sunt vero lacus falsi in Languedocia inferiore siti, in quos aqua marina immititur, faleque in fundo horum lacuum iam existente magis impraegnatur. Ex his lacubus aqua emititur, et sine igne crySTALLIFATUR per atmosphaerae et solis calorem. Amarum est in principio et acre odoremque violaceum habet, hinc post aliquot demum annos venditur. Sal enim mirabile et sal basi terrea, quae hanc amaritiem et acrimoniam producant, cum a longe minore aquae copia solui possint, quam sal commune, ab aqua, adhuc post exsiccationem in salis massis relictæ, soluuntur, sicque massa perfecte purificatur.

*) Vid. *Mem. de l'Acad. de Montpellier*. Vol. I. p. 286.
Comment. nostr. Vol. XV. p. 214.

XIV.

Traité des eaux minerales avec plusieurs memoires de chymie relatifs à cet objet. Par Mr. MONNET de la focieté Royale de Turin, et de l'Academie Royale des sciences, arts et belles lettres de Rouen. à Paris chez P. Fr. Didot le jeune 1768. 12. pl. 15. sine praefatione.

i. e.

Tractatus de aquis mineralibus, vna cum pluribus commentariis chemicis illuc spectantibus.

Ipsi tractatui Cl. MONNET *dissertationem historicam de aquis mineralibus* praemittit, quae loco praefationis feruire debet. In hac recenset nonnullos scriptores, qui in Gallia, Germania et Anglia aquas minerales pertractarunt, quorum tamen labores Illi non omnimode placent. Perhibet enim post Cl. BOULDU, in Gallia quidem, pauca tantummodo exempla bonae analyseos aquarum mineralium prodiisse: excipit tamen eam, quam Cl. LEROU, Professor Monspeliensis, de aquis Balarucensibus in *Commentariis Academ. Scientiar. Parisiens.* publicavit. Nunc autem ad examen aquarum mineralium regni Gallici denominatus est Cl. VENEL, a cuius facultatibus Cl. Auctor sibi multum pollicetur, licet ille suum tractatum de aquis mineralibus, anno scilicet 1767, quo Cl. MONNET scripsit, nondum ediderit. Communicavit tamen cum Academia Regia Scientiarum duos commentarios de aquis mineralibus, qui in secundo Volumine *Commentariorum eruditum extraneorum* leguntur, et secundum Cl. Auctorem omnem merentur laudem.

Tom. XVI. Pars III.

Hh

Hic

- His praemissis, Cl. MONNET aquas minerales in tres diuidit classes, in sulphureas, alcalinas et ferrugineas *): licet compositae inueniantur aquae, quae de tribus his principiis, vel de duobus participant et vltiorem locum dent subdiuisioni. Accedit ad tractatum ipsum, qui *tria* capita continet. *Primum* caput agit de aquis mineralibus ferrugineis. Contendit Cl. Auctor, priores examinatores fuisse in ea opinione, omnes aquas ferrugineas esse simul vitriolicas. Quum vero hoc falsum sit, paucaeque reperiantur aquae vitriolicae, aquas minerales ferrugineas diuidit in vitriolicas et in ferrugineas proprie sic dictas. Summa disputationis ad id redit, quod plurimi crediderunt, ferrum non esse solubile, nisi ope acidi vitriolici. Hoc quum Cl. Auctor neget, probare annititur, ferrum posse solui in aqua simplici sine alterius medii accessu. Vt hoc euincat, prouocat ad vulgarem et omnibus notam experientiam, qua ferrum in aere humido rubiginem breui contrahat, ideoque ab aqua soluatur. Cui accedat, quod aqua simplex, cui ferrum per aliquod tempus immersum fuerit, particulas contineat ferreas, quas indicet non solum sapor ferrugineus huius aquae, sed etiam eius color purpureus, qui oriatur, si gallarum nuces cum hac aqua misceantur. Interea non negat, ferrum difficillime ab aqua solui et experimentum non semper succedere: cuius rationem quaerit in maiore vel minore quantitate inflammabilis, quod phlogiston vocant et quod ferrum abundare debet, quod ad experimentum adhibetur. Deinde etiam aliquid conferre calorem putat Cl. Auctor, quo minus ferrum in aqua soluatur, quia aquae minerales calefactae solutum ferrum rursus
- p. 8.
- p. 13.
- p. 16.

*) *Ferrugineuses* appellat Cl. Auctor aquas, vulgo martiales dictas, quae, vti PLINIUS ait, ferruginei sunt saporis.

fus labi finant. Inde concludit, nullas posse esse
thermas ferrugineas, seu ferro ditatas. Respondet p. 24.
hac occasione et illis, qui colorem viridem, qui ori-
tur, dum eiusmodi aquae cum syrupo violarum mi-
scentur, a vitriolo ferri deriuare volunt, quum se-
cundum Cl. Auctorem a solo ferro proueniat.
Omnes igitur aquas minerales ferrugineas, quae sta- p. 26.
tim, ac calori exponuntur, ferrum deponunt, non
perfectum continere ferrum, sed ochram et sic con-
tra, Cl. MONNET arbitratur. Tandem affirmat, p. 32.
eas aquas minerales, quae admixtione lixiui illius
alcalini, quod ad confectionem coerulei Prussici ad-
hibetur, nullum colorem manifestant coeruleum,
pro ferrugineis esse habendas: illas vero, quae ta-
lem colorem exhibent, pro vitriolicis. Huius appa-
ritionis rationem ex regulis affinitatis, vti chemici
vocant, reddere studet. Dicit enim, acidum vitrio-
licum, quo aquae vitriolicae abundant, sal alcali fi-
xum aggredi; deinde, partes tingentes coeruleas,
libere factas, praecipitari et cum ferreis particulis,
pariter ab acido liberatis, vniri. Quae, quum cau-
sa haec in ferrugineis aquis absit, ita non euenire
possent. Quum hae opiniones et explicationes mul-
tum verisimilitudinis habeant, vt ab aquarum mine-
ralium scrutatoribus examinentur accuratius, omni-
no merentur.

Porro distinguit aquas ferrugineas in spirituosas p. 35.
et non spirituosas *): has frequentius reperiri per-
hibet, quam illas. Transit ad vitriolicas ferrugi- p. 37.
neas, quas minus frequentes esse asserit, quam ple-
rumque creditur. Nullas nouit in tota Gallia, quam
aquas *Passy*. Quamuis vitriolum in aquis vitrioli-
cis non queat sisti forma, in crystallos redacta, quia
Hh 2 mate-

*) Ad hanc classem pertinere videntur aquae Steckni-
censes, nuper in Bohemia repertae, quarum men-
tionem fecimus in Comment. Vol. XV. P. I. p. 91.

materia salina peregrina simul coniuncta est, quae crystallisationem, ut aiunt, impedit: tamen secundum Cl. Auctorem in illis continetur, quod in sequentibus probavit. Dantur tamen quoque aquae vitriolicae, quae loco vitrioli residuum vitriolicum exhibent, quod extracto, vel potius lixiuio simile est, et a chemicis *aqua mater vitrioli*, (*eau-mere vitriolique*) appellatur. Ad detegendas aquas minerales vitriolicas praeter supra additum experimentum, cum lixiuio alcalino instituendum, alium compendiosorem indicat modum, qui in eo consistit, quod charta coerulea immersa aquis vitriolicis rubicundum acquirat colorem.

P. 41. In capite *secundo* Cl. MONNET aquas alcalinas examinat, quarum duae sunt species, vel alcali minerali, vel fixo dotatae. Alcalinae omnes se produnt sapore et ebullitione, efferuescentiam aiunt, cum acidis. Accidere tamen interdum potest, ut alcali minerale non in tali contineatur quantitate in aquis alcalinis, ut ebullitionem producere queat, tunc Cl. Auctor salem, basin terream habentem, quem vulgo oleum calcis appellant, aquis examinandis, immittit et statim alcali minerale per deiectionem, praecipitationem chemici dicunt, se manifestat. Hae aquae plerumque multa terra absorbente commixtae sunt.

p. 46. Alcali minerale duplici forma in aquis alcalinis inuenitur, vel pura et crystallos dante, vel lixiuii instar.

P. 53. Aquae minerales, quae alcali fixum, quale praebent vegetabilia, continent, rariores sunt illis, quae minerale. Attamen tales dari Cl. Auctor asserit, et in aquis Spadanis se eiusmodi alcali vegetabile reperisse perhibet.

P. 55. Aquis alcalinis succedunt aquae sulphureae, quas in capite *tertio* pertractat. Sulphureae sunt, quae

quae odorem hepatis sulphuris spargunt et argentum purum nigro colore obfuscant. Interea admodum rarae sunt illae aquae, quae verum hepar sulphuris exhibent et additione acidi verum sulphur labi sinunt. Valde igitur difficile, imo impossibile plerumque est, sulphur acquirere ex istis aquis, quae tamen sulphureae audiunt. Quare Cl. Auctor recte distinguit aquas, quae tantum vaporem edunt hepatis sulphuris, ab illis, quae verum praebent sulphur. Vapor autem solus non sufficit ad praesentiam sulphuris cognoscendam. Indicat tantummodo vestigia sulphuris, vel sulphur destructum et de huius partibus componentibus adhuc quasdam restare.

Sequuntur nonnulli commentarii et dissertationes de quibusdam aquis mineralibus. Primum locum occupat *dissertatio de optima methodo aquas minerales examinandi*. Reiectis inutilibus, quae multi adhibent, experimentis, aquas minerales explorandi, summe necessaria adducit. Primum contemplandus est color aquae, deinde examinandus eius odor et sapor; post ei affundendae sunt diuersae solutiones et admiscenda diuersa salia, prout has vel illas partes in ei contentas suspicamur; e. g. infusio gallarum Turcicarum; lixiuium alcalinum ad detegendum coeruleum Berolinense paratum; sal cum basi terrea coniunctus, vti oleum calcis; alcali fixum; spiritus minerales acidi; solutio mercurii; solutio argenti; et quae sunt reliqua: tunc decoquendae sunt aquae per diuersos gradus; tandem residuae partes examinandae. Multa hic repetuntur, quae in praecedentibus tribus capitibus iam protulit. Procedit ad analysin nonnullarum aquarum mineralium, quas secundum praemissas regulas explorat. Primum exemplum dant aquae de Bard en Auvergne: secundum aquae d'Aumale, et de Rouen; quas ferrugineis accenset; tertium aquae Aquisgranen-

- ses, quas sulphureis adscribit; quartum aquae Spadanae, praesertim *Pouhont*, quas spirituosas, quae multum *Gas* continent, adnumerat: quintum aquae
- p. 149. ex fodinis carbonum fossilium *de Littry* in Normania inferiore prouenientes; et sextum, aquae *de Passy*, hodie celebres sub nomine trium fontium *de Mr. le Veillard*, quas ambas ad vitriolicas refert Cl. Auctor.
- p. 167. Vltimae analysi aquarum *de Passy* accedit singularis *appendix*, quae tertio fonti dicata est, quem Cl. Auctor ratione partium constitutiuarum omnino diuersum a reliquis duobus reperit.
- p. 175. Has analyses excipit *commentarius de proprietate, quam habet vitriolum martiale ingrediendi generationem, formationem dicunt, crystallorum quorundam salium*. Vt melius intelligatur hic commentarius necesse est, ut repetamus ex praecedenti analysi aquarum mineralium *de Passy* experimentum, quod fecit Cl. Auctor, dum infudit solutionem alcali fixi in modo dictas aquas minerales. Obtinuit enim praecipitatum, ut aiunt, viridescens, intime combinatum cum sale quodam medio, cum basi terrea composito, quale acquiritur ex solutione vitrioli martis, et solutione supra memorati salis *Epsom* commixta, dum cum alcali fixo praecipitatur. Hoc praecipitatum neque potest in crystallos redigi, neque eius partes componentes ob earum intimam combinationem per reagentia disiungi et seorsim fisci, quod tamen in aliis similibus compositionibus admodum possibile est. De hoc mixto statuit Cl. Auctor, quod praecipuam partem aquarum mineralium *de Passy* efficiat. Quum priores examinatores harum aquarum hanc partem neglexerint et, ut Cl. Auctor arbitratur, vel cum aqua matre vitrioli, vel cum sale mirabili GLAUBERI confuderint, multum sibi de hac obseruatione, quam nouam putat, promittit, inde etiam peculiarem super hac re conscripsit commenta-

mentarium. In hoc probare conatur, unionem illam intimam vitrioli martialis cum sale *Epsom*, quam priores scriptores non intellexerint, solum obstaculum praebuisse, cur ad perfectam cognitionem aquarum mineralium *de Passy* non peruenerint. Affirmat enim vtrumque ita esse coniunctum, vt difficillime possint dissolui. Nullus ex Auctoribus chemicis, quos Cl. MONNET consuluit, consuluit autem multos, illi satisfecit, excepto Auctore *dictionarii chemici*, quem idem obseruasse dicit. In commixtione vitriolorum, ferri scilicet, cupri et zinci, seu albi, intimam hanc combinationem inter se iam reperiri asserit. In hoc autem experimento omnes circumstantiae non eadem nobis videntur, vt cum prioribus perfecte conueniant. Imitatus est p. 231. igitur ipsum illud mixtum residuum aquarum mineralium *de Passy*, coniungendo vitriolum martiale cum sale *Epsom*, tartaro vitriolato, sale GLAUBERI ac alumine: et crysfalli figuram vitrioli vel salis mixti, prout hoc vel illud quantitate praeualuit, habuerunt, difficillime autem potuerunt separari. Cum hoc commentario connexus est sequens, qui p. 245. agit de *dissolubilitate*, vt vocant, *calcis ferri in acidis*, quo simul demonstratur natura aquae matris vitrioli (*eau-mere vitriolique*). Quum nonnullae aquae minerales Cl. Auctori exhibuerint materiam vitriolicam, occasionem hoc illi dedit inquirendi in naturam aquae matris vitrioli. Omne vitriolum forti igne coctum et aqua solutum, praebet, vti ferrum longe vstum et in acidis solutum, aquam matrem vitrioli. Idem accidit, si vitriolum, seu dilapsum est in aere libero: aut ferrum suo inflammabili est orbatum, quod fit, dum ex solutione, in acidis facta, per alcali fixum praecipitatur et calx ferri nominatur. Priuatio igitur inflammabilis ineptum reddit ferrum ad formandas crysfallos, seu sistendum vi-

triolum. Solutio autem habet naturam et qualitatem aquae matris vitrioli.

p. 258. Huic commentario accedit *supplementum, quod nonnullos modos recenset, conficiendi tincturam martis LUDOVICI*. Exhibuit autem Cl. Auctori cum spiritu vini talem tincturam aqua matris vitrioli, vitriolum calcinatum, et calx ferri in acidis soluta.

p. 269. Sequitur *commentarius, quo examinatur conditio et natura minerarum ferri*. Quum Cl. Auctor in ea sit opinione, pyritas nihil conferre ad generandas aquas minerales, sed mineras tantummodo ferri: has ut examinaret, easque detegeret, quae hanc facultatem haberent, necesse iudicauit. Sunt autem ex eis hae, quae magnetem sequuntur et quae ab acidis soluuntur. Reliquae, ochraceae scilicet, et quae haematidis nomine distinguuntur, hac facultate carent. Exhibent enim cum acidis mixturam salinam aquae matri vitrioli similem, idque tribus experimentiis probat.

p. 281. Pyritis mentio occasionem dedit Cl. Auctori instituendi *tentamen analyseos pyritis*. Celeberrimus HENCKEL affirmabat, partes principales componentes pyritarum esse ferrum, sulphur et terram non metallicam. Disputat Cl. Auctor, num sulphur existat in pyrite iam formatum, vel non formatum? Post nouem cum diuersis pyritis instituta experi-

p. 304. menta, tandem concludit, in omni pyrite contineri ferrum vnitum cum sulphure imperfecto et terra argillacea.

p. 305. Commentarium hunc excipit alius *de proprietate, quam habent materiae acerbae praecipitandi, ex eorum dissolvente, corpora metallica*: indicatur simul modus soluendi *Platinam* non minus in alcali fixo ac aurum et ferrum. Hic commentarius parum conexi habet cum aquis mineralibus, ideo pauca tantum ex eo notabimus. Ostendit non modo ferrum, sed

sed etiam reliqua metalla, in acidis soluta, praecipitari per admixtum acerbum, seu adstringens, vegetabile. Haec praecipitata, in nouis acidis rursus soluta, affuso alcali fixo, denuo praecipitare voluit Cl. Auctor, sed incassum. Inuenit e contrario solutionump. 313. colores magis densos saturatosque, tamen simul transparentes: ex quo colligit, alcali corpus praecipitandum potius soluisse, quam ad praecipitationem disposuisse.

Huic commentario succedit *commentarius de sale* p. 323. *Epsom*, et de *basi terrea huius salis*. Nimis notus est sal *Epsom*, quam vt de illo multa verba facere necesse habeamus. Certum est, quod is, qui hodie venditur, non ex fonte, quo nomen accepit, coquatur, sed arte componatur, hinc adulterinus fit. Communis opinio est, illum confici ex acido vitriolico et terra absorbente. Sed ex acido vitriolico et terra absorbente, oritur etiam selenites. Ergo, vt illa terra specie diuersa sit, necesse est. Paratur, vti p. 330. Cl. Auctor perhibet, ex aqua matris vitrioli et matre salis marini, quae per aliquod tempus coniunctim ebullire et coquere debent. Vitrioli tunc acidum deferit ferrum et, fugato acido salis marini, intrat huius salis basin terream: nouusque oritur sal. Vt vero accuratius cognoscat Cl. Auctor, ad quam speciem haec terra pertineat, hanc rursus ex sale nouo, ope alcali fixi, praecipitauit et, factis experimentiis, inuenit, eam non esse calcaream communem, sed illam, cum qua alumen paratur, et quam Cl. MARGGRAFF, Berolinensis, in lapide serpentino Saxonico detexit. Examinat nunc propius terras cal-p. 337. careas, simulque inquit in earum originem, qua occasione reperit, terras calcareas eandem naturam habere ac terrae, ex animalium ossibus et vegetabilibus acquisitae.

p. 350. *Finem facit examen modi, quo terrae uniuntur cum aqua.* Simplicissimum hunc credit Cl. Auctor, sine omni accessione acidi, vel alius salis. Quemadmodum ferrum à sola aqua posse solui statuit: ita solam aquam sufficere putat ad solutionem terrarum, quod experimentis confirmare studet. Attamen aërem, vel *Gas* tanquam causam concurrentem admittit, sicut et concursum terrarum, specie diuersarum, solutionem facilitare asserit.

XV.

La taille au niveau. Mémoire sur la lithotomie par l'appareil latéral, ses circonstances et dépendances, avec addition de quelques nouveaux instruments pour cette opération. Par Mr. POUTEAU fils, Doct. en Médec. Maître en Chirurgie etc. A Aignon aux dépens de l'Auteur 1765. 8. pl. 7½. tab. aen. 2.

i. c.

Lithotomia ad amussim, seu commentarius de calculi sectione laterali, vna cum eius adiunctis et euentis, accedit descriptio nonnullorum nouorum instrumentorum ad hanc operationem. Auctore Cl. POUTEAU filio etc.

Cl. POUTEAU, de cuius miscellaneis chirurgicis alio loco ad Lectores retulimus *), libellum, quem nunc indicamus, Cl. LAURE'S chirurgus et lithotomo Lugdunensi dedicauit, in quo ope instrumentorum, hic descriptorum, calculi sectionem felicissimo

*) Mélanges de chirurgie, à Lyon 1760. vid. Comment. nostr. Dec. I. Suppl. I. p. 140.

eiffimo cum fucceffu inftituit. Methodus Cl. Au-
 ctoris in vniuerfum fatis cum laterali conuenit; vti-
 tur vero, fi fcalpellum, quo integumenta et pingue-
 do diuiduntur et ipfa vefica aperitur, quod cum vul-
 gari lithotomo Chelfdeniano conuenit, fpecillum-
 que fulcatum, annulo inftitutum, exceperis, quod
 Cl. Auctor in mifcellaneis chirurgicis, iam com-
 mendauit *), tribus inftumentis, *directore* fcilicet,
moderatore et lamina lithotoma feu *proftatotoma* (*lame*
lithotome ou proftatome). Duplicem autem Cl. Au-
 ctor horum inftumentorum inuentione vtilitatem
 quaefiuit; primo vt vefica et proftata inciderentur
 cultro, cuius latitudo ad variam aegri, in quo fectio
 inftituitur, magnitudinem et aetatem rationem habe-
 ret **); deinde vt ea ipfa incifio fieret in aegroto,
 perfecte in fitu horizontali ita collocato, vt fectionis
 linea cum linea horizontali certum aliquem deter-
 minatae magnitudinis angulum efficeret ***). Ita
 vero Cl. Auctor in inftumentorum fuorum appli- p. 5.
 catione verfatur, vt ante operationem fpecillum ful- p. 36.
 catum immittat veficae aegri fedentis, non in dorfo
 cubantis, cum experientia eum docuerit, illud
 hac ratione facilius applicari poffe. Habet hoc
 fpecil-

*) Vid. Mélang. de Chir. et Comment. l. c. p. 150.

**) Cl. Auctor monet iam Cl. LE DRAN fimilibus
 laminis diuerfae magnitudinis in diuerfis aegris vsum
 effe. Quamquam vero culter huius Auctoris, quem
en rondache vocat (vid. EIUSD. *Operat. de Chir.*
 p. 272. et in tabula aenea adiecta f. 2.), cum Cl.
 POUTEAU inftumento fimilitudinem quandam ha-
 bet, tamen neque in Cl. LE DRAN libro de ope-
 rationibus chirurgicis, neque in alio (parallèle des
 different. method.) locum inuenire potuimus, in quo
 haec laminarum diuerfitas indicata fit.

**) Linea fectionis proftatae cum linea horizontali,
 quae *moderatoris*, mox describendi, ope determinatur,
 atque angulum rectum cum raphe feu linea perpen-
 diculari facit, angulum circa 150 graduum efficit.

specillum, vti iam monuimus, annulum in superiore parte, cui chirurgus digitum minimum manus sinistrae immittit, reliquis vero huius manus digitis scrotum subleuat atque cutem perinaei tendit. Tunc scalpello lithotomo, quod manu dextra tenet, plagam facit, quae paululum superius margine anus ad raphen incipit, atque oblique versus tuberositatem ischii et adhuc supra eam descendit. Ampla vero ea sit et inprimis in inferiore fine producta, quo vrina post operationem libere per eam effluere possit. Neglectus enim huius rei, ex Cl. Auctoris mente, non solum causa est stagnationis lotii post operationem in contextu celluloso perinaei, ex qua ulcera, quae latius serpunt, haud raro oriri, atque aegros ipsos nonnunquam perire, omnes fere lithotomi conqueruntur; sed et inter praecipua impedimenta est, quae extractionem maioris calculi difficiliorem reddere solent. Alium quidem usum maioris plagae SHARPIUS in eo ponit *), quod arteria laesa facile vinculo constringi possit, nunquam tamen Cl. Auctor ea ligatura opus habuit, eamque in vniuersum difficulter institui posse iudicat. Addit sectionem externam similem directionem habere debere, quam sectio interna, mox describenda, habet, quia re vrinae liberum profluuium egregie quoque adiuuatur. Iam cute et pinguedine diuisa, indice dextrae manus catheteris fulcum quaerit, eodemque reperto, idem scalpellum ita introducit, vt digitus dorso eius impositus sit, paullulum tamen supra apicem emineat **), tumque ad ductum sulci specilli, ante sectionem in vesicam introducti et dextrorsum inclinati, in inferiore vulneris parte, ne acceleratores laedat, vrethram aperit, parua tantum plaga, vix aliquot lineas longa. Tunc scalpello se-

possi-

*) Vid. EIUSD. operat. in surgery p. 100.

**) Vid. Mélanges et Comment. nost. l. c.

posito, per hoc vulnus instrumentum aliquod, ductori canaliculato (*gorgeret*) quodammodo simile, quod *directorem* vocat, in vesicam introducit et postquam illud in vesicam penetrauit, specillum sulcatum extrahit, cuius nullus amplius usus est. Tunc directoris manubrio aliud instrumentum adaptat, quod *moderatore* dicit. Hoc amussim sistit, seu cylindrum vitreum, spiritu vini ita repletum, ut bulla aërea supersit. Haec in sinistro latere directoris est; in dextro vero ex eodem moderatore ad angulum 150 graduum, duo crura descendunt, quae ita a se inuicem distant, ut per eorum hiatum, *lamina lithotoma* seu *prostatotoma* versus vesicam pelli possit. Huius laminae acies prostatam diuidit, dorsum vero et apex in sulco, qui in dextro latere directoris est, latet. Quatuor vero eiusmodi laminas Cl. Auctor habet, diuersae magnitudinis. Earum prima, quinque lineas lata, in pueris ad sextum aetatis annum adhibentur; secunda, sex lineas lata, in pueris a sexto ad duodecimum usque annum; tertia in adolescentibus ad vicesimum usque annum, et quarta, quae octo linearum latitudinem habet, in iis, quae vicesimum annum iam superarunt. Hac autem lamina inter crura descendencia moderatoris immissa, chirurgus directorem ita teneat, ut manubrium longe inferius sit apice, qui superiorem vesicae partem spectat, in moderatoris vero amussi bulla aërea in medio haereat, atque tunc laminam prostatotomam versus vesicam urgeat, sicque vesicae partem, quae ob prostatam eminentem protuberat, et duas tertias partes prostatae ita diuidit, ut anterior eius glandulae pars tota discindatur, inferior vero siue basis versus vesicam non laedatur. Vulnus vero maius nec in vesica, nec in prostata necessarium est. Colum enim vesicae (*goulot*), cui vulnus inflictum est, in calculi extractione sine ulteriori dilaceratione, si modo

modo operator caute versatur, facile cedit *) ipsa-
que prostatata, si etiam eius diuisione non sufficeret, ta-
men sub calculi extractione dilaceratur ea directione,
qua incisa est **). Minore vero eiusmodi plaga,
nec vesicae collum nimium inciditur, nec plica peri-
tonaei inter intestinum rectum et vesicam, imprimis
si ea vacua aut circa calculum contracta est, descen-
dens ***), nec arteria retro prostatatam excurrentes lae-
ditur. Reliqua vero in hac operatione Cl. Auctor
consueti more peragit, ductoremque canaliculatum,
postquam laminam lithotomam et moderatorem se-
posuit, ope fulci directoris in vesicam introducit.

- p. 11. His propositis, Cl. Auctor instrumenta, modo
descripta, cum lithotomo occulto fratris COSMII
comparat, eique praefert, variasque obiectiones
p. 15. quae contra nouam hanc methodum proponi pos-
sent, remouere studet. Transit deinde ad varia
symptomata, quae post operationem accidere so-
lent. Cum ob insignem arteriarum varietatem ea-
rum laesio non semper vitari possit, haemorrhagia
nonnunquam molestiam creat. Haec si leuior est,
non nocet, cum idem, quod venaesectio, praestet; si
vero nimis magna sit, ad eam compescendam epi-
themata frigida, ex aqua et aceto, scroto et abdomini
imposita, multum valent. Quod si vero nec eorum
ope haemorrhagia sistatur, digitum Cl. Auctor vul-
neri immittit, locoque laesionis arteriae ex pulsu
inuento, arteriae orificium per quartam horae par-
tem comprimit. Vfus quoque est cauterio poten-
tiali ex antimonii butyro, arteriae laesae applicato.

Fistulis

*) Vid. Mélang. et Comment. l. c.

**) Idem hoc Cl. Auctor iam in miscellaneis chirurgi-
cis p. 213. proposuit, suisque postea obseruationibus
confirmauit Cel. CAMPERUS in Demonstr. ana-
tom. pathol. L. II. p. II. vid. Comm. nost. Vol. XIII.
p. 273.

***) Vid. CAMPER l. c. p. 10. et tab. II. fig. 3.

Fistulis agarico obuolutis, quas varii Auctores ad haemorrhagiam sistendam commendant, parum fidei, maioremque fructum ab immisione fistulae nude, quam LE DRAN *) proposuit, expectat, ut alia taceamus. In fistulis perinaei, quae post calculi sectionem oriuntur, callosas partes lapidis infernalis ope destruxit, sicque perfectam earum curationem obtinuit. Testium inflammatio, quae ex vasis deferentis inflammatione ad testem producta oritur, si modo sectio lateraliter satis facta sit, raro accidit, atque etiam cataplasmatibus emollientibus, clysmatibus et lenioribus purgantibus adhibitis, facile dissipatur. Tandem de incontinentia urinae post calculi sectionem in litteris CL. POUTEAU ad CL. PAMARD P. 59. eiusdemque CL. Viri responsione disputatur. Haec P. 62. nonnunquam sine ullo sectionis vitio oritur ex supuratione vulneris nimis longa, aut ex vesicae paralyfi, atque nulla arte curari potest. Miramur tamen CL. Auctorem putare, amuletum ex bufone siccato, olim a DE HEERS propositum, in eiusmodi incontinentia forte aliquem usum habere posse. Quae P. 81. vero CL. Auctor de aliis morbis symptomaticis, qui nonnunquam aegrum post operationem infestare solent, de vulneris cura, de iniectionibus in vesicam, (quas nonnulli post operationem commendant, Notster autem reiicit) et de fistularum in vulnere relictarum minus recto usu monet, quarum loco vulnus digiti potius immisione apertum seruat, taceamus. In duabus tabulis aeneis instrumenta descripta delineata sunt, sed, nonnullae figurae instrumentorum inuersae exhibentur, sculptoris errore iis sinistrorsum vergentibus, quae dextrorsum dirigi debuerant.

*) Operat. p. 259.

XVI.

ANTONII DE HAEN S. C. R. A. Maieſtatis
Conſilarii et Archiatri Med. Prof. Prim. cet.
Pars vndecima rationis medendi in noſoco-
mio practico. Viennae Austriae ſumptibus
Hermanni Joſep̃hi Krüchten. 1767. 8. Al-
phab. I. Tab. aen. IV. Pars duodecima ibid.
1768. 8. pl. 19.

- P. XI. **P**ergit Cl. Auctor laudando ſtudio in obſervationi-
bus practicis proponendis et methodo medendi
P. I. inde accuratius definienda. In huius partis capite
primo *de febris intermittenſibus* agit et ex multis
aegris obſervatis, tres ſeligit hiftorias morborum,
P. 4. quorum duo decocto quodam ſine cortice Peruvia-
no, tertius et decocto et cortice ſanati ſunt. De-
coctum in hos uſus commendatum eſt: Rec. Rad.
Gram. Taraxaci ana lib. vnam c. ſemiſſe, minutissi-
me conciſam et diu tuſam coque aqua pura bihorio.
Colaturae prelo fortiter expreſſae lib. tribus, adde
oxymellis ſimplicis lib. ſemis, ſalis polychreſti drach-
mas ſex; vnciam ſumat aeger quouis bihorio.
p. 6. Triplicis generis febre intermittente oriun-
dos tumores recenſet. Primum genus in ventre
et inprimis hypochondrio ſiniſtro naſcitur nullius
diſcriminis, oſtendit enim, SYDENHAMUM. hos
tumores vt ſalutares exoptaſſe, his enim ſimilia ſunt
oedemata crurum, quae vel ſponte vel leni frictione
diſſipentur. Secundum genus viſcera thoracis et
abdominis obſtructa ſiſtit, his icterus, hydrops et
rhachitis ſe iungunt et curationem difficillimam
reddunt. Tertium genus obſtructiones viſcerum
irreſolubiles exhibet in ſcirrhum et cancrum tranſ-
euntes, quibus ſc. aſcites et hydrops ſaccatus ad-
iungit.

Variis

Variis aliis obseruationibus inspersis, methodum p. 36.
 Ill. BOERHAAVIJ, febribus intermittentibus et in
 paroxysmo et extra eum medendi, examinat. Inci-p. 40.
 pit a victu tenui, quem nonnulli commendant, aliis
 tamen contradicentibus. Sed vrget omnino No-
 ster, aegrum victu non onerandum esse, nec nimis
 extenuandum, si enim is bene appetit, digerit et
 egerit, victu vtatur, qui ad has qualitates conseruan-
 das requiritur et in hac re testimonio HIPPOCRA-
 TIS vtitur, si vero aegri imbecilles sunt, parcior et
 tenuis quidem, sed frequentior victus conceden-
 dus est.

Emetica medicamenta, etsi a quibusdam diu ante p. 44.
 paroxysmum exhibentur, melius tamen, proxime an-
 te eum data, expurgandae materiae morbi conue-
 niunt. Tenendum tamen est, non omnibus omni-
 no aegris vomitoria conuenire, nonnullos potius, iis
 datis, debilitari. Medici etiam interdum exigunt, vt
 vomitorium eo interuallo a paroxysmo propinetur,
 quo paregoricum medicamentum interiici possit. Pur-
 gantia etiam medicamenta, si ex impuritatibus cor-
 poris indicantur, eodem modo consideranda sunt.

Venaesectione plethoricis conuenit, hinc etiam in p. 53.
 intermittente febre interdum exigitur, sed rarius
 omnino in assuetis, qua in re Gallorum testimonia
 commemorat, qui has curationis rationes laudant.
 Aliter res comparata est cum haemorrhoidum fluxu,
 qui vel vniuersam sanguinis copiam imminuit, vel
 eius congestiones in systemate venae portae arcet.
 Sudor in his febribus vario modo excitatus est; alii
 semper diluentibus et attenuantibus medicamentis
 corpus repleuerunt, sudorem ante paroxysmum
 excitarunt ac in eius progressu adiuuarunt; alii aro-
 maticis et calidis medicamentis semper extra paro-
 xysmum vsi sunt, qua in re myrrham, absinthium et
 alias plantas aromatico amaras inter antifebrilia re-

tulerunt, nonnulli haec tantum ante paroxysmum exhibuerunt; alii frictiones, balnea, cursum aliasque corporis exercitationes pro hoc scopo suaserunt. Haec omnia certe a prudenti medico dirigenda sunt, ne, obstructionibus relictis, aeger post febrim fugatam ad morbos chronicos v. c. hydropem disponatur.

- p. 65. Recensentur postea varia epithemata ex acribus, irritantibus, aromaticis et salinis, carpis aliisque corporis locis ad fugandam febrim applicata, quorum effectum dubium candide diiudicat Noster. Similis etiam ratio est inunctionis et frictionis, thecae vertebrarum, breui ante febris accessum, applicatae, qua in re quaestio additur, an inunctio mercurialis quartanarios iuuet? quae in suspitione luis venereae coniunctae, forte valebit.
- p. 77. Adstringentium vsus v. c. tormentillae, pentaphylli radicum cet. postea examinatur. Haec forte in aegris, a febre debilitatis, solidis flaccidioribus et fluidis maxime aquosis instructis, vtilia sunt. Praestat tamen his cortex Peruvianus, cuius laudes hic repetit et variis febribus accommodare docet. Movet etiam quaestionem, an quaedam medicamenta, cortici addita, eius, in minori dosi propinati, vim augeant? Etsi autem formulam, cum eo communicatam, indicat, in qua praeter terrea radix gentianae adiecta est, certos tamen effectus non refert.
- p. 90. Caput secundum *morbos acutos* recenset et de pleuritide et peripneumonia potissimum agit, de iis tamen non consuetas mutationes, sed singulares quasdam refert. Iuencula, pleuritide affecta, ante quartam iam venaesectionem dolorem, ab inferiore parte ad sinistram sterni et humeri ascendentem, perceperat, tamen cum hic iterum descendisset, reiteratae venaesectiones instituendae erant, quarum ratio-

rationem longius describit. Sputa, quae ad quadragimum quartum diem aquosa et spumosa erant, postea aliqua suppurationis initia monstrabant, neque tamen his, neque aliis excretionibus vera criseos signa indicabantur, die tandem septuagesimo et sequentibus nec tussis, nec alia symptomata observabantur, manifesto indicio, morbum tarde quidem, sed recte superatum esse. Huius itaque morbi diagnosis et prognosin praeter dolorem lateris et crustam sanguinis inflammatoriam, consueta alia signa non definiuerunt. Remedia, in hoc morbo adhibita, p. 101. erant, sanguinis missio, quinquies instituta, vesicatoria, enemata crebriora, decocta herbarum emollientium et attenuantium cum melle et oxymelle squillico, antimonium diaphoreticum non ablutum et kermes minerale, mucilagines cum massa pilularum de styrace, ut medicamenta paregorica, de nocte sumenda, oleum quoque lini, externo et interno usu salutare, maxime laudatur. Ad curam ventriculi, miserrimo antea victu deprauati, adhibita sunt infusa rhabarbarina, quibus etiam alius crebrius subducebatur.

Faber lignarius, homo robustus, variis de causis p. 104. peripneumonia affectus, in curatione sequentia praecipue ostendit. Sanguis, die quinto ex dextro brachio missus, solutus cum crusta subuiridi tremula apparebat, post octo horas ex sinistro brachio subductus sanguis crustam duram et crassamentum firmum exhibuit. Pulsus quinto die durus fuit et fortis, sexto debilis inaequalis, septimo naturali similis. His subiunguntur varia de crisi ad dies non adstricta, imprimis de sudoris varietate. Die decimo quarto morbi noua et grauior febris mota est, nec vesicatoriis, nec venae sectionibus compescenda; in his declarandis varias observationes de caloris gradu et missi sanguinis mutationibus recenset Cl. Auctor, quas
 li 2 cum

cum repetere haud possumus, notamus tantum post quinquaginta uncias sanguinis detractas pulsum plenum et fortem mansisse. Aegro autem mortuo, sectio cadaueris sequentia praecipue exhibuit, ex quibus forte morbi ratio apparet. Hepar et splen mole aucta erant et, cum interiecto ventriculo distento, colon, in media parte contractum et singulari ratione inflexum, ad regionem umbilicalem depresserunt. Ileum intestinum et duodenum cum aliqua parte omenti inflammationem variam referebant, pulmo vndique accretus, in dextra auricula polypus albus ad iugulares usque venas extendebatur, in cerebro omnia sana praeter insolitam siccitatem.

p. 126. Caput tertium *de morbo ileo* refert. Amplissima haec est tractatio, quae causas, symptomata et signa cum methodo medendi variis tentaminibus illustrata, in variorum aegrorum accurata observatione declarat et, sectione cadauerum instituta, laesiones partium internarum non tantum describit, sed variis iconibus illustrat. Cum de his omnibus accurate satis agere nequeamus, seligamus tantum quasdam

p. 137. annotationes Cl. Auctoris, sparsim propositas. Quae ilei letalis causa proxima sit, dubitat Noster, cum eam et in inflammatis et gangraenosis ilei plagis et in complicato colo inuenerit. Tempestiua venaesectio, multum olei, purgantia opiatas interpolata, clysmata ex fumo tabaci, optima, si mature adhibentur, sunt auxilia. Omenti defectum inter colicae causas referri posse, eius usus in fouendis et lubricandis inte-

p. 173. stinis declarat. Virium proiectio, pulsus cum celeritate paruitas, frigus extremorum, oculorum collapsus, faciei et labiorum praecipue lior, indolentia partium, antea dolentium, funesta signa sunt et gangraenam metuere iubent, haec vero et ex his praecipua, si vel desunt, vel emendantur, a gangraena, clandestine obrepente, hominem non liberum reddunt.

In

In fartore septuaginta trium annorum, ileo mor-^{p. 176.}
bo defuncto, sectio cadaueris duodecim flexus coli
monstrauit, quae Tab. III. fig. 2. declarantur, reliquis
partibus, vel maxime contractis, vel aere distentis et
intestinis quoque tenuibus turgentibus. Cum in^{p. 181.}
hoc cor vtrumque vacuum repertum fuerit, Noster
arbitratur, hepar et intestinum colon versus dia-
phragma vrgeri et ita vitales actiones laedere et
sufflaminare posse; cor enim cum pericardio ita
complanari et basi sua flecti putat, vt sanguis omnis
in sinubus colligeretur, hincque vacuus reperiretur
vterque cordis thalamus, qua in re dubitationem
obortam aliorum iudicio relinquimus.

Coquo, morbo ileo ex colica pictonum laboranti,^{p. 186.}
quarto die vncias tres mercurii cum oleo amygdala-
rum, sequenti die duas et sexto iterum duas propi-
nauit. Obseruauit id, quod HOFFMANNUS in
matrona obseruauerat, magnam scilicet tranquillita-
tem post eius vsum. Alius tamen non nisi conti-
nuatis enematis soluta est, septimo enim die et
post iniectum clyisma sextum cum fecibus copiosis
aliqua pars mercurii prodiit, a septimo et octauo
tamen nihil mercurii, die octauo vero et post ap-
plicatum clyisma nonum iterum mercurius pro-
diit, nona die alius sponte secessit et corrosi et ni-
gricantis mercurii indicia habuit. Notat in hoc gra-
uissimo morbo nullam paralyfin relictam esse, contra
eos potissimum, qui in hoc morbo opium damnant,
eiusque vsui paralyfin adscribunt. De dosibus mer-
curii postea agit et metum quod, monente HOFF-
MANNO, morbos neruorum excitat, haud inanem
pronuntiat, aliaque lectu digna de mercurio aliisque
remediis, huc pertinentibus, disputat. Laudes olei^{p. 204.}
lini et Ipse cum Cl. GALLESKY *) extollit et, cum
nauseosum sit, in clysmatibus magis exhibet. Ma-

*) Vid. Comment. nostr. Vol. XV. p. 625.

chinae Italicae *) in hominibus applicationem non probat, nisi pluribus tentaminibus confirmetur.

- p. 206. Caput quartum *de vario hydrope* agit et Cl. Auctor morbum hunc in variis exemplis ex causis et mutationibus subsequenter diiudicat, paracentesi saepe administratam et liquoriseducti indolem describit et examinat. Nos, qui ordinem huius tractationis pressè sequi non possumus, sparsas quasdam annotationes selegimus.
- p. 209. Feminae viginti quinque annorum asciticae sexaginta octo librae aquae paracentesieductae sunt, quae non foetebat, sed subrubella erat et sanguinem grumosum, in fundo vasis subsidentem, ostendebat; etsi vero et copia aquarum et sanguis admixtus infausam prognosin redderent, praeter spem tamen cortice Peruviano, copiose dato, sanata est.
- p. 212. In aegro iacente saepe moles aquarum non satis ad locum puncturae vrget, nonne tunc erecto potius corpore instituenda est?
- p. 214. Liquor, paracentesieductus, post quindecim dies nondum putruit, sed in cochleari igne admoto, in coagulum, albumini ouorum simile, mutatus est, quem syrupus violarum ex flavo colore in viridem mutavit, an ex eo, quod omnes animales humores latens alcali habent, sed idem syrupus non omnes liquores, paracentesieductos, virides reddit et hic color paulo post evanescit.
- p. 219. In femina viginti octo annorum, liquoris librae quinquaginta quatuoreductae, metuere faciebant gangraenam, quam Noster largiori usu corticis Peruviani repressit. Liquoreductus, non obstante calore atmosphaerae, die tamen tertio demum foetere incepit et arenulas, ad latera vasis affixas, exhibuit
mani-

*) Vid. Comment. nostr. Vol. XIII. p. 444. et Vol. XIV. p. 673.

manifesto indicio, et in aliis corporis humoribus, nec solum in vrina, calculos nasci posse. Liquor, autem, die quarto in cochleari igni admotus, coagulatus est. In hac femina cum ascite tumor cysticus in abdomine simul fluctuabat, in sinistro vmbilici latere potissimum perceptus, cum autem vires aegrae postea instauratae essent, vrina, variis remediis mota, largius effluxit et discussionem tumoris promittere visus est.

In alia femina triginta trium annorum paracen-
p. 236.
tesis instituta sine fructu fuit, aquae enim denuo collectae, non tantum diaphragmate praeter modum extenso et sursum presso, cor vsque ad iugulum elevarunt, sed iecur, ventriculum et lienem versus dorsum depresserunt, quae singularis mutatio situs partium Tab. II. fig. 4. delineatur et, nostro iudicio, accuratiorem iconem desiderasset.

Commemorantur Auctores, qui in cura hydro-
p. 249.
pis clysmata ex vrina variorum animalium commendarunt, qua de causa Noster quoque tentamen aliquoties cum vrina vaccarum instituere iussit, sed sine omni fructu.

Ex accurata recensione mutationum, in sectione
p. 252.
feminae hydropicae obseruatarum, phaenomena morbi antecedentis declarantur; omissis vero reliquis, in genesi membranarum, quas pseudomenyn-gas Noster appellat, haereamus. Liquor, ex abdomine post mortem eductus, ex albo fuscescebat, qui plures similes membranulas continebat, vltima etiam portio crassamentum gelatinosum referebat. In primis vero pseudomenynx non flaua, sed rubra potius, intestina tenuia tegens et super colon ad hepar vsque se extendens, inuenta est, quae processu vno ad centrum mesenterii, alio ad lienem producebatur. Cum itaque non solum hepar cum diaphragmate, ventriculo et colo, sed pulmones quoque cum pleu-

p. 264. ra, diaphragmate et pericardio coaluissent, in generis membranularum inquit Noster, eamque a transpresso ex visceribus et membranis sero sanguinis declarat, quod gelatinosae indolis crustae inflammatoriae simile, iudicatur, et in liquore, ventrem distendente, generatur, versus viscera subsidet, iisque adhaeret et ita partim concretiones viscerum efficit, partim in peculiare et distinctas membranas cogitur. Etsi vero cum hac genesi nulla vehementis inflammationis signa percipiebantur, in viscerum tamen obstructionibus atque compressionibus, sanguinem liberis in vasis comprimi, densari et ad inflammationem disponi posse, arbitratur. Similem inflammationem ostendit sanguis interdum ex venis hydropicorum missus; et in femina, quae his considerationibus occasionem dedit, nona et octava ante mortem hebdomade, in febris continuæ accessu modicae sanguinis missiones ob anxietatem intolerabilem institutae sunt, sanguisque compactus et crassus inventus est et duram admodum et flavam crustam exhibuit, sputa quoque postea euenerunt purulenta, diathesin sanguinis inflammatoriam indicantia.

p. 274. Puella sedecim annorum, hydrope cystica laborans, in aquis iterata paracentesi eductis, a dextro latere semper limpidum, a sinistro turbidum humorem exhibuit. Hac occasione non sine ratione monet Noster, in hydrope simili diureticis resolventibus et attenuantibus abutendum non esse, quippe quae in humores sanos agunt et collectionem aquarum augent, nec eam impediunt, nec ad veras vias deriuant. Etsi enim cystides hydropicae legibus circulationis vix ultra subiectae esse videntur, aliqua tamen signa in vrina probant, ichorosam mate-

p. 277. riam ex iis in sanguinem resorberi. Tentamen institutum est, an cannula relicta et aqua hordei injecta depurari et ad contractionem disponi possint cystides,

stides, sed non successit, febre enim mota, cannula educenda erat. Post obitum aegrae, Noster ob negligentiam ministrorum, qui liquores residuos ex sacco hydropico sine attentione emisserant, in disquisitione, quam instituere decreuerat, impeditus est, nec definire potuit, num in variis paracentesibus institutis limpidae aquae ex abdomine, turbidae ex cystide promanauerint.

Missis aliis in sectione cadaueris obseruatis, tantum notamus, ouarium sinistrum naturali duplo maius, cartilagineum, scabrum et hydatidibus refertum, exstitisse, loco dextri vero, quod cum tuba prorsus disparuerat, a fundo vteri latam membranam processisse, cui ouarium in magnum et irregularem saccum extensum adhaesit. Inaequalis et tuberosus hic erat, totumque abdomen replebat, parietum crassities diuersa erat, nonnullis in locis cartilaginea, in aliis scirrhusa durities accedebat. Etsi vero tria tubera inaequalis magnitudinis referebat, haec tamen intus in varia loculamenta diuisa erant, in quibus vel aqua, vel pus, vel mucus continebatur. In omni ambitu distribuebantur vasa, quae in extensione sacci subinde, facta, quoque distenta erant.

Nunc ad varias hydropis species declarandas se conuertit Cl. Auctor, scilicet hydropem, anasarcam, ascitem peritonealem, cysticum siue saccatum et tympaniticum, et, prima specie obiter tantum indicata, de reliquis signa horumque fallacias commemorat et doctrinam variis Auctorum testimoniis illustrat, quam tamen lectu dignam tractationem in compendio tradere haud possumus, inprimis cum Cl. Auctor, exceptionibus additis, satis declaret, medicos in diagnosi horum morborum eruenda summa cum attentione versari, eamque, repetito examine, confirmare debere.

p. 323. Similis tractatio de medendi methodo addita est, in qua, ratione curae internae, ad institutionem Ill. BOERHAAVII, commentatione Swieteniana explicatam, prouocat, iniectiones adstringentes post paracentesin non probat. Peritonaealem asciten, aquis emissis, coalitum peritonaei cum musculis concessisse, creditur quidem, sed curationes commemoratae id non semper confirmant, multa potius alia mala vlcerosa praeter recidiuam timenda esse, monet Noster. De hydropis cystici curatione per incisionem, iniectionem, depurationem et blandam inde sacci contractionem efficiendam, porro dubitat Noster *).

p. 339. Caput quartum *anatomica quaedam et expositionem tabularum* proponit. Declarantur breuiter, quae in quatuor tabulis expressae sunt icones, quibus potissimum ea, quae situm peruersum viscerum infimi ventris et varias intestinorum imprimis coli mutationes concernunt, adumbrantur. Nos quaedam ex his suo loco commemorauimus, omnes vero icones figillatim diiudicare, instituti ratio vetat, monemus tamen ad has et similes praeternaturales abdominis dispositiones, in examine morborum accurate attendendum esse, quo fallaciae diagnoseos omni modo euitentur.

P. XII. In duodecima parte quatuor priora capita pulsus doctrinam illustrant, reliqua annotationes ad varias

p. I. res, iam pertractatas, addunt. Caput itaque primum *doctrinam HIPPOCRATIS de pulsibus* colligit. Etsi enim signa ex respiratione, vrina cet. ei frequentiora fuerunt, tamen non sexies certe, vt alii perhibent, sed frequentius longe pulsus rationem in morbis indicasse HIPPOCRATEM, Noster affirmat et, collectis variis testimoniis, probat. Ex his
enim

*) Vid. Comment. nostr. Vol. IX. p. 661. Vol. XII. p. 129.

enim euincere suscipit, laudatum Virum considerationem pulsus ad diagnosin et prognosin morborum non solum, sed etiam ad alias doctrinas medicas illustrandas applicasse, fatetur tamen, eas minus completas esse, nec ad singulas morborum observationes satis accommodatas.

Caput secundum *pulsus historiam* ab HIPPO-P. 15.
CRATE ad nostra usque tempora recenset. Contendit primo, ARAETAEUM iam ante tempora GALENI pulsuum doctrinam accuratius proposuisse. Et si vero GALENUS de pulsibus plures libros edidit, rationem tamen pulsus oratorio magis ornate describit, nec recte definit, in refellendis aliorum medicorum super hac re sententiis nimis copiosus est et subtili distinctione, ad artem clinicam nec applicanda, nec assequenda, magis confundit, quam docet. Qui vero hunc sequuti sunt medici, doctrinae eius tantum adhaeserunt.

Nunc distinctiones pulsuum, a pluribus retro seculis in scholis medicorum declaratas, recenset et ex his compositas commemorat, testimoniaque affert, pulsuum cum raritate celerem, hoc est, frequentem, a celeri vere distinguendum esse. Simili quoque ratione pulsuum, in utroque brachio variantem, concedit, nec tantum ex situ et progressu arteriae diuerso, sed ex conditione quoque morbi. Intermittentem pulsuum in senibus minus periculosum esse, omnes largiuntur, non aequè in iunioribus, contrarium tamen ostendit Noster ex observationibus, quibus declaratur, saburram primarum viarum et vermes obstimulum nervis inimicum intermittentis pulsus causam esse, qua remota, regularis redditur. His quaedam subiungit de intermittente pulsu ex vitiis viscerum in primis vitalium et quibusdam naturalem esse docet.

Et si

P. 42. Etsi vero pulsus defectus seu plenaria asphyxia rarius observatur et saepe ex verae disquisitionis neglectu spuria est, quaedam tamen exempla affert, quae, eam interdum ab accuratis viris observatam esse, declarant.

P. 50. Traditur porro historia morbi iuuenis viginti quatuor annorum, febre acuta inflammatoria laborantis, in quo, hac de causa, pulsus longe celerior esse debuisset, dimidia tamen parte rarior, modice febrili, inuentus est. Venaesectionem quidem, hoc pulsu monitus, intermisit Noster, aegram vero methodo antiphlogistica usque ad decimum quartum diem sanavit. Quae observatio etsi incompleta est, quod nec ante morbum, nec post eum curatum ratio pulsus disquiri potuit, occasionem tamen dedit Cl. Auctori, de differentia pulsus in sedente et cubante varia inspergere lectu dignissima. Subiunxit etiam variorum medicorum de singulari pulsus varietate observationes.

P. 74. De pulsu celeri etiam agit recensetque morbi progressum in virgine viginti quatuor annorum, quae ob morbum, peripneumoniam minitantem, in nosodochium excepta est. In hac pulsum, summe variantem, inprimis vero celeritatem, saepe ultra modum auctam, usque ad diem centesimum et quinquagesimum sextum attente observavit, et cum interea partes taeniae secesserint, cum corticis Peruviani usus et venaesectio quandam mutationem induxerint, observatio lectu digna est, etsi verae huius celeritatis causae non inuentae sunt.

P. 88. Caput tertium *recentiorum scriptorum circa pulsum observationes* tradit. Recenset primo Cl. SOLANO observationes de pulsibus, varias morborum euacuationes criticas indicantibus, easque ab aliis vel confirmatas vel correctas declarat, concludendo, forte haec

haec potius, interdum non ex vera naturae lege contigisse. Etsi enim ea, quae in Hispania a SOLANO animaduertuntur, non audacter negat, tamen monet, se per attentam obseruationem nec in Belgio, nec in Austria similes euentus in morbis obseruasse.

Simili ratione et accuratius etiam Cl. BORDEU p. 100. obseruationes examinat et de iis succincte et candide refert, illas tamen, vt alii naturae constitutioni in indicandis motibus criticis non consentaneas. inuenit. Proponit ideo laboriosi examinis quaedam specimina, ex quibus nonnulla sparsim selecta indicabimus.

Alibi iam in febre acuta inflammatoria pulsum p. 117. tardissimum, vt rariorem, annotauerat, in aegro enim quarto tantum die rhythmico et tempore inaequalis, reliquis vero diebus vere aequalis fuit pulsus et quarto die iam larga transpiratione et vrina morbus iudicatus est. Defuit ergo in hoc aegro gradatim decrescens inaequalitas, quae ex doctrina illa vrinarum criticarum pronuntianda erat.

In virgine, cuius pulsum iusto celeriores per p. 119. centum et quinquaginta sex dies examinauerat, in cruditate pulsus irritationis Cl. BORDEU non contractus, plenus et subdurus fuit, sed plenus, fortis, celer et aequalis. Die quinto huius morbi in paucis sputis coctionis nixus erat, et vrinae sedimentum formarunt; ex excretorum itaque conditione pulsus vrinarii et pectoralis commistio expectanda fuisset, pulsus scilicet per gradus descendens, cum pulsus intestinalis inaequalitate, isque reduplicatus, at vero, praeter modicam celeritatem, pulsus tota die naturalis fuit. Pauca haec diiudicati pulsus specimina ideo tantum commemorauimus, quo appareat, quantum et in reliquis examinandis adhibuerit industriam Cl. Auctor, cuius rei quaedam consecutaria addimus.

Monet

- p. 147. Monet primo, non paucos morbos acutos existere, quibus praeter celeritatis et duritiei variationem, notabilis pulsuum mutatio, nec in cruditate, nec in coctione accidat. Concedit, in acutis dari novas pulsuum mutationes, quae tamen definitas a quibusdam medicis prognoses non confirmant, tum enim euacuationes criticae vel nullae sunt, vel aliae, quam indicatae fuerunt. Euenire asserit et alias, quam ab his Viris indicatae sunt, pulsus mutationes, quae tamen nec in diagnosi, nec prognosi ad certam normam reduci possunt, ideoque varias subiungit rariores in morbis pulsus varietates.
- p. 161. Caput quintum de damno, quod a neotericorum de pulsu placitis, medicina patitur, agit. Contendit ergo, veram et tutam praxin Hippocraticam his inventis obscurari, ideoque ea, quae Cl. BORDEU et de crisibus et de pulsibus, contra HIPPOCRATEM aliosque medicos, qui eius vestigiis insistant, monuit, refellere conatur, v. c. in diebus criticis et aliis
- p. 177. ad criseum praedictiones pertinentibus. Inprimis autem lectu digna est defensio Ill. BOERHAVII, quam Noster, eius doctrina enutritus, attente suscipit.
- p. 189. Qua occasione etiam de purgantibus in acutis febribus varia declarantur.
- p. 207. Subnectit huic capiti generalem animaduersionem de methodo medendi nonnullorum medicorum, quos ex Chiraciana schola egressos fuisse, dicit. *Inchoant, inquit, continuantque curam, venesectione perquam numerosa; iterato exhibent vomitoria; quotidie hi, illi die saltem alterno, corpora purgant; sic autem ut apozematibus suis, quo humores efficacius mouere solidaque stimulare potentius possent, aliquid tartari emetici perpetuo iungant, donec demum praetensa sua criticorum pulsuum signa insurgant.* Recte itaque monet, non ordinatis naturae motibus, sed iis perturbatis, sequen-
tis

tis pulsus singulares varietates adscribendas esse, Hippocraticam nempe scholam, quam illi medici reprehendunt, vere ostendere, observationum veritatem nullam esse, si medicus naturam perturbaverit et egregia aliqua Cl. BAGLIVIA verba subiungit *)

Caput quintum *de lumbrico lato* exponit. Mor-p. 210. bi quidam recensentur, in quibus vehementissima quaedam purgantia, clysmatibus emollientibus iunctis, aliaque medicamenta anthelmintica exhibita sunt, quae historiam vermium nonnihil illustrant, ad certas tamen conclusiones non ducunt.

Caput sextum *de variorum medicamentorum virtute* agit. Viperarum curam variis in morbis laudat et exemplis illustrat, iure enim recentium viperarum Italicarum vitiliginem ceu scabiem atrocem pulmonisque ulcera curata, spinam ventosam autem mitigatam esse narrat.

Laudatur in Anglia elixir vitrioli in dyspnoea et p. 239. suppuratoriis pulmonum morbis, illud vero Noster non propinare ausus est, et ob copiam aromatum, quae aestum augent, et ob vim acidi, lac coagulantem. Sed, dubitationibus his per amicorum litteras remotis, hoc medicamento in variis aegris summo cum fructu usus est, exhibuit enim viginti vel plures guttas bis vel ter de die per plures menses et per aliquot annos. Videtur vero in illa phthiseos specie inflammatoria et suppuratoria convenire, in qua materies universi cruoris, in integros pulmones transfudans, colligitur, sputorumque forma eiicitur, quod diathesis hanc sanguinis praecipue euincat.

De

*) Sunt ex praxeos medicae Lib. II. cap. 12, in quo paradoxa recentium medicorum in derisione crifum egregie proponantur.

p. 251. De agarici laricis[†] exiguis frustulis, subinde sumtis, in compescendis sudoribus colliquatiuis, aliisque nonnullis medicamentis pauca refert, vberius disquirenda.

p. 263. Caput septimum *finem quaestionis de sensibilitate et irritabilitate* addit. Contradixerat hac in re Noster obseruationibus Ill. HALLERI ex considerationibus variis corporis aegroti, nunc tandem huius, in viribus corporum internis declarandis, tentamina probat et meritis laudibus extollit. Etsi vero ex ea tantum parte acquiescere videtur Cl. Auctor, quod HALLERUS non inuertere cogitet pathologiam inuentis suis, tamen hic quoque, in eum finem tentamina illa instituit, quo physiologia pathologiam illustret et confirmet.

p. 274. Caput octauum *de inoculatione variolarum* nonnulla proponit. Praemissa breui recensione controuersiarum de variolarum inoculatione, a se excitatarum, decem obseruationes inoculationis, sinistre cedentis, refert et singulis subiungit causam mortis vel laesiones, ex alia re, praeter inoculationem, repetenda, quamobrem ex similibus rationibus patet, neminem ex naturalibus quoque variolis mori. Subiungit varia, quae fallacem inoculationem demonstrare possunt.

p. 294. Tandem cum ex naturalibus variolis multi moriantur et cum hoc ex neglectu debitae curationis pendeat, duplex consilium exhibet; primo, vt medici clinici patrio sermone breuem, sed satis dilucidam normam praescriberent, et non solum semiotices et medendi methodi variolis regulae paterent, sed etiam vana et saepe noxia anicularum consilia infirmarentur, quod etiam certius expectandum esset, si ea norma publica auctoritate confirmaretur: alterum

vt

vt leges condantur, quae variolarum contagium auertant; hae quidem difficultatibus non carent, Nostro tamen et aliis non omnino impossibiles videntur.

XVII.

10. ERN. GUNNERI Theol. et Phil. Doct. Dioecesios Nidrosiensis in Norwegia Episcopi, Flora Noruegica, obseruationibus praefertim oeconomicis panosque Noruegici locupletata. Pars I. Nidrosiae apud Typogr. Vindingium et Hafniae apud Bibliop. Pelt. 1766. fol. Alph. 1. pl. 4. tab. aen. 3.

Quaecunque desiderari possunt ab illo, qui tractus et regionis cuiusdam spontaneas plantas disquirere, et tam in exterorum, quam inquilinorum commoda recensere suscipit, ea omnia non solum egregie impleuit, sed et plura praestitit Cl. Auctor in hac flora, quam ad imitationem aliis merito commendamus. Et cum Danicae et Suecicae plantae variorum, inprimis LINNAEI et OEDERI studio fuerint expositae, Noruegici autem regni diuitiae haecenus fere incognitae mansissent botanicis, eo maiores gratias referre debemus Venerabili Viro, quod defectum hunc supplere et nouis accessionibus rem herbariam augere voluerit. Diu iam in itineribus amplissimis, tum terrestribus, tum marinis, quae ad coetus sanctiores visitandos quotannis instituere debet, naturae dona vbique ac summo studio peruestigauit ipse, aliosque contrerraneos ad similem operam nauandam excitauit, praecipue vero Eundem occupatum haecenus tenuit animale et minerale regnum, prout ex actis Nidrosiensis societatis, cuius fundator quoque fuit, abunde patet, nunc autem

plantas quoque legit, et in patriae maxime commodum eas publice exposuit, quas huc usque vel ipse inuenit, vel ab aliis communicatas accepit. Non omnes itaque, quas haec terra alit, sed modo 314. Prima parte plantas, et quidem nullo seruato ordine, recensuit, reliquas parti posteriori, et si quae post hanc detegerentur, actis Nidrosiensibus reservare voluit Cl. Auctor; cuius instituti rationem Ipse addidit: *non forsan deerunt, scribit, qui optarent, ut editio huius florae differretur, usque quoad tanta plantarum facta fuisset collectio, ut ordine systematico possit prodire. Sed vero, si editio eius tam diu differretur, valde metuerem, ne fieri possit, ut vix, me vivo, in lucem emitteretur. Quo circa consultius duxi, plantas Norwegicas sensim, prout mihi innotuerint, nulla ordinis habita ratione, palam facere.* Plantas autem non nisi illas recensuit, quas vel Ipse in itineribus suis et in praedii sui, Berg ad Nidrosiam dicti, vicinia legit, vel ab aliis lectas vidit, enodauit, aut saltem nouo examini subiecit. Vbique Linnaeana nomina adhibuit, synonyma pauca, ast selecta, adiecit, et eos inprimis citauit Auctores, qui delineationes dederunt, vicinarumque regionum, Daniae et Sueciae stirpes exposuerunt. Plurimae enim sunt tribus his regnis communes, aliquae tamen etiam propriae, quales sunt plures fuci, primula integrifolia, filene armeria et aliae. Addidit vbique vernacula propria, Danica, quandoque et Lapponica, ast et Germanica, Gallica, Anglica nomina, ex Auctoribus, saepe etiam citatis, collecta; loca porrò natalia copiose memorauit, et in quonam vel Ipse, vel alii plantam inuenerint, sollicitè notauit, florendique tempus adposuit. Observationes denique vberimas proposuit, quae vel ad plantarum cognitionem faciunt, vel praecipue usum medicum ac oeconomicum concernunt. Vfus iam cognitos ex aliis qui-

quidem repetit, plurimi autem noui sunt, incolarum, propriisque Cl. Auctoris experimentis innixi, vti et ea, quae ad Pan Norwegicum pertinent, diligentissime exposuit, et fere semper notauit, an ab animalibus, et quibusnam deuoretur, aut auerfetur planta.

His praemissis, ad specialiora progrediamur, et ex fertilissima flora aliquos decerpamus flores, quo operis praestantia plenius cognoscatur. *Osinundae*, No. 1. *Struthiopteris* dictae, accuratam dedit et descriptionem et delineationem. Radix constat laminis nigrofuscis, carnosis, solidis, conuexis, infima parte fibrosis, frondes steriles pinnatae sunt, pinnis mediis longissimis, superioribus et inferioribus breuioribus, scapus cum fructificationibus non ante tempus autumnii apparet, eiusque infimae parti vtrinque saepius adnascuntur minora quaedam folia, iis similia, quae infimae stipitum sterilium parti insident. Fructificationes in racemum disponuntur, cuius singuli rami exhibent quasi spicam disticham, articulatam, articulis primum subfuscis, vel obscure virescentibus contiguous, dein sub forma plerumque subrotunda distinctis et fuscis. Formantur autem hi quasi globuli beneficio foliorum frondis fructiferi angusti inflexorum et conuolutorum, primum ab ipsa fructificatione vix dignoscendorum, postea vero sponte dehiscantium; quum quidem capsulae apparent copiosae flavescentes et globosae, quas microscopium docet esse membranaceas, nitentes, annulo geniculato, lineis transversalibus parallelis interstincto, in circulo maximo cinctas, et capillari pedicello, frondi affixo, innixas; capsulis horizontaliter ruptis, semina minima flaua eiiciuntur. Tab. II sistit *cicutam virosam*, in omni sua vegetatione, flore et ouario per microscopium quoque delineatis. Radix, vt Cl. Auctor

- scribit, bulbus rapiformis est, qui praeter fibrillas longiores numerosas, etiam emittit plures radices fusiformes; inuolucrum vniuersale nullum, parziale polyphyllum, foliolis duodecim constans; huius autem foliola setosa esse, ne microscopii ope videre potuit. Inter *fucos*, quorum plures hic recensuit, icone illustrauit *scoparium* siue *arboreum edulem* c. B. P. eumque dixit: *fucum hyperboreum fronde simplici pinnata, caule longissimo*. Caulem habet durum, subteretem, tres vel quatuor cubitos longum, crassitie baculi, infima sui parte saxo vel lapidi adhaerentem; frons simplex est, terminalis consistentia vesicae bubulae, caule altior, vnum ad duos cubitos lata, palmata. In *draba verna* petala bipartita, folia radicalia margine subciliata, ciliis, vt microscopium docuit, saepe bifurcis, et interdum versus apicem vtrunque vno dente obsoleto notata; in *draba incana* vero petala modo emarginata descripsit. *Polypodium, filix mas*, quo ab omnibus vilioribus commode discerni possit; icone expressam dedit bigam pinnarum, monuitque simul, huius faciem hilarem, et marginem laminarum vnguiformium integerrimum distinctionis praebere adminiculum; alias autem noxiasque inprimis filices, vt est *filix femina*, austeram et suspectam facie externa, earumque laminas dentibus marginalibus, tanquam atro carbone notasse Deum No. 5. optimum. *Anthoxanthum odoratum* facile quidem, dum floret, staminibus et stylis duobus cognoscitur; ast autem stylis et germine vtrunque adstat anthera erecta, oblonga, subfusca, superne integra, inferne bifida, et filamentum maxima parte antherae agglutinatum; mutata vero scena, filamenta tenuissima euoluuntur et e gluma flauescente producuntur longissima, vna cum antheris versatilibus vtrunque bifurcis, vt pollinem in stigma vtriusque styli possint dimittere. Stamina quoque propter longitudinem
ita

ita saepe sibi inuicem implicantur, vt vnum filamen-
tum, duabus antheris instructum, repraesentent.
Ericae vulgaris calix exterior minimus est, interior No. 15.
vero coloratus et persistens corolla maior; in foliis,
potissimum recentibus, ea ad basin sagittata esse, fa-
cile adparet. *Spergula aruensis* omnium frequentif. No. 20.
sine staminum numero ludit, in eadem planta indi-
viduali plurimi flores quinque ad nouem, paucissimi
decem staminibus instructi erant. In *piso aruensi* No. 76.
petioli tetraphylli quidem sunt, ast infimi diphylli,
foliolis oblongis, hinc inde denticulatis; stipulae fo-
liis maiores et inferne extus crenatae; vexillum ma-
gnum coerulescens, venis saturatioribus pictum, alae
obscure purpureae, carina alba, vel leuiter purpu-
rascens, facies est pisi satiui, sed omnia minora. Ca-No. 89.
rex vesicaria tres profert spicas masculinas, quarum
tertia magis distat a secunda breuiore, quam haec a
prima longissima terminali; femineae spicae duae
sunt pedunculatae, flavescentes, capsulis ampulla-
ceis, apice rarissime bifido. *Gentianae amarellae* No. 95.
flores supremi habent corollam quinquesidam, reli-
qui omnes quadrisidam, estque maxime affinis *gen-
tianae campestri*. In *lychnide dioica* flores herma-N. 123.
phroditi semel obseruati. *Tamarix Germanica* perti-N. 152.
net ad monogynias et petala fert purpurascentia.
Cardamine hirsuta flores ostendit paruos, albos, cau-N. 195.
les et folia parum hirsuta, stamina nunc quatuor,
modo aequalia, nunc sex, duobus minoribus; semi-
na matura longius dissiliunt, quam in *impatiente no-
li me tangere* dicta, licet haec non sit *cardamine im-
patiens*. *Thymus serpillum* in omnibus speciminibus N. 233.
flores habuit purpureos, et cilia alba vtrinque ad
basin omnium foliorum.

Verum, missis botanicis obseruationibus, pro-
peramus ad eas, quae vsum variarum concernunt,
K k 3 et

- et ex vberissima harum messe quasdam etiam produ-
 camus. *No. 1. Osmundae struthiopteris* radix tam cruda, quam
 cocta pabulum caprarum, ouium, boumque fit soli-
 dum et sanum; modo non nimia detur quantitate,
No. 4. decocto etiam radicis vituli bene nutriuntur. *Poly-*
podium, filix mas, similem habet radicem, eadem-
 que, foeno deficiente vel corrupto, eundem usum
 praestat, immo priori, vnanimi oeconomorum consen-
 su, praefertur; de hac, et in nostris terris vulgarissi-
 ma, planta scribit Cl. Auctor: *En egregium, in pe-*
nuria foeni, remedium, quo rite adhibito, pecora non
tantum ab interitu praeseruari, sed sane et saginari
possunt. Feroenses radices in cereuisia coquunt
No. 9. contra calculum. *Polygoni viuipari* radices a pau-
 peribus, inprimis Tungenfis in cibum et panem di-
 ligenter colliguntur, et semina cum lacte coquuntur.
No. 11. Hippophaë rhamnoides infuso vel decocto ligni, folio-
 rum et florum Bingdalenses aliique, loco decocti
 lignorum officinalium bono successu vtuntur, vires-
 que hydroticas et diureticas exferere traditur. Oues
 et caprae folia auide deuorant, et a spinis probe sibi
No. 13. cauere norunt. *Saxifraga cotyledon* repudiatur fere
 ab omnibus animalibus. Dalenses foliorum decocto
 contra phthisin tam hominum, quam boum, vtun-
No. 15. tur. *Erica vulgaris* in Norlandia, alio pabulo non
 suppetente, ad oues et equos alendos adhibetur, et no-
 vit quosdam Cl. Auctor, qui solius ericae beneficio,
 ante minutim conscissae, et fecibus spiritus fru-
 menti vel alio fluido maceratae, equos suos circa duos
No. 20. menses satis bene pastos, conseruarunt. *Spergula*
aruenfis auide quidem a capris, ouibus et equis, sed
 non item a bobus appetitur, vt sollicite exper-
 tus fuit Auctor, hinc et laudes ratione faginae
 boum eidem tributas, potius *spergulam pentandram*
No. 22. sibi vindicare asserit. *Daphnis Mezere* corticem af-
 fectibus arthriticis externe applicant Dalenses, iidem-
 que ex cortice et baccis vnguentum contra vlcera
 ca-

cacoethica parant. *Rumicis crispae* radicis decocto No. 35.
 non contra scabiem tantum, sed et contra icterum
 vtuntur Tranoenses, radicem etiam recentem con-
 tusam externe contra scabiem vsurpant. *Stachys* No. 70.
sylvatica, licet foetidissima, auidissime deuoratur a
 bobus et vaccis, et in his lac gignit abundantius,
 nec copiosissime comesta lac vlla ratione reddit in-
 gratum. Equi plantam vehementer abominantur.
Pedicularis palustris dysenteriae bouum, et hydropis No. 87.
 ouium causa vulgo dicitur. Ast, capris exceptis,
 intacta relinquitur a pecoribus et iumentis, nisi val-
 de famelica, vel aliunde aduecta, eandem cum
 damno deuorarent; et in praedio Auctoris, eius-
 que vicinia copiose habitat, nec tamen per septem
 annos vlla ouis ibidem morbo periit, vel hydropem
 laborauit. *Angelicae archangelicae* caulis crudus, No. 98.
 ante florescentiam decorticatus, a Lapponibus et
 Noruegis auide editur. Folia, etiam radix, in
 puluerem redacta, et farinae admixta, a Norlandis
 comeduntur. *Sorbi aucupariae* cortex salutare bouum No. 99.
 ouiumque pabulum, et folia quoque tempore au-
 tumni in pabulum hiemale pecudum a bonis oeco-
 nomis diligentissime colliguntur. Equi a nimio eo-
 rum esu pilos amittunt. *Anthericum ossifragum* im- N. 136.
 pune a bobus deuoratur et praesertim tempore ver-
 no ab iisdem valde adpetitur. *Myrica gale* paupe- N. 142.
 ribus in Norlandia inseruit loco lupuli, nec caput
 tentare fertur, si decoctum probe fuerit despuma-
 tum; decocto Norlandi cimices et pediculos pellunt,
 et gemmis floriferis lanam luteo imbuunt colore.
Potentilla Noruegica pabulum praebet omni respe- N. 145.
 ctu praestantissimum, hinc illam, in arenosis prae-
 sertim, ferendam esse suadet Cl. Auctor. *Sedi* N. 149.
acris decoctum, cum lacte paratum, a Nidrosiensibus
 contra scorbutum vsurpatur. *Tamarix Germanica* N. 152.
 in decocto contra scabiem a Dalensibus adhibetur.

- N. 166. *Anemonem nemorosam* dysenteriam bouum producere
 N. 184. Cl. Auctor quoque confirmat. *Eriophoron polystachion* primo vere omnia pecora expetunt, hinc et tunc diligenter a rusticis colligitur, pappo autem existente, ab omnibus relinquitur intactum. In Dalia sponsa ex pappo, lana ouilla admixta, sponso conficit chirothecas, et puluinaria infantum rusticorum
 N. 179. ex hoc, lana leporina addita, parari solent. *Convallariae maialis* foliis et radice pulchro flauo colore
 N. 191. vestes tingunt Nummedali. *Alfine media*, recens contusa, a rusticis imponitur furunculis, et pone aures applicatur ad inflammationes oculorum exstinguendas.
 N. 207. das. *Lichenem parietinum* cum lacte coquunt Bedstadienses, et contra icterum hauriunt, illudque summe laudant remedium. Ope huius lichenis vestes
 N. 215. quoque luteo imbuunt colore. *Spiraeam ulmariam* adolescentes rustici in vestibus gerunt, vt grato odore sese commendent; ab aliis cereuisiae induntur folia, cui et odorem et saporem gratum conciliant.
 N. 306. Boues eandem auide deuorant. *Thlaspi aruensis* semina sanguini coagulato resoluendo et rheumatismis sanandis inferuiunt. Sed haec sufficiant; quilibet vel ex his facile perspiciet praestantiam huius florum.

XVIII.

BERNHARD IOSEPH SCHLEISS *der Weltweisheit und Arzeneygelahrheit Doctors, Churpfälzischen Raths, gewesenen Feldmedici und würcklichen ersten Physici der Stadt und Herzogthums Sulzbach, Abhandlung von Podagra. Nürnberg bey George Peter Monath. 1767. 8. 2 Alph. 3 Bog. nebst Vorrede.*

i. e.

Tractatus de podagra. Auctore BERNHARDO IOSEPHO SCHLEISS.

Dispescitur hic liber a Cl. SCHLEISS, qui, vti ex praefatione primae partis apparet, ipse huius morbi experitur crudelitates, in tres sectiones, quarum prima pars, aegris podagricis scripta, veram et regularem, alteram anomalam et symptomaticam, et tertia retrogressam complectitur podagram. Prima pars continet, praemissa historica podagrae descriptione, eius causas, remedia et dietam podagricorum ac finitur medicis quibusdam conclusionibus, huc spectantibus. In altera parte varii morbi, qui podagram excitant, eamque partim comitantur, partim sequuntur, vt chlorosis, cessatio menstruorum, hydrops, malum hypochondriacum, scorbutus, lues venerea, asthma, febres, colica, exanthemata spectantur. Tertia tandem agit de conuersione podagrae in varias corporis partes, ventriculi labem, colicam, diarrhoeam, dysenteriam, intestinorum vlcera, calculum renalem, asthma, catarrhum, tussim, phthisin, tabem, anginam inflammatoriam, apoplexiam, paraly sin, oculorum et aurium, nec non dentium dolores, efficientis. Quae omnia partim ex suis, partim ex SYDENHAMI, LISTERI, ETT-

MULLERI, SENNERTI, BOERHAAVE, HOFFMANNI aliorumque observationibus Noster illustrat; plurima vero ex KRÜGERO et MUSGRAVIO desumpta sunt. Quoniam vero haec vel ex aliis sunt deprompta, vel nullam produnt nouitatem, eo breviores erimus, et more nostro de singulis tantum videbimus.

P. I. Regularis podagra, exeunte ianuario vel incipiente februario, potissimum aegros vexat, irregularis autem, tribus calidissimis aestatis mensibus exceptis, per totum annum apparet. Podagrae omnino causis nominatis, proximam eius causam ponit Noster in inflammationem neruosam, quae proficiscitur a nimia fluidi neruei acrimonia, spissitudine et stagnatione, neruos ob nimiam expansionem et irritationem, angustiam, rigiditatem et fere dilacerationem male afficiente. Quapropter inter causas podagrae Noster et refert nimium litterarum studium, feminisque profluvium, profundas meditationes, ac quicquid neruos debilitare et fluidum nerueum partim imminuere, partim acre reddere potest. Quae hac in re explicanda obscura fluidi neruei cognitio vetat, ea ex dolore, quem sentiunt podagrici et aliis symptomatibus, nec non ex causis, ut nimio veneris exercitio vinique abusu, ac ex temperamentorum diversitate, quae cernitur in aucta vel imminuta nervorum tensione, illustrare Noster annititur.

p. 126. Inter remedia, podagrae opponenda, aduersus quam nullum facile specificum, secundum Nostri opinionem, poterit reperiri, antequam fluidi neruei natura est detecta, consideratur camphora, ac quaeritur: numne eius neruina vis ad huic morbo medendum aliquid conferre possit? Atque hoc Nostro ideo in mentem venit, cum viderit, camphoram, externe applicatam podagricis aegris, facile ad interna viscera

ra pellere podagram. Narrat enim exemplum, vbi camphorae externus vsus podagram in ventriculum coniecerat, et cum medicus, retropulsionem podagricae materiei intelligens, camphoram ventriculo applicuerit, podagra pedes iterum occupabat. Porro vires electricae ac magneticae contra hunc morbum dignae censentur, quae disquirantur.

Podagram anomalam dicit Noster eum mor-P. II. bum, qui magnam quidem habet cum podagra con-p. 162. venientiam, attamen secundum originem ac sedem differt e. g. rheumatismum. Symptomata vero ita definitur, vt ex alio morbo, qui partim adhuc adest, partim antea adfuerat, oriatur, v. c. podagra ex chlorosi, cessatione menstruorum, hydrope, mittimus alios. Scorbutica podagra dum a Nostro persequitur, in scorbutum inquirit variaque de putredine secundum Cl. PRINGLE addit insimulque miratur, scorbutum, morbum inprimis castrensem, germanice *Schaarbock* appellari, cum tamen abdomen primum ab eo occupatur, ideoque suadet, scorbutum potius germanice *Schaarbauch* esse nuncupandum. Si asthma symptoma est symptomatis dissuadet venaesectionem. Quod si vero a conuersione podagricae materiae ad pectus ipsum proficiscitur, ad venaesectionem properandum esse monet. Febres sequi saepenumero podagram, probat Noster exemplo, vbi vir quinquagenarius, febre intermittente et per nonnullos annos reuertente, laborans, podagra, qua antea nec ille, nec eius cognati affecti fuerunt, ab ista febre est liberatus, ac monet, in eiusmodi pertinacioribus febribus intermittentibus saepe attendendum esse arthritidem, siue per haereditatem, siue per inordinatam vitae rationem ortam, et, si inde proficiscuntur, potius ad arthritidem, quam ad febrem in medela esse respiciendum. Dolores in
inte-

intestinis in vniuersum colicam, appellat Noster, nec raro eam a podagra oriri, ideoque sedulo in medela ad eam spectandum esse monet. Qua occasione commemoratur exemplum pueri mortui, cuius aluus per quinque annos non fuit aperta, caeterum nulla, debilitate ac infirmitate corporis excepta, sensit incommoda. Dolemus vero, Nostrum non plura dixisse de hoc satis singulari aegri statu, sectionisque relationem addere forte non potuisse.

P. III. Tertia pars metastasin podagricam complectitur,
P. 33². ac primum quidem methodum, podagram in internas partes conuersam, ad externas partes reuocandi, praecipue a MUSGRAVIO traditam, Noster repetit. Tum singulae corporis partes, quas occupauit podagra spectantur. Atque in angina inflammatoria, quae partim cum, partim sine tumore et asthma apparebat, a retrogressa podagra nata, applicationem cucurbitularum, vti HAENIUS iam laudauit, et per quos vlcuscula externa excitauit ac subitaneum expertus est auxilium, imo, si opus est, tracheotomiam suavit. In dysenteria et vlceribus intestinorum externum vsum laudani liquidi SYDENHAMI, temporibus, naso et linguae illiti, ad excretionem hanc moderandam, nec nimis promovendam, nec imprudenter sedandam commendat.

XIX.

Gli Atti dell' Accademia delle scienze di Siena detta de Fisiocritici Tom. II. in Siena appresso il Bonetti nella stamperia del Pubblico l'anno 1763. 4to mai. Alph. 1. pl. 16. tab. aen. 9.

h. e.

Acta Academiae scientiarum Senensis Physico-criticorum Tom. II. ad annum 1763.

De instituta academia Senensi alia data occasione diximus cum Tomum primum in quo potissimum de infectione variolarum observationes tradebantur, indicaremus *). Nunc vero ad recensio- nem secundi tomi progredimur, in quo sequentia inuenimus.

I. *Tentamen observationum super res quasdam natura- p. 1.*
les in Prata et aliis locis, maritimis, della marem-
ma ditionis Senensis Auctore IOSEPHO BALDAS-
SARRI M. D. et Prof. Publ. Historiae naturalis. Iter
in has partes suscepit anno 1762 et primo cuprum,
sulphure et ferro mineralisatum, describit, quod in
cuniculis ad riuum Merfa vicinis effoditur. Matri-
cem inuenit et quarzum et terram argillaceam indura-
tam, et vitriola, quae ibi generantur, partim ex fer-
ro, partim ex cupro, vel ex his deum mixtis oriun-
tur. His et aliis fossilibus, ibi inuentis, fusius descri-
ptis, nonnulla corollaria subiungit, v. c. aquam non p. 10.
solum in animalibus et vegetabilibus, sed et in mi-
neralibus partes, his formandis idoneas, cogere, quod
non solum in stalactite, sed et in aliis concretioni-
bus regni lapidei probat. Metallicae cupri et pyri-
tis

*) Vid. Comment. nostr. Vol. XII. Part. I. p. 145.

tis partes in molli et tenera argilla ita condensantur, vt, accedente succo lapidifico quarzi, indurari possint. Arbitratur enim, quarzum et crystallum montanam habere basin argillaceam, cui se iungit acidum minerale et terra quaedam singularis: inuenit enim particulas teneras quarzi, in terra argillacea natas, et crystallum montanam in simili terra argillacea. His subiungit varia de vitriolo albo et zinci ortu.

p. 17. Progreditur ad furnos describendos, in quibus variae minerae, imprimis cupri, coquuntur: de horum autem fabrica pauca refert, sed potius de regeneratione vitrioli in his furnis varia immiscet. Paulo post terram viridem et coeruleam describit, quae ex stillicidiis aquarum nascuntur, et cuprum solutum vel corrosum praecipitatum viride et coeruleum, ceu veras cupri ochras exhibet, et sententias variorum Auctorum super hac re enarrat.

p. 31. Varia nunc de lacubus proponit, in quibus aquae sulphureae ebulliunt, hae acidae indolis interdum clarae, interdum turbidae sunt. Notatu vero dignum est, quod in his lacubus et calidae et frigidae aquae simili ratione ebulliant, cum magno strepitu in vtrisque percepto, ex prioribus copiosi fumi albi, calidi et humidi surgunt, et aquae in easdem aperturas recedunt, ex quibus prodierunt. Etsi vero fermentationes frigidae et calidae a chemicis indicantur, tamen cum in vtrisque aquis simile acidum inueniatur ideoque ex particularum componentium indole haec res explicari nequeat, veram huius phaenomeni rationem Noster definire non audet. Subiungit

p. 41. porro alias minerarum, ibi inuentarum, descriptiones et sub finem aliquas plantas, ibi crescentes, describit, ex quibus cardamine maior hellebori nigri folio, flore purpureo, radice nodosa, noua videtur, at tamen non satis descripta.

2. *Analysis physico chemica aquae mineralis, quae p. 44.*
ex monte Senae vicino erumpit et aqua Borra
appellatur. Auctore E O D E M. . Hae aquae,
 quarum etiam BACCIIUS et alii mentionem fa-
 ciunt *) in curandis morbis grauioribus ante hac
 exhibitae, nunc ferme neglectae, ab incolis vicinis
 tantum in vsum ducuntur. Ex monte propullulan-
 tes, copiosum tartarum deponunt, quo aperturae
 saepe clauduntur, aliis tamen vicinis denuo apertis.
 Vera aqua thermalis est, etsi interdum non adeo ca-
 lida profiliat, clara et transparens est et sulphuris
 odorem spargit, saporem salis marini refert, cui ta-
 men aliquid lixiuiosi subest. Hinc diu detinetur in
 alcali minerali inquirendo et cum vegetabili compa-
 rando. In aquis ipsis triplex sal, nimirum mari-
 num, alcalinum et aliquod amarum singulare com-
 memorat, salis tamen GLAUBERI mentionem quo-
 que facit, simili ratione postea inquit in spiritum
 acidum mineralem volatilem, in ochram ferri, sal se-
 leniticum, omnem tamen disquisitionem harum
 aquarum, vt nobis videtur, non absoluit.

3. *Analysis thermarum St. Cassiani.* Auctore Cl. p. 79.
 OCTAVIO NERUCCI Prof. Publ. Med. Theoret.
 Senensi. Prouocat ad ea, quae HOFFMANNUS
 de aquis medicatis in vniversum et de nunc descri-
 bendis Cl. BASTIANI proposuerunt, quibus figmen-
 ta de ingredientibus variis partibus metallicis refel-
 luntur. Etsi vero ex profundioribus cryptis scatu-
 rigines proueniunt, et perpetuus affluxus obseruatus
 est, tamen superiora terrae strata, imprimis cretacea,
 non tamen semper alba, sed coloribus variis tincta
 commemorat. Ex variis locis propullulant aquae
 quae duodecim balneis coercentur, ex quibus aqua,
 interno

*) Prodiit de iis libellus singularis LEANDRI TER-
 RUCCI Sienae 1647.

interno et externo vsui destinata et per embrochen quoque applicanda, depromitur.

- P. 83. Summam aquae claritatem spiritui acido deberi, contendit Noster, et quanquam insipida videtur, aliquem tamen stimulum, ex hoc spiritu volatili pendentem, linguae imprimi monet, quod etiam de odore non vehementi quidem, sed quodammodo sulphureo, valet. In calida aqua specifica grauitas, hydrometro inuenta, minor est, quam in frigida duobus circiter gradibus. Ex variis itaque tentaminibus institutis concludit, sedimentum, post euaporationem relictum, et terram alcalinam et aliam terram salinam continere, prior vero, cum sale ammoniaco trita, odorem vrinosum non prodit, altera cum sale selenitico conuenit.

- P. 100. 4. *Methodus vtendi aquis St. Cassiani in Senensi ditione.* Auctore IOSEPHO NENCI Med. Prof. Publ. Epistola latina est, quam ad amicum quendam scripserat, cum ad aquas has se conferret. Volatili spiritu praeditas aquas viscera penetrare et humorum concretiones soluere, in vniuersum monet; in imbecillis nec validas euacuationes sanguinis, nec purgantia fortiora ad praeparationem commendat, et porro ostendit ab initio copiam aquae non ingurgitandam esse, parcam enim dosin sufficere, quae si per aluum et renes non protinus transit, per euacuantia non statim promouenda est; continuato enim et subinde aucto aquarum vsu, effectum tandem succedere sperat; validas purgationes interdum iis vtilis esse concedit, qui viscera, lenta bile et viscida pituita obsessa, habent. Optimum non raro esse affirmat, si aquae non subito transeunt, sed quodammodo resistunt, et humores resoluunt, quando vero vel ex parte vel copiose effluunt, tunc aegrum iure vitulino vel recenti lacte vti posse, quo vires instaurantur,

rentur. Externum quoque balnei vsum temperatum esse debere vrget, idque non tantum in successiva immersione corporis in balneum eiusque duratione, sed etiam in embroche.

5. *Observationes super declinatione acus magneti*. p. 107.
 cae. Auctore Cl. IOSEPHO ASCLEPI e S. I. Lector Matheseos in Collegio Romano. Haec tentamina Romae instituta sunt, observationibus in tabulas dispositis, variisque monitis passim subiunctis.

6. *Responsio ad sextam quaestionem, quam Ill. p. 126.*
 NEUTONUS in sua optica proposuit. Auctore Cl. D. CANDIDO PISTOI. Resorptionem lucis a colore nigro et augmentum caloris declarare an-
 nititur.

7. *Porta harmonica.* Auctore Cl. MILLER. p. 132.
 Proponit instrumentum, artificiose constructum, ad sonorum differentias recte definiendas inuentum.

8. *Tentamen physico mechanicum de resistentia mu-* p. 155.
rorum contra terrae concussiones. Auctore ANTONIO LORGNA Prof. Math. in collegio militari Veronenfi.

9. *Historia medica, sistens descriptionem morbi,* p. 176.
morte terminati, cum cadaueris sectione. Auctore FERDINANDO MANOTTI Doct. Med. ANDREAS ARRIGHI socius academiae Senensis anno nonagesimo secundo seculi superioris natus, procerae staturae, corpore tamen gracili et fibra sensili praeditus, literarum studiis maxime delectatus, ac anatomiae professor, et his laboribus et cura aegrorum sollicitè suscepta, corpus infirmum reddidit,

arthriticis praeterea et nephriticis doloribus, nec non cephalalgia, cum sensu frigoris in capite, crebrius affectus, multis vel suo studio inuentis vel aliis specificis, ab impostoribus quoque laudatis, medicamentis sine fructu utebatur. Hic incidit tandem in morbum convulsivum, quo ita conficiebatur, ut masticandi vi simul destitutus, victu tenui tantum conseruandus esset. Vino tamen nimium usus est, quo etsi morbus intendebatur, somnum tamen sibi inde conciliari observavit. Tam tristi morbo per diuturnum tempus tolerato, anno 1760 febriles motus accessere, hisque sopitis, alia incommoda, ex gangraena partiali ad os sacrum, nec emplastris, nec corticis Peruviani usu satis compescenda, quibus tandem mense ianuario sequentis anni confectus, diem obiit supremum.

p. 181. Ex sectione cadaueris, quam Cl. Auctor non solum proponit, sed etiam cum aliis Auctorum observationibus confert et, notis additis, illustrat, sequentia annotemus. In infimo ventre viscera praecipua in vero situ sine labe deprehendebantur, vesicae vero urinae cauum ulceribus obsessum; venter, valde dilatatus, calculos quosdam sat duros continebat, et in vesicula fellea copiosa, sed prorsus nigra bilis inuenta est. In thorace auricula cordis dextra duplo maior, et pulmones posterius accretis ac gangraenosis inueniebantur. In capite dura mater caluae fortiter adhaesit, et in falciformi processu, intra hemisphaeria dimisso, duo ossicula impacta erant, quae Tab. VII. delineantur, maius, pollicis et undecim linearum longitudinem referebat, oblongum in extremis acutum, alterum minus quinque linearum erat. Haec, etsi in substantiam cerebri impressa non erant, doloris tamen capitis, per viginti annos tolerati, causae existimantur.

10. *Mors repentina ex disrupta splenica arteria*, p. 195.
 Observatio Cl. IOSEPHI NENCI. Vir hypochondriacus vita sedentaria cum animi contentione coniuncta infirmitates corporis vniuersi sibi contraxerat. Hic inter alia crebrius sensit dolorem tensivum ad lumbos, qui aliquoties venaesectione sat larga imminutus est. Etsi vero diaetae regimen recte seruabat, nisu tamen in corpore vertendo facto, subito mortuus est. In sectione cadaueris pars aortae ad primam lumborum vertebra, et coeliaca non solum, sed praecipue arteria splenica, aneurysmate ad pugni magnitudinem distenta et tandem rupta, effusa magna sanguinis copia, mortis repentinae causa existit.

11. *Descriptio grauioris capitis laesionis, ad internas partes deductae*, p. 198.
 Auctore Cl. ANGELO MUNCINI Prof. Chirurg. Vir quadraginta circiter annorum vehementi capitis percussione ita laesus est, vt non tantum amplum integumentorum vulnus, sed fractura caluae, a sinistro latere futurae sagittalis retrorsum tendens, fractis particulis depressis, obseruaretur. Etsi vero debita cura per aliquot dies neglecta est, tamen, cum ab initio et ex naribus et ex vulnere magna copia sanguinis efflueret, chirurgus, qui post aliquot dies demum aegro operam tulit, ossium partibus remotis, effluxum ichorosae materiae temperauit, quo facto, et suppuratione bona succedente, vulnus depuratum et cicatrice obductum est.

Addit Cl. IACOBUS BORSELLI Med. Doct. p. 200.
 considerationem de insensibilitate menyngum, quae in hoc aegro et dilaceratae et in tollendis ossibus maxime irritatae fuerunt; qui tamen professus est, se nullum vnquam percepisse dolorem, etsi sentiendi facultas primis post inflictum vulnus horis tantum suppressa, postea semper constans fuerat.

p. 203. 12. *Relatio de impacta pali parte ad infimum ventrem.* Auctore Cl. ANTONIO PHILIPPO LANDI. Palus, oliuae sustinendae alligatus, viro triginta nouem annorum, ex hac arbore cadenti, ita impactus est, vt a genitalibus inter integumenta et musculos infimi ventris ad vmbilicum vsque penetraret, ibique fractus, postea difficulter extrahi posset; hoc autem facto, et inflammatione, nimia sanguinis missione, consopita, blanda suppuratio successit, et cauum, fascia circulari abdomini applicata, compressum coaluit.

p. 207. 13. *Relatio de fractura tibiae et fibulae cum dislocatione malleolorum.* Auctore EODEM. Vir quadraginta sex annorum melancholicus ex aedibus praecipitem se dederat, et praeter alias leuiiores laesiones, sinistri cruris ossa sub genu tam vehementer fregerat, vt malleoli simul dimoti essent; inflammatione per sanguinis missionem et purgantia antiphlogistica sopita, ossa diffracta et diducta ita tamen in verum situm reduci poterant, vt aeger plane restitui posset.

p. 210. 14. *Descriptio delirii, et detecti post mortem tumoris, in cerebro haerentis.* Auctore VINCENTIO GALLI Chirurg. Prof. Senensi. Vir quadraginta annorum habitu corporis sano praeditus, sed vinonimium deditus, a cephalalgia vehemente, venae sectione instituta, liberatus, breui post in eundem incidit morbum, ita vt, febre etiam accedente, vertiginosus, loquendi et deglutiendi facultate destitueretur. Omnia auxilia tum frustra tentata sunt, accessit potius delirium vehemens, et die nono morbi mortuus est. Calua remota, menyngum inflammatio et copia feri in ventriculis haerentis obseruabatur, in dextro praeterea ventriculo tumor a thalamo

mo

mo nervi optici vsque ad corpora striata extensus, cui gallinacei maioris magnitudine inueniebatur, cuius superficies inaequalis, interna substantia vero densa et cinerei coloris erat.

15. *Relatio chirurgica de hernia intestinali completa incarcerata, operatione recte curata.* Auctore EODEM. Vir viginti septem annorum hernia scrotali eaque incarcerata laborans, aluo simul pertinaciter obstructa, non nisi operatione chirurgica sanari poterat, quam Cl. Auctor administrauit. Non solum vero feri copia, tumore inciso, effluxit, sed aliqua etiam pars intestini ilei liuida inuenta est. Intestinum tamen reponere ausus est Noster, annulo non nihil dilatato, futura pellionum vulnus constrinxit et debito apparatu et fascia muniuit. Alui quidem euacuatio non protinus successit, febrisque potius aucta est, post largam tamen sanguinis missionem et epithemata discutientia, abdomini applicata, non tantum aluus soluta, sed etiam vera sanatio die decimo quinto subsequuta est.

16. IANI PLANCI Ariminensis *de duplici tethyi genere et de manu marina ad PIUM IANNELLIUM* Senensem, Academicum Physico criticum. Prima Auctoris Cl. observatio versatur circa *Alcyonium aurantium* PALL. *zoophyt.* p. 357. siue *Alcyonium (lyncurium) globosum, fibrosum, flavum, verrucosum* LINN. *Syst. Nat.* Ed. XII. Describit vero illud Cl. Auctor sub nomine tethyi plerumque sphaerici, malum aurantium Lusitanicum forma et colore referentis, quod horizontaliter dissectum, fibras radiatas osseas ostendit. Non uti DONATUS *)

Ll 3

per-

*) Vid. EIUSD. *saggio della storia naturale marina dell' Adriatico* Venet. 1750. tab. 10. p. 60. Ex eo etiam hanc sententiam adsumsit Ill. LINNAEUS in *Syst. l. c.*

- perhibet, in iuuentute tantum fixum est, et postea libere per mare vagatur, sed semper basi sua scopulis adhaeret; quae enim eiusmodi corpora soluta reperiuntur, semper in basi lacerata deprehenduntur. Ob fibras radiatas osseas hoc alcyonium similitudinem quandam cum belemnitis habet, licet haec petrificato-
rum species magis oblonga sit, vt itaque ex hac obseruatione origo belemnitarum forte quodammodo
p. 219. illustrari possit. Secunda obseruatione *Tethys coriacea* BOHADSCHII *) describitur, seu *Ascidia (papillosa) scabra tuberculis coccineis* LINN. Haec penem virilem cum scroto refert, et vt reliquae ascidiae binas aperturas, quarum altera humilior est, habet. Internae huius animalis partes, inprimis ventriculus, aquam marinam continens, tunica musculosa instru-
p. 222. ctus, describuntur et delineantur. Vltima tandem obseruatione descriptio *palmae* seu *manus marinae* exhibetur, cuius etiam figura satis rudis adiecta est. Est hoc *Alcyonium palmatum* PALLAS l. c. siue *Alcyonia exos* LINN. In eo tubulos perpendiculares rectos aquam marinam continentes Cl. PLANCUS reperit. Animalem naturam huius zoophyti plane negat, et vti MARSILIUS, flores describit sex staminibus rubris constantes. Cl. GINANNI T. I. *Opusc. posth. **)* p. 45. primum huius zoophyti figuram exhibuisse Noster autumat, qualem tamen iam apud MARSILIUM et BARRELIER reperiri, ex Cl. PALLAS libro citato patet.

- p. 225. 17. *Observationes de pluuia in vrbe Sena ab anno 1755 ad annum 1763 delapsa* tradit Cl. IOSEPHUS ASCLEPI

*) Vid. opus EIUSDEM de quibusdam animalibus marinis eorumque proprietatibus. Dresd. 1761. Cap. VII. tab. 10. f. I. p. 129. Comment. nostr. Vol. XI. p. 517.

**) Vid. Comment. nostr. Vol. V. p. 113.

ASCLEPI in tabulis secundum ordinem annorum
et mensium adornatis.

18. *Problema geometricum solutum* a D. CAN-P. 235
DIDO PISTOI.

XX.

Instituts de chymie ou principes élémentaires
de cette science, présentés sous un nouveau
jour. Par Mr. DE MACHY, M. Apothicaire,
Démonstrateur de chymie et Membre de l'Académie
Royale des Sciences de Berlin. A Paris aux depens de
Lottin le Jeune. 1766. Alph. 2. Pl. 14.

h. e.

Institutiones chemiae, seu principia huius artis.
Auctore Cl. DE MACHY. etc.

Ex tribus partibus librum hunc compositum de-
prehendimus: in prima parte chemia physica,
in secunda chemia analytica, inque tertia chemia,
artibus applicata, traditur. In chemia physica che-
miam in genere eiusque obiectum et scriptores, opi-
niones veterum et recentiorum de origine et for-
matione corporum naturalium, porro formationem
corporum, eorumque existentiam et producta, mo-
tum eiusque effectus, fluiditatem, grauitatem et
penetrabilitatem, nec non affinitatem considerat Cl.
Auctor. In chemia analytica primo de operatio-
nibus et instrumentis agit, deinde de vegetabili-
bus eorumque analysi, melle, cera et fuligine,
nec non productis aquosis, salinis, inflammabilibus
et terrestribus, porro de fermentatione et produ-
ctis fermentationis, tum de animalibus, sanguine,

Ll 4

vrina

vrina et putrefactione, nec non productis regni animalis exponit, tandem analyfin mineralium exhibet, atque originem et formationem mineralium, terras et lapides, pyrites et bitumina, acida in genere, vitriola, alumen et sulphur, sal marinum et nitrum eorundemque acida, semimetalla ac metalla, tandemque aquas minerales considerat. In vltima parte, chemia nimirum artibus applicata, varias methodos recenset Noster, quibus variae operationes chemicae, vt fermentatio et destillatio, crySTALLISATIO et praecipitatio, amalgamatio et calcinatio, fusio atque vitrificatio inferuiunt, quibus demum summa totius operis subnexa est.

Theoriam nouam hic proponere sibi persuadet Cl. Auctor, in qua tamen deprehendimus, vtilis in ea res verbis nimis prolixis et rationibus nimis hypotheticis explicatas esse, licet quoque alia, certe non pauca, sint, quae breuissimis indicata, ampliorum longe expositionem desiderare videantur. Audiamus igitur, quae sint fundamenta, quibus noua haec theoria nititur.

P. I. Nullum corpus, vt ostendere annisus est Cl. Auctor, existit absque *praeeexistentia* aliorum corporum, nullumque se euoluit, nisi id, quod euolutioni inferuit, *indifferens et fluidum* sit. Fluidum hoc, dum fit corporum illorum pars constituens, mutationem patitur, quae similis est fermentationi, qua facta, quatuor species partium constituentium producuntur. Itaque tria genera principiorum assumit Cl. Auctor, primo *materiam indifferentem et fluidam*, deinde *corpora iam formata*, quae eam sibi assimilant, tandem *partes horum corporum productas*, fluidas nimirum, sapidas, viscosas solidasue: ex quibus numerum insimul productorum, per analyfin obtinendorum, patere, omniaque producta aquosa, salina, lucida et solida esse, asserit. Materiam hanc indifferentem et

et fluidam in sola aqua se reperisse, eamque ab atomis iam determinatis seu praeexistentibus per motum fermentatitium assimilari sicque corpora produci, Noster autumat. Materia haec indifferens et fluida, secundum Nostri sententiam, corpora aluit, seque per tubos, capillaribus similes insinuat, et evolutioni, incremento, conseruationi et facultati producendorum corporum primorum, quae causam immediatam existentiae corporum naturalium sistunt, occasionem praebet. Motus, quo id fit, *progressius* vocatur. Alius motus dicitur *centripetus*, qui cognoscitur, si materia illa indifferens cum substantiis iam existentibus se coniungit, duasque moleculas distantes adunat. Alius demum motus nuncupatur *centrifugus*, si moleculae vnitae separantur, dum materia illa indifferens se subducit et aufugit. Sed haec sufficiant; notiones fluiditatis, grauitatis, penetrabilitatis et affinitatis, a Nostro explicatas, lubenter praetereamus; alia pauca tamen, hinc inde deprompta, communicemus.

Oleum essentialo, quod nonnullae aquae destil-p. 211.
latae continent, vel suspensum vel solutum iis inhaerere, lacteumque colorem, ab oleo suspensio pendentem, si oleum sensim separetur, cessare, solutum vero oleum vel mediante acido, aquae inhaerente, vel eo ipso, quod ad mixtionem olei pertineat, inesse, Noster putat.

Spicula salina, in alcalibus fixis post deliquescen-p. 226.
tiam deprehendenda, non ab acido aereo, sed ab acido illo, quod partem alcali constituat, et ab inuolucro liberatum, in alcali superstes nunc agat, formari, asserit.

Extracta, quae aquae ope ex vegetabilibus obti-p. 234.
nentur, partes quidem mucilagineas, resinosas, salinas, aliasque non mutatas continere, pro partibus tamen constitutiuis neququam habenda, producta destructorum vegetabilium esse, autumat.

p. 282. Spiritus vini, saepe rectificatus, a Nostro pro optimo non habetur; laudatur vero et optimae indolis esse dicitur, qui calore leni primus prodit, odorem gratum habet, agitatus, nullam spumam excitat, aerique expositus, subito euanescit.

p. 296. Terram foliatam tartari, quae substantiis resinosis aliisque admixta efficit, ut copiosius in spiritu vini solvantur, has ipsas eo disponere, ut postea ex spiritu vini per affusam aquam neutiquam praecipitentur, Noster perhibet.

P. II. Terra quaevis, in globo nostro reperiunda, ortum, ut Noster putat, destructioni vegetabilium et animalium debet, omnisque earum differentia provenire Ei videtur 1) a natura individui, ex quo producantur; 2) a modo, secundum quem formatae sunt; 3) a loco, in quo destructio facta est; 4) a modo, secundum quem terrae, iam existentes, vniuntur; 5) ab influxu aquarum et substantiarum salinarum in has terras. Prima terra, sensibus ubique obuia, ea Nostro est, quae partibus vegetabilium destructorum, per lentam putrefactionem inuersis, plena est, et humus dicitur. Praeter hanc ad tres tantum species attendit, nimirum 1) ad argillam; 2) ad terram vitrescibilem; 3) ad terram calcare-

p. 361. am. Terra argillacea ex humo per aquam saepe
p. 366. abluta et ab acido magis liberata; terra vitrescibilis
p. 368. per combustionem vel putrefactionem vegetabilium
ib. produci, terraque calcarea ab animalibus ortum ducere Nostro videtur.

p. 376. Lapides dissolutioni dictarum terrarum, per acidum vitrioli aut salis communis factae, ortum debere, Cl. Auctor asserit, eorumque sex species enumerat 1) lapides argillaceos, si argilla ab acido vitriolico solvatur; sic schistum formari; 2) si vero ab acido salis solvatur argilla, lapidem suillum oriri, putat; 3) lapides gypseos, talcum et micam produci

duci dicit, si terra calcarea ab acido vitriolico solvatur; 4) spathi vero species, si eadem terra ab acido marino solvatur; 5) lapidem Bononiensem et spatium fusibile formari autumat, si terra vitrescibilis ab acido salis communis solvatur; 6) quartzum vero, crystallum montanam etc: si eadem terra ab acido vitriolico solvatur.

Pyrites in argilla formari, acidumque, iis inhaerens vel vitriolicum vel salis communis acidum esse, iisdemque sulphur nullum inhaerere, sed, si pyrites in vasis clausis ignis ope disquirantur, ob destructionem partium vegetabilium et animalium, pyritis inhaerentium, et ob producendum inde carbonem, cum quo vitriolicum acidum coniungatur, sulphur demum produci, asserit. Pyrites sulphureas vocat, quibus acidum vitrioli inest, arsenicales autem, qui acidum salis habent.

Bitumina ex succis vegetabilium resinosis et acido vitriolico vel acido salis, oriri, ostendere annititur.

Ex bituminibus interdum alcali volatile obtineri, sed non nisi eo in casu, si bitumina terra calcarea abundant, autumat; sal vero acidum, ex iis obtinendum, plerumque indolis salis marini esse, raroque acidum sulphureum obtineri, perhibet.

Pyrites ex acido, substantia vegetabili vel animali carbonaria, terris metallicis, diuersimode attenuatis, aliisque terris animalis vel vegetabilis propriae formari Nostro videntur.

Acidum vitrioli glaciale minus concentratum, quam concentratissimum acidum vitrioli, sub fluida forma obtinendum, sed tantum a basi metallica, per ignis violentiam extracta, fixum factum esse, Noster innuit.

Aether et naphtha vitrioli Nostro synonyma sunt, et liquor anodynus Ei dicitur, si oleum vini et aether cum spiritu vini destillato misceantur.

Ab

p. 459. Ab acido vitriolico et acido falis omnia reliqua acida produci: ab acido nimirum vitriolico tartarum eique analogia acida, et ab acido falis acidum nitri et acidum falis microcosmici oriri, putat.

p. 508. Terra, in semimetallis deprehendenda, diuersa quidem Nostro videtur, ita tamen, vt in vnus alteriusque terra semper analogiam cum terra quadam metalli reperiri, putet. Sic zincum cum stanno, niccolum cum cupro, platina cum ferro, cobaltum cum argento, antimonii regulus cum mercurio, quoad terram, analogiam habere dicuntur. Auro tamen nullum semimetallum analogum reperiri, autumat.

XXI.

Procédés chymiques, rangés methodiquement et definis. On y a joint le précis d'une nouvelle table des combinaisons ou rapports: pour seruir de suite aux instituts de chymie. Par Mr. DE MACHY etc. A Paris, chez Lottin, le Jeune. 1769. 8. Pl. 19. c. tab. aenea.

h. e.

Producta chemica, methodice coordinata et descripta, quibus subnexa est summa tabulae nouae combinationum seu affinitatum: institutionibus chemiae inferuentia. Auctore Cl. DE MACHY. etc:

In hoc opusculo non nisi descriptiones productorum naturalium et chemicorum communicat Cl. Auctor, ita, vt, productis regni vegetabilis descriptis, productorum regni animalis, nec non mineralis descriptiones subiungat. His artium nonnullarum,

rum, quibus chemia inferuit, nec non productorum chemicorum, in quavis arte vtilium, descriptiones subnectit; vltimo tabulam affinitatum, nouam, vt putat, et correctam, tradit. Quod ad ipsas descriptiones attinet, complures earum ita comparatasprehendimus, vt veras rerum notiones exhiberent, alias tamen omni dubitatione maiores non esse, aliasque incompletas perspicuitate indigere, arbitramur. Exempli loco nonnullas harum descriptionum subiungamus.

Spiritus rector roris marini Nostro dicitur aqua P. 1. vegetationis, quae partes, maxime attenuatas, huius plantae secum transuexit. *Spiritus roris marini alcali-* P. 3. *linus* est alcali volatile, durante destillatione, productum et a paucop phlegmate solutum; purum non nisi vltimo et maximo ignis gradu ascendit, eoque tempore, dum transgreditur, plurimum aeris se euoluit aut producit. *Aqua vitae* Nostro est produ- p. 20. ctum artificiale fermentationis vineae, quod, dum ebullire incipit, tum demum generatur, et attenuationi maiori partium acidarum, mucosarum et phlegmaticarum, quae fermentationem subierunt, originem debet. *Spiritus vini* Ei dicitur ea aquae vitae p. 21. portio, quae, excitato iterum calore, quam maxime attenuata obtinetur, quaeque phlegma aliasque partes crassiores relinquit. *Spiritus vini rectificatus* no- P. 21. minatur, si spiritus vini denuo cum vel sine additamentis destillatur. *Albumen ouorum* a Nostro voca- P. 33. tur substantia gelatinosa, quae terrae calcareae, in acido, valde diluto, solutae, originem debet. *Bilis di-* P. 41. *citur* sapo naturalis, qui ex substantia oleosa et alcali falis marini oritur. *Ambra grysea* vocatur substan- P. 43. tia animalis, cuius odor suauis est, quam alii pro bitumine, alii pro producto animali habent. *Aqua* P. 47. *calcis viuae* est aqua, quae cum sibilo et calore calcem viuam penetravit, et portionem salinam et al-

p. 96. calinam continet. *Platina* est ferrum arsenicale, quod in regno Peruano purificationi mercurii inferuiit.

Sed haec exempli loco commemorasse sufficiant:

p. 173. pauca caeterum de adiecta tabula affinitatis seu combinationis corporum addamus. Nouam hic theoriam se excogitasse, putat Cl. Auctor, dum nomen affinitatis reiicit, aliudque combinationis nomen adaptat, cum tamen notum sit, omnes, qui affinitatis vocula vtantur, ad coniunctionem respicere, et per affinitatem causam tantum denotare, ob quam duo vel plura corpora coniunctionem ineant. Affinia namque corpora dicimus, quae respectu partium constituentium et mixtionis maiorem minoremue similitudinem inter se inuicem alunt, et ob hanc aptissima puncta contactus sibi inuicem praebent, quo

p. 181. facto nexus plus minus firmus efficitur. Aliam causam combinationis se reperisse, sibi persuadet Cl. Auctor. Ad mobilitatem nimirum corporum respicit, atque ostendit, omnia corpora tam solida, quam fluida mobilia, atque haec quidem actu mota, illa vero ad motum suscipiendum apta esse. Ostendit deinde, nullam combinationem sequi posse, nisi vnum corporum combinandorum fluidum sit. Quod si nunc fluidum soluens corpus soluendum penetret, molecula soluentis aliam moleculam corporis solvendi separat, et ob complura puncta contactus sibi vnit, unitae autem in hoc statu manent, cum nunc inter mobilitatem relatiuam status medius sit, tam diu durans, donec soluens potentius accedat, quod, ob mobilitatem suam integram et potentiam, alterum corporum vnitorum propellit, cumque altero se coniungit. Sed quis vnquam chemicorum, dum corporum coniunctionem declarat, negauerit, motum corporum requiri. An vero ex solo motu corporum causa combinationis et cohaesionis declarari possit,

possit, resque inde clarior fiat, quam si ad similitudinem partium attendamus, aliis diiudicandum relinquimus. De tabula combinationis eiusque expositione nihil addimus, ne de ea eandem sententiam, quam de tabula affinitatis, a Cl. RÜDIGER communicata, tulit Noster, nos quoque ferre videamur.

XXII.

Noua physico medica.

Liceat nobis, antequam quaestionem, a societate Regia scientiarum *Göttingensi* ad annum 1772 propositam, cum Lectoribus nostris communicamus, sodales physicae classis eiusdem, in nupero conuentu publico, die 10 nouembris 1770. habito, electos, nominare. Constabit enim in posterum quinque sociis haec classis, vno nimirum ordinario et quatuor extraordinariis, quorum quatuor in anatomicis, botanicis, chirurgicis et oeconomicis doctrinis perfectuendis versabuntur, et Cl. VOGEL chemicas tractabit. Eorum nomina sunt haec:

Ordinarius

RUDOLPHUS AUGUSTINUS VOGEL Archiat-
ter regius et medicinae professor ordinarius.

Extraordinarii

HENRICUS AUGUSTUS WRISBERG medici-
nae Doctor et professor ordinarius.

IOANNES ANDREAS MURRAY medicinae Do-
ctor et botanices professor regiae academiae scien-
tiarum Suecicae sodalis.

AUGUSTUS GOTTLIEB RICHTER medicinae
Doctor.

IOANNES BECKMANN oeconomiae et historiae
naturalis professor.

Eadem

*Eadem eodem conuentu publico, die 10 novembris 1770 habito, est conqueſta, ſe nullas elaborationes quaestionis 1770. propositae atque ita concinnatae: leges inueſtigare, quas ſequitur maſſae ex argento et cupro commixtae grauitas ſpecifica etc. *) eſſe naſtam, et aliam 1772 quaestionem, ex phyſicis doctrinis depromptam, cum viris eruditis communicauit, ita ſeſe habentem: quatenam eſt vaporum letiferorum in cauernis nonnullis prope acidulas natura? num, ſubducta aeri elatiſtica vi, reſpirationem intercludunt? an illi acidam naturam habent et, veſiculis pulmonalibus contractis, mortem inferunt? an ad cerebrum tendunt et facultates animales ſubito ſupprimunt?*

Praemium eſt moneta aureorum Hollandicorum numorum quinquaginta. Commentarii ante initium octobris 1772 Ill. HEYNE, qui ſocietati iam ab epistolis eſt, ſunt tradendi. Legum porro, quae ab iis, qui commentarios mittant, ſunt obſeruandae, nulla, cum omnibus conſtent, opus eſt mentione.

Repetimus ideo quaestiones, ab academia ſcientiarum, elegantiorum literarum et artium *Lugdunensi* iam propositas et a nobis quoque commemoratas, **) cum legerimus, eas uſque ad ianuarium 1773. ab academia eſſe dilatas. Erant hae: *ex quibus partibus conſtat lymphæ et in quonam viſcere elaboratur? utrum vaſa, lympham in ſe continentia, ultimarum ſint arteriarum continuationes, an ſua habeat hic humor vaſa, a reliquis vaſis corporis humani plane diuerſa, atque quodnam commodum afferat hic humor oeconomiae animali? porro in votis habet academia, vt perſequantur cancri naturam, effectus et optima remedia docti viri.*

Com-

*) Vid. Comment. noſtr. Vol. XV. p. 359.

**) Vid. Comment. noſtr. Vol. XV. p. 171.

Commentarii mittendi sunt ante finem ianuarii 1773. ad Ill. DE LA TOURETTE vel ad Cl. BOLLIVRED MERMET qui academiae ab epistolis sunt, vel ad bibliopolam AIME DE LA ROCHE, ita tamen, ut nulli oriantur eorum causa academiae sumtus. Reliqua, quae huc pertinent, notata sunt a nobis in loco, supra indicato.

Fore nec prorsus alienum a nostro instituto, nec plane ingratum speramus nostris Lectoribus, duas quaestiones, a societate oeconomica, quae *Petropoli* floret, propositas et ad rem rusticam spectantes, hic tradere. Cum enim in omni omnino regni Russici ambitu quotannis secale hyemale et aestivum variae indolis aliter atque aliter feratur, nec adhuc intelligi queat, quatenus utriusque secalis tam ad usum, quam ad bonitatem utilissima et convenientissima sint genera, optat societas, ut, collatis variis inter se secalis speciebus, utriusque ferendae variis methodis, plus minusve molestis, disquisitis et proprietatibus diuersis erutis, viri docti, hac in re versati, solide definiant *illam secalis speciem, insimulque modum tradant, quo haec definita species pro soli cuiuslibet diuersitate augeri possit.*

Ad excitandam huius rei cognitionem, quae experientia nititur et studium pollicetur societas ei, qui optimum hac de re scriptum communicabit cum ea, finito septembri 1771, commentarium, monetam auream triginta et quinque numorum aureorum Hollandicorum.

Haec erat prima quaestio, altera attinet *varia insectorum genera*, quae agris satis officiant, ac imprimis eorum, quae, antecedente aestate ac autumno, multis in locis Ingriae, ducatus Esthoniae et Lettiae agros magnopere deuastarunt.

Siquidem scire refert, vnde haec insecta oriantur et quaenam optima quaeque sint vel eorum arcendorum vel penitus delendorum remedia. Cuius rei optimae elaborationi definita est a societate moneta aurea eiusdem, vt praecedentis, valoris, et expectatur, finito septembri 1772.

Inter varia problemata, partim ex historia et mathesi, partim ex physicis deprompta doctrinis et a regia scientiarum societate *Hofniensi* die 7. augusti 1770. proposita, denuo id 1771. viris eruditissimis traditum intelleximus, quod iam 1769 ab ea est vulgatum *). Missis itaque iis, quae a nostro instituto aliena videntur, hoc, quod physicam attinet classem, repetemus.

Inuenire optimam antliarum incendiis compescendis aptarum structuram, ita quidem vt cylindri, emboli, communicantes tubi, valuulae, vasa, si quae adfuerint, comprimendo aeri destinata, epistomia, consuti e corio serpentes, iisdemque annexae cochleae et tubi eiectionis etc. non iustum tantum robur, sed et proportionem legibus hydraulicis conuenientissimam sortiantur, vt vectes, suis fulci hypomochliis et sustentaculis ita aptentur ponderibus et potentiis, vt integra machina, aquis hauriendis eiiciendisque inuenta, simplex sit et reparationis minus indiga, vt commode moueri, per angustiores plateas facile transferri et ad incendia quaeuis feliciter reslinguenda cum successu possit adhiberi.

Possunt hanc in rem, exceptis societatis sodalibus, exteri aequae ac indigenae, quibus lingua vel Latina vel Gallica vel Teutonica vel Danica, nulla tamen alia, in conscribendis commentariis vti licet, inquirere. Hos vero circa finem octobris 1771. mitti atque Ill. Viro HELMSTIERNA potentissimo Danorum regi a consiliis sanctioribus, qui socie-

tatis

*) v. Comment. nostr. Vol. XV. p. 549.

tatis mandata curat, impensis solutis, tradi oportet. Praemium monetae aureae centum thalerorum Danicorum, finito ianuario 1772. distribuetur. Reliquae commentariorum mittendorum leges non differunt ab aliarum academiarum legibus.

Londini IOANNES KIRCKPATRICK, cuius analyfin inoculationis variolarum in praecedentibus *) commemorauimus, die 7 maii 1770 desit viuerē.

Ibidem MARCUS AKENSIDE medicinae Doctor, qui inter alia scripta obseruationes de origine et vsu vasorum lymphaticorum in animalibus collegit et philosophicis transactionibus inseruit **) die 23. iunii 1770 vitam cum morte commutauit.

Versaliae PETRUS SENAC Galliarum Regis consiliarius et medicus primus, vir fama atque meritis clarus die 20 decembris 1770. octuagesimo aetatis anno diem supremum obiit, cuius memoriam posteritati commendandi nullam praetermitteremus occasionem.

*) v. Comment. nostr. Vol. IV. p. 125.

**) v. for the Year 1757. Vol. L. p. 322. Comm. nostr. Vol. IX. p. 687.

Continuatio indicis scriptorum physico-medico-
corum, quae anno 1766 prodierunt.

PHIL. GEORG. SCHROEDER progr. inaug.
fistens variolarum, adulto insitarum, historiam
variis obseruationibus illustratam. Gotting. 4.

Eiusd. progr. inaug. fistens variolarum, duobus
adultis insitarum, historias, nonnullis obseruatio-
nibus illustratas. ib. 4.

CHRIST. FRIDR. SCHULZENS *Nachricht von
Böhmischen Bitterwasser und dessen Salze. Dreß-
den. 8.*

Die wohl unterwiesene Hebamme von I. H. SCHÜT-
TE. *Wesel. 8. m. K.*

* * SCHUMACHERS *vermischte Nachrichten und
Anmerckungen zur Erläuterung und Ergänzung
der Sächsischen besonders der Eisenachischen Geschich-
te. 1ste Samml. Eisenach. 4.* (plurima e historia
naturali continet).

IAC. LUD. SCHURER disp. de historia electricita-
tis. Sectio Ima. Resp. Io. Iac. Reutlinger. Argen-
tor. 4.

* * SCHUSTERS *schediasma des wahren minerali-
schen Gehalts und der eigentlichen Beschaffenheit
des Ronneburgischen Gesundbrunnens. Altenb. 4.*

IO. BAPT. MATTH. SCHWARZ diss. inaug. de
tarantismo et chorea viti, quantum scilicet inter
fese hi morbi aut conueniant aut differant. Vi-
enn. 8.

MART. WILH. SCHWENKE *kruydkundige Be-
schryving der in en vytlandsche gewassen, wel-
ke hedendagsch meest in gebruyk zyn. f. l. 8 mai.*

FRANC. NICOL. SEDEX diss. inaug. de sulphu-
re, spiritu eius volatili et acido caustico. Vin-
dob. 8.

De scorbuto liber AUREL. SEVERINI edit. vltima recognita et emendata, cui nunc primum adduntur observationes IO. FRIDER. BACHSTROM et IO. HUXHAM circa eandem materiam. Venet. 8.

Leçons de physique experimentale par Mr. SIGAUD DE LA FOND, Tom. I. II. à Paris. 8.

Abhandlung vom Wasserbau an Strömen von IOH. ESAIAS SILBERSCHLAG. Leipz. 8. m. K.

Des Herrn Baron VON SIND Kunst Pferde zu zäumen und gut zu beschlagen, nebst einer Anweisung junge Pferde geschickt abzurichten. Berlin. 8. m. K.

Eiusd. der im Feld und auf der Reise geschwind heilende Pferdearzt, welcher einen gründlichen Unterricht von den gewöhnlichsten Kranckheiten der Pferde, im Feld und auf der Reise, wie auch einen auserlesenen Vorrath der nützlichsten und durch eine lange Erfahrung bewährtesten Heilungsmitteln giebet, Franckf. 8.

IO. SOGRATI oratio, in qua theoria lymphæ ductuum MONROI et HUNTERI exponitur et ad praxin chirurgicam adaptatur. Padua 8. mai.

IAC. REINH. SPIELMANN institutiones chemiæ praelectionibus academicis accommodatae. Edit. altera, reuisa, aucta, polita. Argentorat. 8. mai.

Eiusd. disp. med. de vegetabilibus venenatis Alsatiae. Resp. Franc. Anton Guerin. Argentorat. 4.

IOH. CHPH. ERICH SPRINGERS *physicalisch, practisch und dogmatische Abhandlung von den deutschen Getraydbau.* Göttingen. 8.

Traité du soufre, ou remarques sur la dispute, qui s'est élevée entre les chymistes, au sujet du soufre, tant commun combustible ou volatil, que fixe etc. traduit de l'Allemand de Mr. GEORGE ERNEST STAHL. à Paris. 12.

IOH. GOTTLIEB STEEBS *Versuch einer allgemeinen*
Mm 3 mei-

*meinen Beschreibung von dem Zustande der ungefit-
teten und gesitteten Völker nach ihrer moralischen
und physicalischen Beschaffenheit, Tübingen und
Carlsruhe. 8.*

MATTH. STOERCK disp. inaug. exhibens febris
irregularis historiam. Vindobon. 8.

JO. HENR. STOLTE disp. inaug. de morte sus-
penforum aliisque huc spectantibus. Gro-
ning. 4.

CAROL. STRACK obseruationes medicinales de
morbo cum petechiis et qua ratione eidem me-
dendum sit. Carlsruhe. 8.

FRID. CHRIST. STRUVE disp. inaug. de hae-
morrhagiis. Resp. *Ern. Frid. Struve*. Kiliae. 4.

Eiusd. de ouorum gallinaceorum vsu medico. Resp.
Frid. Gotthold Struve. ib. 4.

Eiusd. progr. de fermocinatione post assumptos ci-
bos egregio sanitatis praesidio. ib. 4.

Observations on vapour-bathing and its effects with
some particular cases, in which it was used with
success. By I. SYMONS. Bristol. 8. mai.

FRID. WILH. TAFINGER orat. de anatome
eiusque honore. Tubing. 4.

*Beyträge zur Naturgeschichte des Herzogthums Zelle
gesammelt von I. TAUBE. 1ster Band. Zelle. 8.*

JO. TAYLOR noua nosographia ophthalmica h. e.
accurata recensio ducentorum et quadraginta tri-
um affectuum, qui oculum humanum partesque
vicinas vilo modo laedere aut ipsum visum adime-
re possunt; iconibus artificiosissime sculptis et
coloribus ad viuum expressis, incredibili accura-
tione illustrata (germanice et latine). Hamb. et
Lips. fol. c. tab. aen.

Avis au peuple sur sa santé par Mr. S. A. D. TIS-
SOT nouvelle edit. considerablement augmen-
tée Vol. I. II.

S. A. D. TISSOT avertimento al popolo, tradotto da I. PETRO PELEGRINI col un trattato di scorbuto da Sign. ADDINGTON Tom. I. II. Venezia. 8.

Eiusd. Anleitung für das Landvolk in Absicht auf seine Gesundheit. Neueste Auflage aus dem Französischen übers. durch H. C. HIRZEL. Augspurg und Innsbruck. 8. mai.

Eiusd. onanisme, ou essay sur les maladies produites par la masturbation. Nouvelle edit. à Lausanne. 12.

Eiusd. seconde lettre a Mr. ZIMMERMANN sur l'epidemie de 1766. ib. 12.

Eiusd. oratio de valetudine literatorum. ib. 8.

IO. DAN. TITII disp. de rebus petrefactis, earumque diuisione obseruationes variae. Resp. Daniel Gotthilf Berthold. Witeb. 4.

DAN. WILH. TRILLER geprüfte Pocken Inoculation ein physicalisch und moralisches Gedichte mit nöthigen Anmerckungen und Zusätzen erläutert. Franckf. und Leipz. 4.

Eiusd. opuscula medica ac medico-philologica, antea sparsim edita, nunc autem in vnum collecta atque digesta ab Auctore ipso prius recognita, aucta, castigata et emendata, curauit et praefatus est CAROL. CHRIST. KRAUSE. ib. 4. Vol. I. II.

Eiusd. diss. inaug. de mira naturae solertia in reparandis damnis corpori animato illatis. Resp. Christ. David. Zopf. Witenb. 4.

Eiusd. progr. inaug. de febre miliari, potissimum feminarum, priscis medicis graecis haud incognita, ad quaedam HIPPOCRATIS loca illustranda. ib. 4.

DAN. TURNERS Abhandlung von den Kranckheiten der Haut; nebst einen kurzen Anhang von den äuf-

serlichen Mitteln und der Art, wie sie würcken. Aus dem Englischen übersetzt. Altenb. 8.

IOH. AUG. UNZERS *Sammlung kleiner Schriften. Rinteln. 8.*

Eiusd. verzameling van Mengelschriften schryven van den Artz of Geneesheer etc. met eenige Ammerkingen vermeerdert. Amsterd. 8 mai.

Les cris de la nature et de l'humanité dédiés au beau sexe par Mr. VALLI chirurgien de Florence. à Paris. 8.

DAVID VASSE *quaest. med. an in ipsa imi pedis manusue iunctura amputatio celebranda? aff. Resp. Henr. Raymond. Paris. 4.*

MICH. LUD. VERNAGE *quaest. med. an, rescisso testiculo, funiculum spermaticum ligatura constringere malum? aff. Resp. Io. Iac. Gardane. ib. 4.*

GUALTH. VERSCHUIR *disp. inaug. de arteriarum et venarum vi irritabili: eiusque in vasis excessu: et inde oriunda sanguinis directione abnormi. Groning. 4.*

BENED. CHRISTIAN. VOGEL *disp. inaug. de regimine secretionum ac excretionum. Helmst. 4.*

*Vollständige Anweisung zum Tabackbau, nebst einem Anhang von Pflanzen und Nutzen der Erdäpfel und der so genannnten Grundbirn samt einer ausführlichen Nachricht von dem Futterkraut Lucerne oder ewigen Klee. Dem Publico zum besten und gemeinem Manne zum Nutzen. Aus der Erfahrung und Pracktik zusammengeschrieben und mitgetheilt von I. W * *. Franckf. und Leipz. 8.*

IOH. W * * * *Anhang zu dem Versuche einen Haushofmeister zu bilden oder dessen 2ter Theil. ib. 8.*

GOTTSH. WALLERIUS *disp. on de mineraliske Kropparnes förwittringi lusten. Resp. Neimann Anderson. Upsal. 4.*

Elemens d'agriculture physique et chymique traduit du

du latin de Mr. WALLERIUS. Yverdun et Paris. 8.

I. GUSTAV. WAHLBOM oratio om en provincial medici widstrakte men för det allmänna nyttiga göremät. Stockholm.

Essais sur les vertus de l'eau de chaux, pour la guérison de la pierre par Mr. ROBERT WHYT avec un supplement, contenant la maladie de Mr. Walpoole écrite par lui meme, celle de la maladie de Mr. Newcome, Chanoine de Windsor; traduite de la seconde edition de l'Anglois par M. A. ROUX au quel on a ajouté une methode de dissoudre la pierre par la voie des injections de Mr. BUTTER traduite par le meme. Nouvelle edition. à Paris. 12.

Eiusd. Beobachtungen über die Natur, Ursachen und Heilung der Krankheiten, die man gemeiniglich Nerven - Hypochondrische und Hysterische Zufälle nennt, mit einigen vorausgesetzten Anmerkungen über die Sympathie der Nerven. Aus dem Englischen nach der 2ten verbesserten Ausgabe übersetzt. Leipz. 8 mai.

Eiusd. observations sur les maladies des nerfs, ou maladies vaporeuses de l'un et l'autre sexe traduites de l'anglois sur la derniere edition par un medecin de la Faculté de Paris. à Paris. 12. Voll. 2. (Auctor versionis est Cl. LE BEGUE DE PRESLE.)

ANDR. WESTPHAL disp. inaug. de limitandis laudibus essentiarum et elixiriorum stomachicorum. Resp. Christ. Guil. Xaver. Otto. Gryphiswald. 4.

Flora Gryphica. Auctore GUET. WILKE. ib.

Exposition anatomique de la structure du corps humain par I. B. WINSLOW. Nouvelle edition, faite sur un exemplaire corrigé et augmenté par

l'auteur a laquelle on a joint de nouvelles figures et tables, qui en facilitent l'usage et la vie de l'auteur. Tom. I. II. III. IV. à Paris. 12.

Ichthyologia cum amphibiis regni Borussiae methodo Linnaeana disposita a IO. CHR. WULF. Koenigsb. 8.

IO. BAPT. JOSEPH ZAUSCHNER diss. inaug. de elementis et viribus medicis trium aquarum mineralium Teplensium. Prag. 8.

XXIV.

Index scriptorum physico medicorum, quae anno 1767. prodierunt.

Catalogue hebdomadaire, ou liste alphabétique des livres, tant nationaux, qu'étrangers; des arrêts du conseil et des parlemens, déclarations et edits du Roi, extraits du conseil et des registres des parlemens, lettres-patentes du Roi, ordonnances, sentences etc. Cartes géographiques, musique et estampes, qui sont mis en vente chaque semaine avec l'indication des auteurs, du nombre et du format des volumes et les adresses des libraires et autres, qui les vendent. Année 1767. à Paris. 8.

Ephémérides du citoyen, ou bibliothèque raisonnée des sciences et des arts. Tom. II. à Paris. 12.

Natuur - en geneeskundige bibliotheek, waarin in het kort voorgedraagen worden alle nieuwe werken, welke in de geneeskunde en natuurlyke historie buiten ons Vaterland uitkomen. II. Deels. 3. et 4. III. Deels. 1. 2. 3. Stuck in's Gravenhage. 8. (*Auctore* EDUARDO SANDIFORT).

Philosophical transactions, giving some account of the present undertakings, studies and labours of the ingenious in many considerable parts of the world

world Vol. LVI. for the Year. 1766. Lond. 4. c. tab. aen.

Histoire de l'Academie royale des sciences année 1764. avec les mémoires de mathématique et de physique pour la meme année. Tirés des registres de cette Academie. à Paris. 4. c. tab. aen.

Atti dell' Accademia delle scienze di Siena detta de' Fisiocritichi. Tomo III. In Siena 4. mai. c. tab. aen.

Verhandelingen vitgegeeven door de hollandsche maatschappye der weetenschappen te Haarlem IX Deels III. Stuk. Te Harlem. 8. c. tab. aen.

Natuurkundige Verhandelingen of Verzameling van Stukken de Natuurkunde, Geneeskunde en natuurlyke historie betreffend. III. Stuk. à Amsterdam. 8. mai.

Kongl. Wetenskaps academiens handlingar för år 1767. Vol. XXVIII. Stockholm. 8. c. fig. aen.

Der Königl. Schwedischen Academie der Wissenschaften, Abhandlungen aus der Naturlehre, Haushaltungskunst, der Mechanik auf das Jahr 1765. Aus dem Schwedischen übersezt von ABRAH. GOTTHELF KÜSTNER. 27 Band. Hamburg und Leipzig. 8. m. K.

Acta Heluëtica physico mathematico botanico medica. Vol. VI. Basil. 4. c. tab. aen.

Abhandlungen der Churfürstlich Bayrischen Academie der Wissenschaften. Vierter Band. München 4. mit Kupfern.

Noua acta physico medica Academiae Caesareae Leopoldino Carolinae naturae curiosorum, exhibentia ephemerides, siue obseruationes, historias et experimenta, a celeberrimis Germaniae et exterarum regionum viris habita et communicata, singulari studio collecta. Tom. IIIus. Accedunt appendix et tab. aen. Norimb. 4.

Der

- Der Römisch-Kaiserlichen Academie der Naturforscher
auserlesene medicinisch anatomisch chymisch und bo-
tanische Abhandlungen, 16ter Theil, Nürnberg. 4.
mit K.*
- Schriften der Drontheimischen Gesellschaft, 3ter Band
Kopenhagen. 8. m. K.*
- Histoire de l'Academie royale des sciences et belles
lettres. Année 1760 ou le Tome XVI. à Berlin.
4. c. fig.*
- Gemeinnützlicher Vorrath auserlesener Aufsätze zur
Beförderung der Haushaltungswissenschaft, Künste,
Manufakturen und Fabriken, wie auch der Arzney-
gelahrtheit und Naturkunde. Leipzig. 1ster und 2ter
Theil. 8. m. K.*
- Der Arzt. Eine medicinische Wochenschrift, 12 Theile.
Neue Auflage. Hamburg. 8.*
- Der patriotische Medicus, 2ten Bandes 2ter und 3ter
Theil. Leipzig und Frankf. 8 mai.*
- Die Ehre Gottes aus der Betrachtung des Himmels
und der Erde, 1ster Band, Nürnbg. 8.*
- Zum Nutzen und Vergnügen, eine medicinische Wo-
chenschrift, 1ster und 2ter Band. Naumburg. 8.*
- Liefländische Abhandlungen von der Arzneywissen-
schaft. Oberpahlen in Liefeland.*
- Berlinisches Magazin, oder gesammlete Schriften und
Nachrichten für die Liebhaber der Naturgeschichte,
der Arzneywissenschaft und der angenehmen Wis-
sensschaften überhaupt, 3ter Band, Berlin. 8.*
- Gemeinnütziges Natur- und Kunstmagazin, oder Ab-
handlungen zur Beförderung der Naturkunde, der
Künste, Manufakturen und Fabriken, 3ter Theil.
ib. 8.*
- Neues Hamburgisches Magazin, oder Fortsetzung ge-
sammler Schriften, aus der Naturforschung, der all-
gemeinen Stadt- und Land-Oeconomie und den an-
genehmen Wissenschaften überhaupt, 1ster Band.
Hamb. 8.*

Dreyfaches Universal-Register und Repertorium über die 26 Bände des Hamburgischen Magazins, oder gesammelten Schriften aus der Naturforschung, der Oeconomie und den nützlichen Wissenschaften, ib. 8.

Sammlung auserlesener Schriften zur Aufnahme der Wissenschaften, nebst einigen öconomischen Abhandlungen auf das Jahr 1766. Frankf. am Mayn. 4.

Allgemeine Geschichte der Welt und Natur, der Völker, der Staaten, der Kirche, der Wissenschaften und Künste, aus den Quellen selbst geschöpft; 2ter Theil, welcher sowohl eine mathematische Erdbeschreibung, als auch die Geschichte der Natur in sich enthält. Berlin. 8 mai.

Histoire naturelle, générale et particuliere avec la description du cabinet du Roi, Tome XV. à Paris. 4 mai. c. tab. aen.

Description succinte du cabinet d'histoire naturelle de son Altesse Serenissime Electorale Palatine. Manh. 8.

Icones rerum naturalium, oder Abbildungen zur Erläuterung und Verbesserung der Naturgeschichte. Erstes Heft, Kopenhagen fol. transverso, m. illum. K.

Allgemeine Historie der Natur nach allen ihren besondern Theilen abgehandelt, nebst einer Beschreibung der Naturalienkammer Sr. Maj. des Königs von Frankreich, 6ten Theils 1ster Band. Leipz. 4. m. K.

Histoire naturelle et civile de la Californie, contenant une description exacte de ce pays, de son sol, de ses montagnes, lacs, rivières et mers, de ses animaux, vegetaux, mineraux et de sa fameuse pecherie des perles, les mœurs de ses habitans etc. Traduit de l'Anglois par Mr. F *. Tom. I. II. III. à Paris.*

Conchyliologie nouvelle et portative, ou collection de coquilles propres à orner les cabinets des curieux

rieux de cette partie de l'histoire naturelle, mises par ordre alphabetique, avec les notes des endroits, d'ou elles se tirent, et des cabinets, qui renferment le plus rares, à Paris. 12.

Analyses comparées des eaux de l'Yvette, de Seine, d'Arcueil, de Ville, d'Auray, de Sainte Reine et de Bristol, imprimées a la suite du second memoire de Mr. Desparcieux de l'Academie royale des sciences sur le projet d'amener la riviere d'Yvette à Paris, sous le titre: compte rendu à la Faculté de médecine de Paris par les Commissaires nommés pour l'examen de l'eau de l'Yvette, à Paris. 12.

Von den Rebenstichern, vier Preisschriften, welche bey der den 27 April 1767 gehaltenen öffentlichen Versammlung der Churpfälzischen Academie der Wissenschaften vor die besten unter den eingelaufenen erkläret worden, Mannheim. 8.

Traité historique des plantes, qui croissent dans la Lorraine et dans les trois Evêches Voll. VII. à Paris.

Della idropisia de Gelfi. In Milano. 8.

Verzeichniß der Everschen sehr ansehnlichen Sammlung von Naturalien aus allen Reichen der Natur. Hamb. 4.

Physicalisch-oeconomische Auszüge aus den neuesten und besten Schriften, die zur Naturlehre, Haushaltungskunst, Policy und Cameral- auch andern damit verwandten Wissenschaften gehören. Neunter Band. 1stes und 2tes Stück. Stuttgard. 8.

Mémoires et observations recueillies par la société oeconomique de Berne. Partie I — IV. pour l'année 1767. à Berne. 8.

Délibérations et mémoires de la société Royale d'agriculture de la generalité de Rouen. Tom. II. 8. mai.

Museum

Museum rusticum et commerciale oder auserlesene Schriften, den Ackerbau, die Handlung, die Künste und Manufacturen betreffend, aus der Erfahrung genommen und von verschiedenen in dieser Verrichtung geübten Männern mitgetheilt, von einigen Mitgliedern der Gesellschaft zur Aufmunterung der Künste, Manufacturen und Handlung aber durchgesehen und herausgegeben. Aus dem Englischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet. 6ter, 7ter u. 8ter Band. Leipzig. 8. m. K. (germanice reddidit I. I. S.)

Allgemeines oeconomisches Forstmagazin, in welchen allerhand nützliche Beobachtungen, Vorschläge und Versuche über die wirthschaftliche Policey und Cameralgegenstände des sämmtlichen Wald-Forst und Holzwesens enthalten sind; gesammlet von einer Gesellschaft, deren ordentliches Geschäft ist, Waldungen zu gewinnen, zu benutzen und zu erhalten. 9ter und 10ter Band. Franckf. und Leipz. 8. (Auctore IO. FRIDRICH. STAHL.)

Neue Beyträge zu der Cameral u. Haushaltungs Wissenschaft, aus der Natur und Erfahrung bestärckt von einer Societät in Thüringen. 4tes Stück. Jena. 8.

Abhandlungen der freyen oeconomischen Gesellschaft in Petersburg, zur Aufmunterung des Ackerbaues, der Hauswirthschaft in Rußland 1ster Theil. Aus dem Russischen übersetzt. Mietau u. Riga. 8. mai.

Sammlung der über die Fürstlich Jablonowskischen Aufgaben aus der politischen Geschichte, die Erdmeßkunst und Haushaltungskunst von der Naturforschenden Gesellschaft in Dantzig 1766. gekrönten Preißschriften, nebst der Lobrede auf diesen Fürsten und der mit dem accessit bemerckten geometrischen Abhandlung. Dantzig. 4. m. K.

Erzählungen und Geschichte der Königl. Dänischen Acker-

Ackeracademie bis auf den Schluß des 1766sten Jahres. Flensburg. 4.

Neue oeconomische Nachrichten. 37. u. 38stes Stück. Leipzig. 8. m. K.

Der verbesserte oeconomische Tausendkünstler oder oeconomisches Handbuch, worinnen die wichtigsten Vortheile in allen Theilen der Landwirthschaft und Haushaltungskunst anzutreffen. Ulm. 8.

Oeconomisches Handbuch, worinnen die wichtigsten Vortheile in allen Theilen der Landwirthschaft und Haushaltungskunst, bey dem Acker - Garten - Wiesen - Forst - und Weinbau, desgleichen der Viehzucht angeführt und beschrieben werden. Leipzig. 8.

Abhandlungen und Erfahrungen der physicalischen oeconomischen Bienengesellschaft in der Oberlausitz, vom Jahre 1767, zur Aufnahme der Bienenzucht in Sachsen und anderer Länder. Dresden. 8 mai.

Der kluge Hausvater beym wirthschaftlichen Geschäfte der Aufbehaltung verschiedener wirthschaftlichen Produkte und einiger anderer Dinge. Leipzig. 8. m. K.

Nachricht von dem Nutzen und Gebrauch der Salzasche zum Düngen der Aecker und Wiesen, und zum Vortheil der Cammer - Land - und Bauergüter. Frankf. und Leipz. 8.

Unterricht vor den Landmann, wie die Färberröthe oder Grapp mit Vortheil anzupflanzen und zuzurichten sey. Mannheim. 8.

Vollständige Abhandlung des Weinbaues und anderer daraus entstehenden Produkte. 2ter Band. Frankf. und Leipz. 8.

Anleitung für die Landleute in Absicht auf das Ausstocken und die Pflanzung der Wälder, 1stes, 2tes und 3tes Stück. Zürch. 8 mai.

Briefe

*Briefe eines Frauenzimmers an ihre Freundin in St**
die Waschmaschine betreffend. Mit Anmerkungen.
Regensburg. 4. m. K.*

*Schauplatz der Künste und Handwercke oder vollständi-
ge Beschreibung derselben, gefertigt oder gebilli-
get von den Herren der Academie der Wissenschaf-
ten zu Paris, mit vielen Kupfertafeln. 6ter Band. In
dieser teutschen Uebersetzung mit Anmerkungen her-
ausgegeben von DAN. GOTTFRIED SCHRE-
BER. Königsb. 4. mai.*

*Dictionnaire portatif des arts et metiers contenant
en abrégé l'histoire, la description et la police
des arts et metiers, des fabriques et des manufa-
ctures de France et de pais etrangers. à Paris.
8. Voll. 2.*

*Allgemeines Künstler - Lexicon, oder kurze Nachricht
von dem Leben und den Werken der Mahler, Bild-
hauer, Baumeister, Kupferstecher, Kunstgießer,
Stahlschneider etc. 1stes Supplement. Zürich. 4. mai.*

*Observations sur la description de l'art du charbon-
nier, donnée par l'Academie des sciences, avec un
avertissement de l'editeur et des reflexions sur
l'avertissement placé par M. M. de l'Academie des
sciences à la tête de la description des arts, à Pa-
ris. fol.*

*Anweisung die Gläser zu schleifen und Perspective zu-
zurichten, Leipzig. 8.*

*Der gründlich lehrende Lackirmeister, ingleichen die
Kunst aus Wachs und Gipse allerley Sachen zu ver-
ferigen. ib. 8.*

Anecdotes de médecine, à Paris. 12. Vol. 2.

*Commentatio prima de medicis equestri dignitate
ornatis; praemissa est dissertatio de vera felicitate
e studio et exercitio artis medicae capienda philo-
sopho aequae ac christiano digna. Berolin. 4. (Au-
tore IOANNE CAROLO VILELMO MOESEN.)*

Tom. XVI. Pars III.

Nn

Di-

Dictionnaire de chymie, contenant la theorie et la pratique de cette science, son application à la physique, à l'histoire naturelle, à la médecine et à l'oeconomie animale. Yverdon. 8. Vol. I. II. III.

Fünf chymische Tractätlein von den deutlichen Ausdrücken derer, welche vom Steine der Weisen jemals geschrieben haben. Frankf. 8.

Alchymistische Briefe. Von dem Verfasser der chymischen Versuche zur nähern Erkenntniß des ungelöschten Kalkes etc. (IOHANN FRIEDRICH MEYER in Osnabrück) an den Herausgeber gegenwärtiger Briefe (ANDRAE) Hannover. 4 min.

Chymische Versuche aus alten raren Manuscripten gezogen, in welchen die Kunst Gold und Silber, Gesundheit und ein langes Leben zu finden, enthalten; mit vortrefflichen Anmerkungen, welche den nächsten Weg nach Colchos führen und die Ehre der Kunst befördern, 1ster und 2ter Theil. Erf. und Leipz. 8.

Kurze Nachricht vom auro potabili, nebst gründlicher Untersuchung und deutlicher, doch philosophischer Anweisung, wie zur großen Universalmedicin, oder sogenannten Stein der Weisen zu gelangen, von einem Liebhaber der chymischen Grundmischung. Leipzig. 8.

Kurze Nachricht von den metallischen Gläsern und der Vitrification des Goldes in Amausis, von einem Liebhaber der chymischen Grundmischung. ib. 8.

Médecine rurale, ou pratique de pharmacopée végétale et indigène, à Paris. 12.

Traité des plantes et des animaux, tant des pays étrangers, que de nos climats, qui sont d'usage en médecine représentés en 730. planches gravées en taille douce sur les dessins d'après nature de Mr. de GARSULT par MM. DE FEHRT, PREVOST, DUCLOS, MARTINET etc. avec leurs descriptions, vertus et usages, suivant l'ordre

dre du livre intitulé: matiere médicale de Mr. GEOFFROY Medecin. Ouvrage utile à toutes matieres médicales, aux amateurs d'histoire naturelle, aux artistes, aux personnes charitables et à tous ceux, qui preparent eux memes leurs médicamens. à Paris. 8. Voll. I — VI.

Description abrégée des plantes usuelles avec leurs vertus, leurs usages et leurs propriétés par l'auteur du manuel de charité et pour servir de suite au même ouvrage. ib. 12.

Formules des médicamens usitées dans les differens hopitaux de la ville de Paris, avec leurs vertus, leurs usages, et leurs doses. ib. 12.

Der Hausvater in der Stadt und auf dem Lande, welcher sonderlich den gemeinen Mann auf dem Lande diejenigen leichten und am wenigsten kostbaren, doch sehr bewährten Hausmedicamente anzeigt, die man in den meisten Kranckheiten und Anliegen mit Nutzen gebrauchen soll etc. Ulm. 8. (Est editio secunda auctior ea, quae prodiit 1764. ibidem hoc titulo: Hausmedicamente).

Abrégé économique de l'anatomie du corps humain, composé en faveur des etudians et nécessaire à toutes personnes, qui voudront s'instruire en cette partie. à Paris. 12. c. fig.

Dictionnaire portatif de cuisine, d'office et de distillation, contenant la maniere de préparer toutes sortes de viandes, de volailles, de gibier, de poissons, de legumes, de fruits etc. La façon de faire toutes sortes de gelées, de patés, de pastilles, de gateaux, de tourtes, de patées, vermicel, macaronis etc. et de composer toutes sortes de liqueurs, de ratafiats, de syrops, de glaces, d'essences etc. ouvrage également utile aux chefs d'office et de cuisine les plus habiles et aux cuisinieres, qui ne sont employées, que pour des

tables bourgeoises. On y a joint des observations médicales, qui font connoître la propriété de chaque aliment, relativement à la santé et qui indiquent les mets les plus convenables à chaque temperament. à Paris. 8.

Ephemerides Syrmienfes seu obseruationes constitutionum anniuersariarum comitatus Syrmienfis vicinarumque partium. Vienn. 8.

Purification de l'air croupissant dans les hopitaux, les prisons et les vaisseaux de mer. à Paris. 8.

Delle coltivazione e dell'uso delle patate e d'altre piante comestibili. In Venezia. 4.

Die Mißbräuche des Aderlassens bewiesen aus Gründen, welche von der Natur und dem Verfahren der berühmtesten Aerzte zu allen Zeiten hergenommen sind. Nebst einen Anhange über die Mittel die Arzneykunst zu verbessern. Zur Anwendung für junge Aerzte und Warnung für das Publicum. Aus dem Frantzösischen übersetzt von CHRISTIAN GEORG WOLFGANG BEHRISCH der Arzneygelohrheit Doktor. Leipzig. 8.

Unterricht von den affectibus venereis oder sogenannten Galanterie - Krankheiten. ib. 8.

Supplement au rapport fait à la faculté de médecine de Paris contre l'inoculation de la petite vérole. à Paris. 4. (Auctore L'EPINE).

Anmerckungen über die Einpfropfung der Blattern. Franckf. und Leipzig. 8.

Occasional lettres on the practice of inoculation. à Paris.

Medical observations and inquiries by a Society of physicians in London. London. 8. c. f.

Obseruationes clinicae ad ductum medicationum in nosocomio generali Varfauienfi. Fasciculus Imus. Varfav. et Dresd. 8.

Heelkundige oefeningen, betreffende vooreest, over

over het bloedstempen en de dar toe gepaste hulpmiddelen door en Genootschap. Eerste Stukje. Te Middelburch. 8. Tweede Stukje over de caries of been bedewing.

Dictionnaire de chirurgie, contenant la description anatomique des parties du corps humain, le mecanisme des fonctions, le manuel des operations chirurgicales, avec le detail et usages des differens instrumens et medicamens employés dans le traitement des maladies du ressort de la chirurgie. Le tout d'après l'exposition et les preceptes, tant écrits, que non écrits, des meilleurs maitres en médecine et en chirurgie anciens et modernes. A l'usage des etudians en médecine et en chirurgie et de toute personne, qui veut se procurer une connoissance suffisante de la structure des parties du corps humain, de leurs differens usages etc. par Mr. le V*** M*** et de la M***. à Paris. 8. Voll. I. II.

Manier om de ettergezwellen te openen en te behandelen al mede de hulps middelen hiertoe dienstig. Amsterd. 8. c. fig.

Vollständige Abhandlung von Beinbrüchen, Verrenckungen und den übrigen Zufällen der Knochen. Hamburg. 8.

Lettre d'un citoyen de Lyon a Mr. ROUX avec des observations sur les effets d'un remede contre les maladies cancreuses et la copie des proces, verbaux et des certificats déposés chez Mr. BLOCHE. à Paris. 8.

Ontleed en heelkundige verhandeling over de uitzakkingen en uitwassen der lyfmoeder en schede. Uitgegeuen door een gezelschap van Utrechtse heelmeeesters. Te Utrecht. 8.

Hebammen Ordnung für das Herzogthum Holflein Königlichen Antheils, die Herrschaft Pinneberg, Stadt Altona und Graffschaft Ranzau. Glückstadt.

E'cole royale vétérinaire de Paris. à Paris. 4.

L'art vétérinaire, ou médecine des chevaux à Paris. ib. 8.

Beytrag zur Geschichte der allgemeinen Viehseuche in der Markbrandenburg. Leipzig 8.

IO. TRAUGOTT ADOLPHI diff. inaug. de funiculo vmbilicali vel intra vterum disseccando. Resp. et Auctore *August. Henric. Hertz.* Helmstad. 4. c. tab. aen.

GEORG. DAVID. ALBRECHT diff. inaug. de ischuria. Gotting 4.

The practice of inoculation, impartially considered, its signal advantages, fully proved and the popular objections against it confuted; in a letter to Sir EDWARD WILMOT, Bar. By JOHN ANDREW, M. D. to which are added the sentiments of Dr. HUXHAM and several other eminent physicians, relative to the said practice, as communicated to the author. Lond.

CAROL. MARIAE VICTOR ANSELMi meletthemata physico medica, Turin.

Memoires pour servir à l'histoire de la faculté de médecine de Montpellier par feu Mr. JO. C. ASTRUC, revus et publiés par Mr. LORRY, à Paris. 4.

Eiusd. tractatus pathologicus, edit. 4ta. ib. 12.

Précis de la methode d'administrer les pilules toniques dans les hydropisies par Mr. BACHER, M. D. ib. 12.

A letter to D. BAKER on the means of procuring a favourable Kind of Smalpox, and of the use of cold air and cold water in putrid fevers, Lond. 8.

D. BAKER a second letter from D. GLAFF, ib. 8.

Eiusd. Untersuchung, was von der jetzt in verschiedenen

nen Provinzen von England üblichen Methode, die Kinderblattern einzupfropfen zu halten sey. Aus dem Engl. übersetzt von L. F. T. Leipzig. 8.

D. BAKER An essay concerning the cause of the endemical colic of Devonshire, which was read in the theatre of the college of physicians in London on the 29 june 1767. Lond. 8.

Ehrengedächtniß des Herrn CHPH. ANDR. MANGOLD an die Churmaynzische Akademie der Wissenschaften, von ERNST. GOTTFR. BALDINGE, Iena. 4.

BARBEN DU BOURY le botaniste françois, à Paris. 8. Voll. I. II.

Sammlung von Reisen und Entdeckungen in einer chronologischen Ordnung zusammen getragen von IOH. BARROW. Aus dem Englischen übersetzt. 1ster u. 2ter Band. Leipzig. 8. mit Landcharten und Kupfern.

PAUL. IOSEPH. BARTHEZ diss. physico medica de aëris natura et influxu in generationem morborum, cui accessit corollarium de aëre, aquis et locis Foroiulienfibus. Resp. Io. Francisc. Perongely, Monspel. 4.

IO. BAPTISTA BECCARIA epist. de electricitate vindice. Turin.

IOH. BECKMANN'S Anfangsgründe der Naturhistorie. Göttingen und Bremen. 8.

Eiusd. Gedanken von der Einrichtung oeconomischer Vorlesungen, statt einer Einladung zu seinen Winter-Vorlesungen 1767 aufgesetzt. Göttingen. 4.

Descriptiones plantarum ex capite Bonae Spei, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus et synonymis auctorum iustis. Secundum systema sexuale ex autopsia concinnavit atque sollicitè digessit PETR. ION. BERGIUS. Stockholm. 8 mai. c. tab. aen.

IO. BARTHOL. ADAM. BERINGERI lithographia Wirceburgensis ducentis lapidum figuratorum a potiori insectiformium prodigiosis imaginibus exornata, editio Ilda. Francof. et Lips. fol.

Cours de mathematiques à l'usage des gardes du pavillon et de la marine par Mr. BEZOUT. à Paris. 8. Voll. 2.

LAMBERT BICKER vertoog over de Oorfaeken, welhende zennew ziekten in ons Land gemeender denn vorheen maaken, Rotterdam. 8 mai.

Mémoire sur la meilleure construction des fours, pour bien cuire les briques, la chaux et les ouvrages de poterie, tant pour epargner les bois, que pour avoir une cuite égale dans les differens endroits du four, par Mr. BAUSSAN DU BIGNON, à Berlin. 4. c. f.

Eiusd. Abhandlung über die beste Art Oefen zu bauen, darinnen Ziegel, Kalk und Töpferarbeit gebrannt werden können, sowohl in Absicht das Holz zu ersparen, als auch um einen durchgängig gleichen Brand in verschiedenen Stellen des Ofens zu erhalten, welche von der Königl. Preussischen Acad. der Wissenschaften und schönen Künste in Berlin 1766 den Preis erhalten hat. ib. 4. m. F.

IOH. ULRICH BILGUERS *Abhandlung von dem sehr seltenen Gebrauch oder der beynahe gänzlichen Vermeidung des Ablöfens der menschlichen Glieder. Aus dem lateinischen übersezt und mit noch einigen Wahrnehmungen vermehrt. Zweyte verbesserte Auflage. Frankf. und Leipzig. 8.*

Eiusd. Nachrichten an das Publicum in Absicht der Hypochondrie, oder Sammlung verschiedener und nicht sowohl für die Aertzte, als vielmehr für das ganze Publicum gehörige die Hypochondrie, ihre Ursachen und Folgen betreffende medicinische Schriftstellen und daraus gezogener Beweis, das die Hypochondrie

chondrie heutiges Tages eine fast allgemeine Krankheit ist und daß sie eine Ursache der Entvölkerung abgeben kann. Kopenhag. 8. mai.

ROBERT BILLINGS *Nachricht von Anbau der gelben Möhren und deren großen Nutzen bey Fütterung und Mästung des Viehes. Franckf. 8.*

HERRMANN. BLUHM *diff. inaug. de gelatinosorum humorum corporis humani coagulis. Lips. 4.*

FRID. SAMUEL BOCKS *Versuch einer kurzen Naturgeschichte des Preussischen Bernsteins und einer neuen wahrscheinlichen Erklärung seines Ursprungs. Königsb. 8. mai.*

GEORG. RUDOLPH. BOEHMER *diff. inaug. de salibus ammoniacalibus. Resp. et Auctore Frid. Rudolph Peissel. Witteb. 4.*

Eiusd. progr. inaug. delineans medicum, in praecavendis variolis impotentem. ib. 4.

Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle par Mr. VALMONT DE BOMARE. Tom. I. II. III. IV. nouv. edit. à Paris. 4.

Differtazione medico chirurgica di CAMMILLO GUISEPPE BONIOLI DI LENIGO Chirurgo in Vincenza. In Venezia. 8.

Il maniscalco instruito nella medicina pratica delle principali malattie del cavallo dal Signor Conte FRANCESCO BONSI. Tom. I. in Rimino. 8.

Recherches sur le tissu muqueux, ou l'organe cellulaire et sur quelques maladies de la poitrine par Mr. THEOPHILE DE BORDEU. On y a joint une dissertation du meme auteur, sur l'usage des eaux de Bareges dans les ecrouelles. à Paris. 12.

Eiusd. recherches sur le pouls par rapport aux crises; 2nde edit. augmentée des recherches sur les crises du meme auteur, et des jugemens portés sur la doctrine du pouls, depuis la publication des recherches 1756. ib. 12.

ROG. BOSCHOWICH diff. de lunae atmosphaera
Vienn. 8.

ADOLPH. IULIAN. BOSE diff. inaug. de morbis
corneae, ex fabrica eius declaratis. Lips. 4.

ERNEST. GOTTLÖB BOSE diff. inaug. de morbo
miliari. Auctore et Resp. Gottfr. Frölich. ib. 4.

Observations sur l'anasarque, les hydropisies de poi-
trine, du pericarde par M. M BOUILLET, pere
et fils, à Paris. 8.

GEORGE FRIEDR. BRANDERS *kurze Beschrei-
bung einer ganz neuen Art einer Camerae obscurae,
ingeleichen eines Sonnenmicroscops. Augsb. 8. c. f.*

GUSTAV. DETLEV BRETTING diff. inaug. de
ratione medicamentorum ad corporis humani
conditionem accommodata. Lips. 4.

Thoughts arising from experience, concerning the
present peculiar method of treating persons, in-
oculated for the small-pox. Relating to the pre-
paration of the patients; the manner of the ope-
ration; the genuine nature of the disease and of
some other eruptive cases; the use of cold air;
the effects of retarding or lessening the eruption
and purging after it is over. By W. BROMFIELD,
Surgeon. Lond. 8.

Planches enluminées de l'histoire naturelle de Mr.
DE BUFFON; cahier des fleurs, à Paris. fol.

Academiae Caesareae Leopoldino Carolinae naturae
curiosorum bibliotheca physica, medica, miscella,
partim sociorum munificentia, partim ipsius sum-
tibus comparata. Quam nunc ab anno 1756 vs-
que ad annum 1766 continuatam sistit ANDR.
ELIAS BÜCHNER, Hal. Magd. 4.

Eiusd. diff. inaug. de antimonio variisque eius tin-
cturis cum alcalinis menstruis factis. Resp. et Au-
ctore Diethelm Lavatterus. ib. 4.

Eiusd. diff. inaug. sistens considerationem patholo-
gico-

gico practicam singultus. Resp. et auctore Io. Georg. Störzel. ib. 4.

ANDR. ELIAS BÜCHNERI diss. inaug. de tartaro vitriolato et praecipitatione alcali fixi ab acido vitriolico. Resp. et Auctore Io. Iacob Vogel. ib. 4.

Eiusd. diss. inaug. de duplici specie exanthematicarum febrium in praxi bene obseruanda. Resp. et Auctore Frid. Carol. Klose. ib. 4.

DANIEL. CHRIST. BURDACH diss. de vi aëris in sono. Resp. Io. Benjamin. Reifig. Lipf. 4.

A new practical essay on cancers: to which is also added a new, more safe and efficacious method of administering Hemlock. By J. BURROWS, M.D. Lond. 8 mai.

Riflessioni fisiologiche di LEOPOLDO MARC. ANTON. CALDANI, sopra due dissertazioni del S. LE CAT, Venetia. 8 mai.

Projet d'annéantir la petite vérole par M. ANTON. LE CAMUS, à Paris. 4.

Idem liber. ib. 12.

PETR. CAMPER epistola ad anatomicorum principem magnum ALBINUM, Groning. 4. c. tab. aen. (*de optima ratione conficiendarum tabularum anatomicarum.*)

FRANZ LUDEWIG CANCRINUS *Beschreibung der vorzüglichsten Bergwerke in Hessen, im Waldeckischen, am Harze, im Mannsfeldischen, in Chur-Sachsen und im Saalfeldischen, Frf. am Mayn.* 4. c. f.

ABRAHAM. CAPPADOCE diss. de mensium tardatione, L.B. 4.

MAURIT. ANTON. CAPPELLERII historia Pilati montis, in pago Lucernensi siti, Basil. 4. c. tab. aen.

IO. FRID. CARTHEUSER fundamenta materiae medicae tam generalis, quam specialis. Tom. I. II. editio noua praecedente emendatior ac longe auctior, Francof. ad Viadrum. 8.

De

De vita ANTON. MUSAE BRASAVOLI commentarius historico medico criticus ex ipsius operibus erutus ab ALOYSIO FRANC. CASTELLANI, Mantuae. 8.

Oeuvres physiologiques ou traité des sensations et des passions en général et des sens en particulier, ouvrage divisé en deux parties. Par Mr. LE CAT, Tom. I. II. à Paris. 8 mai. c. tab. aen.

An essay towards an investigation of the present successful, and most general method of inoculation, by B. CHANDLER. Lond. 8 mai.

Recueil des pieces, qui ont servi à adjuger le prix, qui avoit été proposé par la Société royale d'agriculture de Paris pour l'année 1766. et qui a été remporté par le Sieur CHARLEMAGNE. à Paris. 12.

Reflexions interessantes sur la maladie nommée folie, ou extrait du Journal économique par Mr. CHEVALIER. ib. 12.

IO. NEPOM. CHMELSKY diff. inaug. de scorbuto exercitum Caesareo Regium in Silesia grauitate 1760 et 1761. afficiente. Prag. 4.

Dictionnaire oeconomique, contenant l'art de faire valoir les terres et de mettre à profit les endroits les plus steriles; l'établissement, l'entretien et le produit des prés, tant naturels, qu'artificiels; le jardinage, la culture des vignes, des arbres forestiers et fruitiers et des arbrustes; le foin, qu'exigent les bêtes à cornes et celles à laine, les chevaux, les chiens cet. la façon d'élever et gouverner les abeilles, les vers à soie, les oiseaux de basse cour, de proie et de voliere; on y trouve un detail des profits et agrémens, que procurent les biens de campagne, objet, qui comprend la chasse, la peche, la fabrication de filets, pieges cet. l'appret des alimens, la composition des liqueurs, confitures

tures et autres choses d'office; une exacte description des végétaux le plus propres à nous servir d'alimens, à favoriser l'exploitation des biens de campagne, à decorer les jardins, des instructions pour prévenir les maladies et pour les guérir: la connoissance des plantes utiles à la teinture et à d'autres arts, le détail de leurs diverses propriétés, leur culture et les moyens de les employer, avec une idée sommaire de ce, qui concerne les droits Seigneuriaux et ceux des communautés et des ecclésiastiques, par rapport aux biens de campagne cet. Ouvrage composé originairement par Mr. NOEL CHOMEL. Nouvelle édition corrigée, augmentée et accompagnée de beaucoup de figures, à Paris. fol. Vol. 3.

Histoire naturelle de l'homme considéré dans l'état de maladie, ou la médecine rappelée à sa première simplicité par Mr. CLERC, ib. Vol. I. II. 8.

THOM. COGAN de animi pathematum vi et modo agendi in iudicandis vel curandis morbis. L. B. 4.

GUILLIEM. COOPER diss. inaug. de abortionibus, ib. 4.

ABRAHAM HERCULES COPPER diss. de chlorosi, ib. 4.

CASIMIRUS DA COSTA CAETANO diss. de studio medico, ib. 4.

Traité des maladies du Poumon par Mr. COSTE, Doct. en médecine, à Paris. 12. Vol. I.

DADID CRANZ *Historie von Grönland, enthaltend die Beschreibung des Landes und der Einwohner, Leipz. 8. m. K.*

IO. HENR. NEPOM. CRANTZ classis umbelliferarum emendata, cum generali feminum tabula et figuris aeneis in necessarium institutionum rei herbariae supplementum. ib. 8 mai.

IO. HENR.

10. HENR. NEPOM. CRANTZ stirpium Austriacarum fasciculus III. Lips. ib. 8 mai. c. tab. aen.

Eiusd. primarum linearum institutionum botanicarum editio altera, continens characteristicas omnium classium icones, additamenta nouorum generum et specierum, in necessarium institutionum rei herbariae supplementum. Auctore FRANC. XAVER. HARTMANNO, ib. 8 mai. c. tab. aen.

Catalogue systématique et raisonnée des curiosités de la nature et de l'art, qui composent le cabinet de Mr. DAVILA avec figures en taille douce, de plusieurs morceaux, qui n'avoient point encore été gravés, Tom. I. II. III. à Paris. 8.

HENR. FRID. DELIUS diss. inaug. sistens nonnulla de secretionibus vna cum thesibus aliis chemico medicis. Resp. Io. Reuß, Erlang. 4.

Eiusd. diss. inaug. de nonnullis circa aquas in tractu Baunacensi. Resp. Tob. Alt, ib. 4.

Eiusd. vorläufige Nachricht von dem sale aperitiuo Fridericiano oder eröffnenden Friedrichs-Salze, Hildburghausen. 8.

Reliqua proxime.

Contenta in hac parte.

I.	Kongl. Vetenskaps Academiens Handlin- gar för År 1767. Vol. XXVIII	pag. 387
II.	British zoology Vol. I. II. III	408
III.	STRACK obseruationes de morbo cum petechiis et qua ratione eidem meden- dum fit	415
IV.	HALLERI opera anatomica minora. Tom. III	426
V.	VANDELLI diff. de arbore draconis f. dracaena	444
VI.	CRANTZ de duabus draconis arboribus	446
VII.	BERENS diff. de dracone arbore CLU- SII	448
VIII.	RETZIUS kort begrep af grunderne til Pharmacien at nyrtja vid enskylta Före- läfningar	450
IX.	Essai sur les maladies, qui attaquent le plus communement les gens de mer. Par G. M.	452
X.	Histoire de l'elephantiasis. Par Mr. RAYMOND	455
XI.	Diff. sur une méthode nouvelle de traiter les maladies vénériennes par des lave- mens. Par Mr. ROYER	460
XII.	Exposition anatomique de la structure du corps humain. Nouvell. edit. Par Mr. WINSLOW. Tom. I—IV	463

XIII.

XIII. Histoire et mémoires de l'Academie royale des sciences de Paris année 1763. pag.	465
XIV. Traité des eaux minerales. Par Mr. MONNET	481
XV. La taille au niveau. Par Mr. POUTEAU	490
XVI. DE HAEN ratio medendi. Pars XI et XII.	496
XVII. GUNNERI flora Noruegica	513
XVIII. SCHLEISS <i>Abhandlung von Podagra</i>	521
XIX. Gli Atti dell'Accademia di Siena detta de Fisio critici. Tom. II	525
XX. Instituts de chymie. Par Mr. DEMACHY	535
XXI. EIUSDEM procedés chymiques	540
XXII. Noua physico medica	543
XXIII. Continuatio indicis scriptorum physico medicorum, quae anno 1766. prodierunt	548
XXIV. Index scriptorum physico medicorum, quae anno 1767 prodierunt	554

